

2017 年护士执业资格考试真题

参考答案



2017 年护士执业资格考试真题

专业实务

1. 答案: D

解析: 护士有可能因此感染乙肝病毒, 属生物性损伤。

2. 答案: B

解析: 患者近 1 周剧烈呕吐, 电解质钾氯从呕吐物中大量排出体外, 胃酸也同样排出较多量, 剩余物则偏向碱性, 因此会导致低钾低氯性碱中毒。

3. 答案: A

解析: 只有吸入高浓度氧(浓度 > 60%) 且超过 24 小时; 或在高压氧环境下, 超过 5 小时有可能发生氧中毒。

4. 答案: A

解析: 持续 3 天, 体温持续 39.2 °C 以上, 最高达 40 °C 提示为稽留热。

5. 答案: C

解析: 给脑出血病人被动运动可以预防压疮的发生。

6. 答案: D

解析: 高热需要确定是何种细菌感染导致, 然后针对特定细菌使用对应的杀菌抗生素。

7. 答案: E

解析: 口腔护理中取下的义齿应浸没于贴有标签的冷水中, 每日换水一次。

8. 答案: B

解析: 临时医嘱即为需立即执行的应马上执行。

9. 答案: C

解析: 压疮各期临床表现: ①淤血红润期: 红肿热痛; ②炎性浸润期: 皮肤紫红、皮下硬结、常有水疱易破溃; ③浅度溃疡期: 水泡破溃、黄色渗出液, 感染后表面有脓液覆

盖, 形成溃疡; ④坏死性溃疡期: 组织发黑, 脓液较多, 感染深达骨面有臭味。

10. 答案: B

解析: 头高足低位适用: 颈椎骨折进行颅骨牵引时作反牵引力; 减轻颅内压、预防脑水肿; 开颅手术后或头部外伤防止出血。

11. 答案: A

解析: 皮试结果阳性的判断标准: 皮丘红肿, 硬结直径大于 1.5 cm, 红晕范围直径超过 4 cm, 有时出现伪足或有痒感, 全身过敏反应表现。

12. 答案: E

解析: 半坐卧位适用心肺疾病所致呼吸困难, 重力作用下膈肌下移, 胸腔容量增大, 使呼吸困难改善。

13. 答案: E

解析: 冷疗的禁忌部位: ①枕后、耳廓、阴囊处: 用冷易引起冻伤。②心前区: 用冷可导致反射性心率减慢、心房纤颤或心室纤颤及房室传导阻滞。③腹部: 用冷易引起腹泻。④足底: 用冷可导致反射性末梢血管收缩影响散热或引起一过性冠状动脉收缩。

14. 答案: D

解析: 房颤的三大特点: 第一心音强弱不等; 心律极不规则; 脉搏短绌。脉搏短绌即在同一单位时间内, 脉率少于心率。

15. 答案: C

解析: 高血压危险分层, 高危患者指的是在 10 年内发生心脑血管病事件的概率有 20% ~ 30%。

16. 答案: D

解析: 当 Na⁺ 与葡萄糖同时与结合位点相结合时即能转运并显著增加钠和水的

吸收。

17.答案:E

解析:患者当前最首要的护理诊断就是疼痛。

18.答案:B

解析:腹部疾病中可查出的细菌绝大多数都是大肠杆菌,大肠杆菌感染的体液会出现粪臭味。

19.答案:A

解析:从题干血钠浓度为 140 mmol/L 得出等渗性脱水;皮肤稍干、弹性稍差,眼窝稍凹陷得出患儿等渗性轻度脱水,因此失水占体重比例<5%。

20.答案:E

解析:活动能力良好者才能配合护士进行呼吸功能锻炼。

21.答案:D

解析:预防子宫内膜异位症注意:①避免意外妊娠;②保持良好的心态;③不过晚生育;④避免月经血的逆流,比如经期保健避免性生活、负重等。

22.答案:B

解析:臀部着地致骶尾骨骨折属直接暴力。

23.答案:C

解析:IgG 是再次体液免疫反应产生的主要 Ig,在血清中含量最高。治疗用的丙球中主要含 IgG,从正常人血清中提取的 IgG 可有多种抗体活性,如抗甲肝、乙肝、破伤风和白喉抗毒素等。

24.答案:D

解析:口服布洛芬治疗类风湿性关节炎,该药物会引起胃肠道不良反应。

25.答案:E

解析:子宫内膜癌主要表现为绝经后不规则阴道流血。

26.答案:B

解析:顺铂进入细胞后,与 DNA 发生反应,形成 DNA 内两点或两链的交叉连接,从

而抑制 DNA 复制和转录,导致 DNA 断链和错码,抑制细胞有丝分裂。

27.答案:A

解析:药物及化学物质为再障最常见的致病因素,已知具有高度危险性的药物有抗癌药、氯霉素等,其中氯霉素最多见。

28.答案:B

解析:从 X 线诊断患儿为支气管肺炎,肺部啰音以背部两肺下方脊柱旁较多。

29.答案:B

解析:测量基础代谢率需要以下条件:清晨、清醒、静卧,未做肌肉活动;前夜睡眠良好,测定时无精神紧张;测定前至少禁食 12 小时;室温保持在 20~25 ℃。

30.答案:B

解析:脑电图可测出睡眠的快速动眼期和非快速动眼期状态。

31.答案:D

解析:卫生防疫机构才可管理医院、血站等直属部门。

32.答案:E

解析:疼痛只会在病人身上不会转移到家属身上。

33.答案:B

解析:出院患者对护理工作的满意度的评价属于终末质量评价指标。

34.答案:C

解析:患者因输血感染乙肝,医院是最直接的责任方,患者可向医院索赔,医院再向血站索赔。

35.答案:D

解析:该情况上报时间不能超过 24 小时。

36.答案:D

解析:医疗事故鉴定申请应 7 日内处理成功。

37.答案:E

解析:家属是非医疗专业人员,无法专业性参与治疗过程。

实践能力

1.答案:A

解析:1级高血压(轻度):收缩压 140~159 mmHg 和(或)舒张压 90~99 mmHg。当收缩压和舒张压分属于不同分级时,以较高的级别作为标准。

2.答案:B

解析:螺内酯是保钾利尿药,不应过多摄入含钾多的水果以免引起高钾血症心律失常;心功能不全患者应给予低盐清淡易消化饮食,少食多餐,控制总热量的摄入。限制钠盐摄入,每天食盐摄入量在 5 克以下为宜。

3.答案:D

解析:心肌梗死发生室性心律失常时,首选利多卡因静脉注射。

4.答案:D

解析:肺动脉瓣狭窄病人肺动脉瓣区可闻及响亮的喷射性全收缩期杂音,瓣膜型以第 2 肋间最响,因进入肺动脉的血液大量减少,所以肺动脉瓣被血液冲击关闭的声音减弱。

5.答案:E

解析:重度二尖瓣狭窄常有“二尖瓣面容”,双颧绀红。

6.答案:D

解析:彩色多普勒超声是确诊各类先天性心脏病的最佳选择。

7.答案:C

解析:静脉曲张非手术治疗坚持长期使用弹力袜,弹力袜在行走前穿为宜,即早上上班前。

8.答案:A

解析:将病人仰卧在坚硬、平坦的地面上,按压部位为胸骨中下 1/3 交界处,成人按压深度至少 5 cm,频率为 100 次/分,按压与人工呼吸的比例为 30:2。

9.答案:E

解析:坐位时双膝交叉会影响下肢静脉回流使静脉压增高,从而加重病情。

10.答案:C

解析:左心衰肺淤血,右心衰全身淤血。题中双下肢未见水肿,即全身无淤血症状。

11.答案:B

解析:右心衰主要表现为体循环静脉淤血,体征有颈静脉怒张和肝静脉回流阳性。

12.答案:C

解析:对肥厚型心肌病病人的健康指导最首要的是绝对卧床休息。

13.答案:C

解析:肥厚型心肌病的病理改变为左室心肌的不均匀性肥厚,最常累及室间隔,其次为心尖,左室游离壁。

14.答案:B

解析:肥厚型心肌病常用药物有美托洛尔或维拉帕米、地尔硫革。避免使用增强心肌收缩力的药物(如洋地黄)及减轻心脏负荷的药物(如硝酸甘油),以免加重左室流出道梗阻。

15.答案:B

解析:很多种病毒都可能引起心肌炎,其中以柯萨奇病毒较常见,是柯萨奇 B 组病毒。

16.答案:D

解析:血栓闭塞性脉管炎病程分为 3 期,其中局部缺血期可能表现为反复发作性的游走性血栓性静脉炎,即浅表静脉发红、发热、呈条索状,且有压痛。

17.答案:D

解析:由于长期缺氧、红细胞增加,血液粘稠度高,血流变慢引起脑血栓。

18.答案:B

解析:风湿性心脏瓣膜病病人运动耐力下降,疲乏无力,与外周循环供血不足有关。也就是心排血量减少致组织缺血的意思。

19.第1问 答案:A

解析:蚓状血管隆起提示患者为下肢静脉曲张。

第2问 答案:B

解析:患者久坐时,感下肢沉重,酸胀,因此此时患者最主要的问题是活动无耐力。

20.答案:B

解析:幽门螺杆菌感染的慢性胃炎最根本的护理措施是遵医嘱进行抗幽门螺杆菌感染治疗。

21.答案:A

解析:敷料渗血较多,面色苍白提示患者有出血征象。

22.答案:B

解析:胆道疾病超声检查前禁食 12 小时,使胆囊内胆汁充盈,有利于检查。

23.答案:A

解析:重症肝炎患者应给予低脂低盐、高糖高维生素易消化流食或半流食,限制蛋白质摄入量。

24.答案:C

解析:患者应诊断消化性溃疡,护士指导病人有规律地定时进食,在溃疡活动期,以少食多餐为宜,每天进食 4~5 次,使胃酸分泌有规律。

25.答案:D

解析:幽门梗阻应重点检查呕吐的隔夜宿食。

26.答案:C

解析:抗幽门螺杆菌的“四联疗法”是 1 种质子泵抑制剂+枸橼酸铋钾+2 种抗菌药。

27.答案:B

解析:护士进行评估首先对其健康教育的应是“心理指导”,指导患者正确认识慢性胃炎。

28.答案:A

解析:膝胸位的 11 点在肛门相对病人全身来说的左侧位背侧位,从截石位看就等同为 5 点位。

29.答案:E

解析:对急性胰腺炎病人,哌替啶多用于疼痛剧烈者,必要时可每 6~8 小时应用一次。

30.答案:D

解析:溃疡易继发幽门梗阻,缓解腹痛的有效措施就是胃肠减压。

31.答案:A

解析:细菌性感染性疾病常见外在表现是发热。化脓性疾病的常见外在表现也是发热。肝区疼痛、黄疸、食欲减退、乏力消化系统的常见症状体征。

32.答案:D

解析:门静脉高压症病人发生急性出血时,病人呕吐鲜红色血液,排出柏油样黑便。25%~30%病人第 1 次大出血就死亡,部分病人出血虽止,但常易复发;首次出血后 1~2 年内 50%~70%病人会再次出血,死亡率达 30%~50%。

33.答案:E

解析:开放性气胸胸膜腔经胸壁伤口与外界大气相通,以至空气可随呼吸自由进入胸膜腔。

34.答案:D

解析:患者面罩吸氧不好转,呼吸窘迫,需机械通气以快速改善呼吸功能。

35.答案:A

解析:该病的吸氧护理:持续低流量、低浓度给氧,氧流量 1~2 L/min,浓度在 25%~29%。

36.答案:E

解析:弹性胸带固定胸廓正合适血气胸病人的现场急救。

37.答案:E

解析:患者被痰液阻塞导致诱发肺性脑病,需紧急行机械吸痰。

38.答案:D

解析:生命体征四大指标,任何一个变化都可提示病情变化。

39.答案:D

解析:体位引流可以有效缓解该病人的

状况。

40.答案:B

解析:右心衰导致体循环淤血,上下腔静脉回流受阻、血液淤积。

41.答案:B

解析:拔管时间:术后12~14天;拔管指征:黄疸消退,无腹痛、发热,大便颜色正常。胆汁引流量逐渐减少,颜色呈透明金黄色,无脓液、结石,无沉渣及絮状物。

42.答案:A

解析:对于支气管哮喘患者,先用一些支气管扩张剂,待支气管扩张后,再用一些激素类气雾剂,指导病人吸药后及时用清水含漱口咽部。

43.答案:D

解析:氧合指数($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$,以 PaO_2 的mmHg值除以吸入氧分数 FiO_2 获得)是肺氧合功能指标之一,是诊断ARDS的必要条件,正常值为400~500,ARDS时 ≤ 200 。

44.第1问 答案:B

解析:患者慢性咳嗽咳痰6年,X线胸片示两肺透亮度增加,右上圆形透亮区,可诊断患者有慢性支气管炎、肺气肿,题中所给选项均对。

第2问 答案:D

解析:右胸叩诊鼓音,呼吸音消失,发绀提示患者并发了右侧气胸。

45.答案:A

解析:猩红热患儿需要观察皮疹及脱皮情况,保持皮肤清洁,可用温水清洗皮肤(禁用肥皂水),剪去患儿指甲,避免抓破皮肤。脱皮时可涂凡士林或液体石蜡。衣服可日晒消毒。

46.答案:D

解析:正常产褥期10天子宫会降至耻骨联合下,触摸不到。

47.答案:B

解析:宫底触到圆而硬的胎儿部分为胎头,所以该孕妇的胎先露为臀先露。

48.答案:E

解析:子宫破裂的病因有:胎先露部下降受阻,子宫瘢痕,缩宫剂使用不当,手术创伤。放羊水时应防止速度过快、量过多,一次放羊水量不超过1500mL以防血压骤降发生休克。

49.答案:D

解析:输卵管结扎术的禁忌症为各种疾病的急性期,全身健康情况不良不能胜任手术者,腹部皮肤感染或内外生殖器炎症者,严重神经症,24小时内2次体温达 37.5°C 或以上者。

50.答案:A

解析:先兆流产表现少量阴道流血;难免流产阴道流血量增多,宫颈口已扩张;不全流产妊娠产物部分排出体外;完全流产妊娠产物已完全排出,宫颈口已关闭;习惯性流产指自然流产连续发生3次或3次以上者。

51.答案:D

解析:依题意原则是早期、足量应用抗生素。

52.答案:C

解析:依题意患者血压低引起低血容量性休克,应及时建立静脉通路补充血容量、升血压。

53.答案:C

解析:产后出血是指胎儿娩出后24小时内出血量超过500mL;晚期产后出血指产褥期内发生子宫大量出血,多于产后1~2周内发生,也有迟至产后2个月左右发病者。

54.答案:E

解析:会阴切口疼痛又有肛门坠胀感提示血肿的发生。

55.答案:A

解析:子宫硬如板状,有压痛,孕周提示孕妇胎盘早剥。

56.答案:B

解析:妊娠合并心脏病的产妇体重增量不得超过10kg。

57.答案:C

解析:正常产褥,产后 10 日子宫降至骨盆腔内,在腹部检查摸不到子宫底;产后第 3 周除胎盘附着部位以外的子宫内膜基本修复,胎盘附着部位的内膜修复约需至产后 6 周;产后 4 周,子宫颈完全恢复至非孕时形态;正常恶露有血腥味,但无臭味,一般持续 4~6 周,一般产后最初 3 日是血性恶露,产后 4~14 日为浆液性恶露,产后 14 日以后为白色恶露。

58.答案:A

解析:一般产后半小时内开始哺乳。经阴道分娩的产妇,产后 6~12 小时内即可起床轻微活动,于产后第 2 日可在室内随意走动。行会阴侧切或行剖宫产的产妇,可适当推迟活动时间。产后 2 周时开始做膝胸卧位,可预防或纠正子宫后倾。

59.答案:E

解析:新生儿颅内出血时应避免搬动患儿,以防加重出血,形成脑疝。

60.答案:C

解析:题中描述患儿惊厥表现,诊断患儿维生素 D 缺乏性手足搐搦症,该病血清钙降低。

61.答案:E

解析:病理性黄疸的血清胆红素每日上升超过 5 mg/dl,黄疸在出生后 24 小时内出现,黄疸持续时间长(足月儿>2 周,早产儿>4 周),黄疸退而复现,血清结合胆红素>1.5 mg/dl。

62.答案:E

解析:肋骨骨折病人临床表现会有气胸、咯血、皮下气肿等,潜在并发症:肺部和胸腔感染。

63.答案:A

解析:高压氧舱治疗能增加血液中物理溶解氧,供组织细胞利用,加速 HOHb 的解离,促进 CO 消除,提高动脉氧分压,可迅速纠正组织缺氧。

64.答案:A

解析:患者多发性肋骨骨折,胸廓塌陷,双肺呼吸音减弱此为亟待首要解决的情况。

65.答案:C

解析:骨盆骨折合并腹膜后出血不宜采取骨盆以下的部位建立静脉通路。

66.答案:B

解析:不即刻取出,患儿会窒息死亡。

67.答案:C

解析:烧伤各度损伤范围分别是:Ⅰ度烧伤表皮层;浅Ⅱ度表皮的生发层及真皮乳头层(真皮浅层);深Ⅱ度真皮层;Ⅲ度全层皮肤及皮下。

68.答案:A

解析:右上腹损伤伴腹膜刺激征,首先考虑肝破裂。

69.答案:E

解析: $(5\%+6\%)/2=5.5\%$ 。

70.答案:C

解析:第 4~7 肋骨长而薄,最易折断。

71.答案:E

解析:首先应解决病人的腹部剧烈疼痛问题。

72.答案:E

解析:异位的子宫内膜因周期性出血致卵巢增大并形成单个或多个囊肿,即为卵巢巧克力囊肿。

73.答案:E

解析:应用大剂量雌激素可迅速提高血内雌激素浓度,促使子宫内膜生长,短期内修复创面而止血,也称“子宫内膜修复法”。

74.答案:C

解析:护理人员与病人接触时,从语言和行为上都应消除激惹源,不与之争论是否患病的问题,尽量争取病人的合作。

75.答案:C

解析:强迫症病人的护理:①一般护理:建立有效的护患沟通,及时掌握病情的变化。注意语言的使用,防止伤害病人的自尊心。②以行为治疗理论为指导,减少和控制症状。③安全护理:避免激惹患者,清除危险物品。

76.答案:E

解析:风湿热以环形红斑最常见,呈环形

或半环形,如钱币大小,中心苍白,边缘轻度隆起。

77.答案:C

解析:短期内治头痛需遵医嘱用强的松,一般情况下嘱口服小剂量激素。

78.答案:E

解析:SLE 临床表现里消化系统中肝损害:约40%的病人血清转氨酶升高,10%的病人肝大,但多无黄疸。

79.答案:E

解析:蝶形红斑是系统性红斑狼疮特征性皮肤损害。糖皮质激素是治疗系统性红斑狼疮的重要药物。

80.答案:E

解析:早期胃癌多无明显症状,部分病人可有消化道症状,无特异性。约50%以上的胃癌好发于胃窦部,其次为贲门部,发生在胃体者较少。淋巴转移是胃癌的主要转移途径,早期胃癌可有淋巴转移,进展期胃癌的淋巴转移率高达70%左右,血行转移发生在晚期。手术是治疗胃癌的首选方法。

81.答案:D

解析:绒毛膜癌主要经血行播散,最常见的转移部位是肺(80%)。常见症状为咳嗽、血痰或反复咯血、胸痛及呼吸困难。

82.答案:B

解析:肝叶切除术术后早期注意要预防肝断面出血。

83.答案:B

解析:子宫颈癌的病理类型有鳞状细胞癌、腺癌和腺鳞癌,以鳞状细胞癌为主,约占80%~85%。多发生于宫颈鳞状上皮与柱状上皮交界处。鳞状细胞浸润癌表现以下4种类型:①菜花型②浸润型③溃疡型④颈管型。子宫颈癌转移途径以直接蔓延和淋巴转移为主,血行转移极少见。宫颈上皮内瘤变包括宫颈不典型增生及宫颈原位癌。

84.答案:C

解析:术后穿刺点加压包扎6小时防止出血。

85.第1问 答案:A

解析:肿瘤分布在膀胱侧壁及后壁最多,其次为三角区和顶部。

第2问 答案:D

解析:膀胱癌术后引流管内引出鲜血,每小时超过100 mL以上且易凝固,提示有活动性出血,应及时报告医师处理。

第3问 答案:E

解析:膀胱灌注化疗主要用于保留膀胱的病人,术后早期,每周1次。嘱病人灌注前4小时禁饮水,排光膀胱。灌注后嘱病人多饮水,每日饮水2 500~3 000 mL,起到生理性膀胱冲洗的作用,减少化疗药物对尿道黏膜的刺激。

86.答案:E

解析:服用糖皮质激素者,应告知必须按医嘱、按时、按剂量、按疗程用药,不可自行减量或停药,以免加重病情。

87.答案:D

解析:再障患者高热抽搐采用大血管处放置冰袋降温有很好的效果。

88.答案:B

解析:对单纯性甲状腺肿病人的健康教育,多进食含碘丰富的食物,如海带、紫菜等海产类食品,并避免摄入大量阻碍甲状腺素合成的食物(如卷心菜、花生、菠菜、萝卜等)和药物。

89.答案:B

解析:患者在饮食控制和口服降糖药的多途径治疗下仍血糖高,则需要胰岛素治疗。

90.答案:D

解析:排便困难会使颅内压进一步增高,诱发脑疝,危及生命。

91.答案:D

解析:流行性脑脊髓膜炎疾病分4型:①普通型:②暴发型:③轻型:④慢性型。本病绝大多数为普通型。暴发型24小时内病情变化快危及生命,轻型多见于流脑流行后期,病变轻微。慢性型少见,病程可迁延数周甚

至数月。

92. 答案: E

解析: 脑室引流量每日不宜超过 500 mL。

93. 答案: E

解析: 出生时腕部无骨化中心, 出生后腕

95. 答案: B

解析:

部骨化中心在 10 岁时出全, 共 10 个, 1~9 岁腕部骨化中心的数目约为其岁数加 1。

94. 答案: E

解析: 变态反应属于异常反应。

| 预防疾病 | 接种疫苗 | 接种年龄 |
|-------|---------|----------------------|
| 结核病 | 卡介苗 | 出生后 |
| 乙型肝炎 | 乙肝疫苗 | 出生后、1 月、6 月 |
| 脊髓灰质炎 | 脊髓灰质炎疫苗 | 2 月、3 月、4 月、4 岁 |
| 百白破 | 百白破疫苗 | 3 月、4 月、5 月、18 月、6 岁 |

96. 答案: D

解析: 卫气即是防御作用。



查缺补漏