

---

## 2018 年初级护师专业知识真题及答案

1. 常以性激素分泌紊乱为首发症状，为低度恶性的卵巢肿瘤，多发于 45-55 岁妇女，其病理改变为

- A. 无性细胞瘤
- B. 颗粒细胞瘤
- C. 未成熟畸胎瘤
- D. 粘液性囊腺瘤
- E. 浆液性囊腺瘤

答 B

2. 不属于羊水栓塞的处理是

- A. 持续低流量给氧
- B. 半卧位
- C. 遵医嘱立即静注地塞米松 20~40mg
- D. 如发生在第一产程立即剖宫产结束分娩
- E. 如正在滴注催产素应立即停止

答案 A

3. 产后出血导致失血性休克时的补血原则是

- A. 补充同等失血量
- B. 补充 1/2 失血量
- C. 补充 1/3 失血量
- D. 补充 1 倍失血量
- E. 补充 2 倍失血量

答案 A

4. 大咯血患者发生窒息时，首要的护理措施是

- A. 给予输血
- B. 保持气道通畅
- C. 给予吸氧
- D. 给予止血
- E. 应用呼吸机

答案 B

5. 下列提高妊娠率的措施中，错误的是

- A. 性交时避免精神紧张
- B. 性交后立即入厕
- C. 性交后适当抬高臀部
- D. 排卵期增加性交次数
- E. 注重营养，增强体质



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM

---

答案 B

6. 颅内高压三主征是

- A. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- B. 呕吐、视神经乳头水肿、抽搐
- C. 视神经乳头水肿、抽搐、昏迷
- D. 抽搐、昏迷、头痛
- E. 昏迷、头痛、呕吐

答案 A

7. 糖尿病患者出现强烈饥饿感、心悸、手颤，出汗可能的原因是

- A. 胃溃疡
- B. 糖尿病加重
- C. 高血压
- D. 低血糖
- E. 合并甲亢

答案 D

8. 急性肺水肿最突出的表现是

- A. 咯少量血
- B. 咳大量脓痰
- C. 咳大量白色泡沫浓痰
- D. 咳大量粉红色泡沫痰
- E. 咯大量

答案 D

9. 慢性肾功能衰竭患者皮肤瘙痒的是

- A. 久不洗浴
- B. 尿素刺激
- C. 皮肤发
- D. 汗液刺激
- E. 末梢神经炎

答案 B

10. 癫痫大发作的临床表现特征是



- 
- A. 局部肌肉节律性抽搐
  - B. 吸吮、咀嚼、流涎
  - C. 突发突止的意识障碍
  - D. 意识丧失、全身抽搐
  - E. 无理吵闹、唱歌、脱衣

答案 D

11. 1 岁半小儿心尖搏动位于

- A. 左侧第五肋间，锁骨中线处
- B. 左侧第四肋间，锁骨中线外侧
- C. 左侧第四至第五肋间，锁骨中线处
- D. 左侧第五肋间，锁骨中线外侧
- E. 左侧第四肋间，锁骨中线处

答案 C

12. 肠蛔虫病患者服驱虫药的时间是

- A. 饭后半小时
- B. 无严格要求
- C. 饭前半小时
- D. 饭中
- E. 空腹或睡前

答案 E

13. 对低钾患者静脉补钾，最重要的参考指标是

- A. 患者精神状态
- B. 给药速度
- C. 患者尿量
- D. 用药总量
- E. 药液浓度

答案 C

14. 腰椎间盘突出症保守治疗时的卧位宜取

- A. 平卧位



- 
- B. 抬高床头 20°
  - C. 患侧卧位
  - D. 健侧卧位
  - E. 抬高床头 35°

答案 A

15. 产后大出血的护理措施，不正确的是

- A. 保暖、吸氧
- B. 观察生命体征及尿量
- C. 建立静脉通路
- D. 遵医嘱使用有效的止血药物
- E. 子宫切除

答案 E

16. 患者女，50 岁。全麻下行直肠癌根治术，术后尚未清醒，其卧位应取

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 侧卧位
- D. 俯卧位
- E. 去枕仰卧头偏向一侧

答案 E

17. 患者男，30 岁。夜间发作性上腹烧灼痛 2 月余，进食后迅速缓解。昨起排柏油样便 2 次，今晨起床时晕倒而就诊。体检：T37° C，P120 次/分，R24 次/分，BP10.7/6.6kPa(80/60mmHg)，神志恍惚，皮肤苍白，四肢厥冷。考虑出血原因是

- A. 胃底静脉曲张
- B. 应激性溃疡
- C. 十二指肠球部溃疡
- D. 胃小弯溃疡
- E. 胃癌

答案 C

18. 患儿男，生后第 10 天发现口腔粘膜出现小片状白色乳凝块样物，不易擦拭，周围粘膜正常。进食、精神尚可。引起该病的病原微生物是



- 
- A. 链球菌
  - B. 单纯疱疹病毒
  - C. 金黄色葡萄球菌
  - D. 肺炎链球菌
  - E. 白色念珠菌

答案 E

19. 使用双气囊三腔管时，正确的护理措施是

- A. 出血停止后即可拔管
- B. 置管期间每 12 小时放气 5 分钟
- C. 食道囊和胃囊各注气约 30ml
- D. 拔管后 24 小时仍需严密观察
- E. 先向食道囊注气。再向胃囊注气

答案 D

20. 某消化性溃疡患者经常胃出血，并发现黑便。出血量约为

- A. 3~5ml
- B. 10ml
- C. 500ml
- D. 60ml
- E. 1000ml

答案 D

21. 上腹部手术备皮范围的界线是定

- A. 上自乳头连线，下至脐水平
- B. 上自锁骨，下至脐水平
- C. 上自乳头连线，下至耻骨联合
- D. 上自剑突水平，下至耻骨联合
- E. 上自剑突水平，下至大腿上 1/3

答案 C

22. 患者男，47 岁。下肢静脉曲张，作浅静脉瓣膜功能试验时，塌陷的大隐静脉在 30s 内由上而下迅速充盈。提示为

- A. 交通瓣膜闭锁不全
- B. 股静脉瓣膜闭锁不全
- C. 深静脉阻塞
- D. 下肢供血不足
- E. 大隐静脉瓣膜闭锁不全

答案 A



23. 患者女, 40 岁。重大交通事故致严重外伤, 手术后入 ICU 第 3 天, 患者出现了“三衰”。“三衰”是指出现了

- A. 肾、肝、脑衰竭
- B. 心、肺、肾衰竭
- C. 肺、肾、肝衰竭
- D. 脑、血、胃肠衰竭
- E. 肝、脑、血衰竭

答案 B

24. 闭合性肾损伤非手术治疗的护理要点错误的是

- A. 严密观察血压、脉搏变化
- B. 密切观察疼痛的部位及程度
- C. 绝对卧床休息 2 周, 直至血尿消失
- D. 动态观察尿液的颜色及量
- E. 定时测量体温和白细胞计数

答案 C

25. 休克代偿期的表现不正确的是

- A. 收缩压正常或稍高
- B. 神志清楚, 伴有痛苦表情
- C. 无尿
- D. 口渴明显
- E. 脉搏 100 次/分以下

答案 C

26. 产妇, 28 岁。产后一周出现情绪低落, 认为孩子出生后家人不如以前关心自己, 心情压抑悲伤, 经常冲家人发脾气。下列叙述错误的是

- A. 产后抑郁只需要进行心理治疗
- B. 分娩后体内雌激素突然下降可能是产后抑郁的促发因素
- C. 护理人员要鼓励产妇宣泄、抒发自己的心理感受
- D. 注意安全保护, 防止产妇发生伤害行为
- E. 社会心理因素是造成产后抑郁的主要原因

答案 A



27. 关于截瘫患者的护理措施中，不正确的是

- A. 防止泌尿系统并发症
- B. 两小时翻身一次，（夜间例外）
- C. 防止肺部并发症
- D. 保持大便通畅
- E. 功能训练

答案 B

28. 患者女。25 岁。近 2 月轻度咳嗽。咳白色粘痰。内带血丝。午后低热。面颊潮红。疲乏无力。常有心悸、盗汗。较前消瘦，X 线胸片检查：发现右上肺第二肋部有云雾状阴影。无透光区。痰菌 3 次检验阴性。对于该患者不必要的护理措施是

- A. 给予高热量、高维生素和高蛋白饮食
- B. 按医给予抗结核药物治疗。观环察药物不良反应
- C. 住院隔离治疗
- D. 做好保健指导
- E. 室内开窗通风

答案 C

29. 关于急性胰腺炎的处理。错误的是

- A. 禁饮食。持续胃肠减压
- B. 应用抗生素
- C. 应用抗胆碱药物
- D. 抗休克
- E. 应用吗啡止痛

答案 E

30. 患儿男，3 岁。幼儿园老师反映该患儿在学习和玩耍时经常心不在焉，注意力不集中，离位行走。干扰其他小朋友活动。诊断为注意力缺陷多动障碍。针对该患儿进行心理护理时，错误的是

- A. 患儿出现攻击行为时，无需特殊制止
- B. 避免打骂、呵斥患儿
- C. 发现患儿优点应积极表扬
- D. 学校及家长共同教育，共同管理患儿
- E. 引导患儿遵守公共秩序

答案 A

31. 患者误服有机磷农药约 100ml，不久出现昏迷，双瞳缩小，呼吸困难，满肺湿啰音。原因是

- A. 动眼神经兴奋



- 
- B. 急性肺炎
  - C. 急性气管炎
  - D. 迷走神经持久兴奋
  - E. 急性胃炎

答案: D

32. 关于流产的临床特点。叙述正确的是
- A. 完全流产。腹痛。宫口松
  - B. 稽留流产, 胚胎或胎儿在宫内已死亡超过 10 周
  - C. 难免流产: 阴道出血少, 未破水
  - D. 先兆流产: 宫口未开。阴道出血量少于月经量
  - E. 不全流产: 宫口闭, 阴道出血减少

答案 D

33. 患者男, 24 岁。瘦高体型。于傍晚打篮球后一阵剧烈咳嗽。突感左侧胸部针刺样疼痛, 随即感到胸闷、呼吸困难, 诊断为自发性气胸。该患者适合采取的体位为

- A. 健侧卧位
- B. 患侧卧位
- C. 仰卧位
- D. 半坐位
- E. 平卧位



答案 D

34. 长期高血压容易引起哪些脏器受损
- A. 心、脑、肺
  - B. 脑、肾、心
  - C. 心、肝、肾
  - D. 心、脑、脾
  - E. 肺、肾、肝

答案 B

35. 患儿女, 7 个月。感冒后出现全身皮肤、粘膜散在出血点, 多为针尖大小, 分布不均, 以四肢为多, 并有鼻出血。血化验: 血小板为  $20 \times 10^9 / L$ 。红细胞及白细胞正常。诊断为特发性血小板减少性紫癜。该患儿护理措施中错误的是

- A 给予肾上腺皮质激素治疗
- B. 密切观察患儿呼吸、脉搏、神志等
- C. 禁止尖锐、多刺的食物
- D. 忌服阿司匹林药物
- E. 鼓励患儿多运动



---

答案 E

36. 浅 II 度烧伤伤及

- A. 真皮深层
- B. 表皮
- C. 皮肤及皮下组织
- D. 真皮浅层
- E. 皮肤全层

答案 D

解析：1° 烧伤 表皮浅层，烧灼感，3~7 天痊愈。浅 II° 伤及表皮的生发层·真皮乳头层，红肿水泡，痛明显，1~2 周愈合，一般不留疤痕，多有色素沉着。深 II° 皮肤的真皮层，红白相间，痛迟钝，3~4 周，常有疤痕。

37. 对门脉高压症患者食管曲张静脉破裂出血最有效的止血方法是

- A. 输新鲜全血
- B. 垂体后叶加压素静脉滴注
- C. 应用各种止血药物
- D. 三腔两囊管压迫
- E. 去甲肾上腺素加入冷盐水口服

答案 D

38. 急腹症观察期间病情好转的表现是

- A. 生命体征恶化
- B. 血白细胞、中性粒细胞比例上升
- C. 腹痛无缓解
- D. 腹膜刺激症状局限化
- E. 血红细胞进行性下降

答案 D

39. 患者男。50 岁。肝硬化病史 5 年。今日出现腹痛、腹胀和低热，表情淡漠。嗜睡。诊断考虑为肝性脑病，对诊断帮助最大的体征是

- A. 腱反射亢进
- B. 肌阵挛
- C. Babinski 征阳性
- D. 腹壁反射消失
- E. 扑翼样震颤

答案 E



---

40. 为延缓肾小球硬化及肾功能减退。应选择的饮食是

- A. 低甘油三脂
- B. 高维生素 C
- C. 低胆固醇
- D. 高碳水化合物
- E. 低蛋白饮食

答案 E

41. 患者女, 70 岁, 有高血压病史 25 年。突然出现剧烈头痛伴左侧上下肢瘫痪。诊断为“脑出血”。此时正确的护理措施是

- A. 12 小时后给予鼻饲流质
- B. 去枕平卧位
- C. 48 小时内避免搬动
- D. 补充血容量
- E. 头部热敷

答案 C

42. 28 岁孕妇, 妊娠 35 周, 胎膜早破 12 小时收入院。产科检查。LOT. 未入就盆。胎心率 140 次/分。对该孕安护理措施错误的是

- A. 绝对卧床休息
- B. 保持外阴清洁
- C. 密切观察生命体征变化
- D. 按医嘱 给予抗生素
- E. 取半坐卧位

答案 E

43. 患者女. 46 岁. 反复上腹部疼痛 5 年, 近几日本上述症状再发。疼痛位于上腹中部。多在进餐后出现。2-3 小时后逐渐缓解。下次进食后疼痛再次出现。伴反酸、暖气。最可能的诊断是

- A. 慢性胃炎
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃溃疡
- D. 急性胃炎
- E. 胃癌

答案 C

44. 肺癌早期最常见的症状是

- A. 反复咯血
- B. 呼吸困难
- C. 胸痛
- D. 刺激性干咳

---

E. 发热

答案 D

45. 能迅速终止心绞痛发作的药物是

- A. 硝酸异山梨醇酯(消心痛)
- B. 硝苯地平(心痛定)
- C. 卡托普利(开博通)
- D. 阿司匹林
- E. 美托洛尔(倍他乐克)

答案 A

46. SLE 最常累及的器官是 ( )

- A. 心脏
- B. 肺脏
- C. 肝脏
- D. 脾脏
- E. 肾脏

答案 E

47. 食管癌的晚期临床表现不包括

- A. 持续性胸背痛
- B. 进食呛咳
- C. 胸骨后烧灼感
- D. 进行性吞咽困难
- E. 声音嘶哑

答案 B

48. 某孕妇，末次月经的时间为 2008 年 2 月 6 日，其预产期应该是

- A. 2008 年 12 月 1 日
- B. 2008 年 11 月 30 日
- C. 2008 年 11 月 13 日
- D. 2008 年 12 月 30 日
- E. 2008 年 12 月 6 日

答案 C

49 急性白血病患者易感染的最主要原因是



- 
- A. 缺乏成熟中性粒细胞
  - B. 缺少白蛋白
  - C. 缺少红细胞
  - D. 缺乏预防接种
  - E. 缺乏血小板

答案 A

50. 预防上呼吸道感染患儿发生惊厥的主要措施是

- A. 按医嘱应用镇静剂
- B. 保持安静、减少刺激
- C. 按医嘱应用抗生素
- D. 积极控制体温
- E. 密切观察及时发现惊厥前兆

答案 E

51. 急性肾小球肾炎的主要临床表现为

- A. 前驱感染、血尿、水肿、蛋白尿、高血压
- B. 前驱感染、血尿、水肿、蛋白尿
- C. 前驱感染、水肿、蛋白尿
- D. 水肿、低蛋白血症、高血压、血尿
- E. 前驱感染、水肿、蛋白尿、高血压

答案 A

52. 患者男，45岁。肝硬化病史5年。目前病情稳定，血氨正常，无腹水。其饮食原则为

- A. 高热量、高蛋白、高维生素饮食
- B. 低热量、高蛋白、高维生素饮食
- C. 高热量、低蛋白、高维生素饮食
- D. 低热量、低蛋白、高维生素饮食
- E. 高热量、高蛋白、低纤维素饮食

答案 D

53. 产妇进入第二产程的标志是

- A. 产妇出现排尿困难
- B. 产妇产宫颈口开全
- C. 胎头部分露于阴道口
- D. 产妇有排便感
- E. 产妇屏气向下用力

答案 B



---

54. 营养室制定的含有瘦肉、蛋黄、猪肝、黑木耳的菜谱适合下列哪类血液病患者

- A. 过敏性紫癜
- B. 缺铁性贫血
- C. 急性白血病
- D. 慢性再生障碍性贫血
- E. 特发性血小板减少性紫癜

答案 B

55. 过敏性紫癜患儿常见的首发症状为

- A. 皮肤紫癜
- B. 牙龈出血
- C. 血尿、蛋白尿
- D. 关节肿痛
- E. 腹痛

答案 A

56. 麻疹最具有早期诊断价值的表现是

- A. 接触麻疹患儿 10~14 天后发热
- B. 结膜充血、畏光流泪及眼睑浮肿
- C. 耳后、发际出现淡红色充血性斑丘疹
- D. 全身淋巴结肿大
- E. 白色麻疹粘膜斑(柯氏斑)

答案 E

57. 冠状动脉粥样硬化性心脏病猝死最主要的原因是

- A. 窒息
- B. 严重心律失常
- C. 心脏破裂
- D. 脑梗死
- E. 肺梗死

答案 B

58. 慢性肺源性心脏病患者发生右心衰水肿时，运用利尿药物正确的是

- A. 宜用速效排钾利尿药
- B. 全程全量使用
- C. 短疗程、小剂量使用
- D. 绝对禁忌使用排钾利尿药

E. 不能使用

答案 C

59. 患者女, 48 岁. 以“反复上腹痛 3 天”为主诉入院。入院前 3 天进食油腻食物后出现中上腹疼痛, 呈持续性疼痛。向左肩背部放射阵发性加剧, 急查血淀粉酶为 1300IU/L 尿淀粉酶 815IU/L. 该患者禁食禁饮最主要的目的是

- A. 减少胆汁的分泌
- B. 避免胃扩张
- C. 减少胃液的分泌
- D. 减少胰液的分泌
- E. 解除脚管痉挛

答案 D

60. 某产妇, 25 岁, 自然分娩一活男婴, 会阴左侧切开缝合, 助产士应告知该产妇拆线前不能采取的体位是

- A. 半坐卧位
- B. 俯卧位
- C. 主侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 平卧位

答案 C

61. 患儿, 3 岁。4 周前患麻疹, 近 1 周来发热, 体温 39C, 咳嗽, 气促, 双肺呼吸音粗, 未闻啰音, 结核菌素试验阳性。X 线胸片: 双肺均匀分布大小一致的点状阴影。可能的诊断是

- A. 麻疹肺炎
- B. 金黄色葡萄球菌肺炎
- C. 急性粟粒型肺结核
- D. 支气管肺炎
- E. 原发性肺结核

答案 C

62. 某甲亢患者因自觉心慌发现心率比脉率多, 这种情况称为

- A. 奇脉
- B. 水冲脉
- C. 速脉
- D. 交替脉
- E. 短绌脉

答案 E



---

63. 肾移植术后，不宜用作补液的静脉是

- A. 移植对侧下肢静脉
- B. 移植侧上肢静脉
- C. 移植侧下肢静脉
- D. 移植对侧上肢静脉
- E. 移植侧上下肢静脉

答案 E

64. 股疝易嵌顿，主要是因为

- A. 骨盆宽大
- B. 股管解剖特点
- C. 患者年龄大
- D. 患者多为经产妇
- E. 患者肥胖

答案 B

65. 患者男，31岁。腹部疼痛7h。腹部查体：全腹部有压痛。反跳痛和肌紧张。行腹部穿刺抽出含少量食物残渣的混浊液体，最可能的诊断是

- A. 胰破裂
- B. 肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 胃穿孔
- E. 肠系膜血栓形成

答案 D

66. 肿痛患者心理变化过程的第一期表现是

- A. 抑郁
- B. 愤怒
- C. 接受
- D. 否认
- E. 协商

答案 D

67. 侵蚀性葡萄胎患者若发生阴道转移时，典型的体征为

- A. 阴道粘膜溃疡
- B. 阴道粘膜充血
- C. 阴道粘膜水肿

- 
- D. 阴道粘膜附有白色膜状物
  - E. 阴道粘膜紫蓝色结节

答案 E

68. 协助诊断输卵管妊娠破裂内出血既简单又可靠的方法是
- A. 宫腔镜检查
  - B. 尿妊娠试验
  - C. 阴道 B 超检查
  - D. 阴道后穹隆穿刺
  - E. 腹腔镜检查

答案 D

69. 患者女，45 岁。因肝癌行肝叶切除术。手术后第 2 天，T37.9C，患者不宜过早下床活动的主要原因是
- A. 防止肝脓肿
  - B. 防止肝断面出血
  - C. 有利于患者恢复体力
  - D. 有利于患者伤口愈合
  - E. 防止肝性脑病

答案 B

70. 为促进非手术治疗的尿路结石患者排出结石，最适宜的运动方式是
- A. 跳跃
  - B. 长跑
  - C. 散步
  - D. 气功
  - E. 游泳

答案 A

(71~72 题共用备选答案)

- A. 肾盂肾炎
  - B. 慢性肾衰竭
  - C. 慢性肾小球肾炎
  - D. 急性肾小球肾炎
  - E. 原发性肾病综合征
71. 需多饮水的疾病是 A
72. 需给予优质蛋白饮食的疾病是 D

(73~75 题共用备选答案)

- A. 腓肠肌痉挛，体温多正常
- B. 头痛、头晕、口渴、皮肤苍白、血压下降，体温基本正常





- 
- C. 头晕、眼花、耳鸣，头部温度高，体温多不升高  
D. 早期头痛、头昏、全身乏力、多汗，继而体温迅速升高，可达 40° C  
E. 头痛、头晕、发热  
73. 中暑热衰竭的主要表现为 B  
74. 中暑热痉挛的主要表现为 A  
75. 中暑热射病的主要表现为 D

解析：

热痉挛是突然发生的活动中或者活动后痛性肌肉痉挛，通常发生在下肢背面的肌肉群（腓肠肌和跟腱），也可以发生在腹部。肌肉痉挛可能与严重体钠缺失（大量出汗和饮用低张液体）和过度通气有关。热痉挛也可为热射病的早期表现。

热衰竭是由于大量出汗导致体液和体盐丢失过多，常发生在炎热环境中工作或者运动而没有补充足够水分的人中，也发生于不适应高温潮湿环境中的人中，其征象为：大汗、极度口渴、乏力、头痛、恶心呕吐，体温高，可有明显脱水征如心动过速、直立性低血压或晕厥，无明显中枢神经系统损伤表现。热衰竭可以是热痉挛和热射病的中介过程，治疗不及时，可发展为热射病。四

热射病是一种致命性急症，根据发病时患者所处的状态和发病机制，临床上分为两种类型：劳力性和非劳力性热射病。劳力性者主要是在高温环境下内源性产热过多（如炎热天气中长途的跑步者），它可以迅速发生；非劳力性主要是在高温环境下体温调节功能障碍引起散热减少（如在热浪袭击期间生活环境中没有空调的老年人），它可以在数天之内发生。其征象为：高热（直肠温度 $\geq 41^{\circ}\text{C}$ ）、皮肤干燥（早期可以湿润），意识模糊、惊厥、甚至无反应，周围循环衰竭或休克。此外，劳力性者更易发生横纹肌溶解、急性肾衰竭、肝衰竭、DIC 或多器官功能衰竭，病死率较高。

- A. 甲状腺危象  
B. 喉返神经损伤  
C. 喉上神经内支损伤  
D. 喉上神经外支损伤  
E. 甲状旁腺损伤  
76. 术后出现声音嘶哑、失音的 B  
77. 术后出现音调降低的是 D

解析：

喉返神经损伤：一侧喉返神经损伤，大都引起声嘶。

双侧喉返神经损伤，导致失音或严重的呼吸困难。

喉上神经损伤：外支损伤，声带松弛·音调降低。

内支损伤，容易误咽发生呛咳。

(78~79 题共用备选答案)

- A. 腹痛，寒战高热，黄疸
  - B. 进行性加重的无痛性黄疸
  - C. 腹痛、寒战高热、黄疸+休克+精神症状
  - D. 间歇性黄疸
  - E. 新生儿 7 天内轻微黄疸
78. 急性梗阻性化脓性胆管炎的患者，可见的症状是 C
79. 胰头癌患者可见的症状是 D

(80-82 题共用备选答案)

- A. 泼尼松
  - B. 硫酸羟氯喹
  - C. 甲氨蝶呤
  - D. 滑膜切除术
  - E. 双氯芬酸钠
80. 患者男，42 岁。诊断类风湿关节炎 1 年余，其治疗方案为双氯芬酸钠+柳氮 磺吡啶，为尽快控制症状，可首选 A
81. 强直性脊柱炎患者伴发顽固性眼病，除应用激素外，可考虑应用 C
82. 类风湿 关节炎患者现进行性呼吸困难，胸片检查有双肺网状阴影，在常规治疗的基础上应首选 D

(83-85 题共用备选答案)

- A. 母婴传播
  - B. 空气传播
  - C. 虫媒传播
  - D. 血液传播
  - E. 粪-口传播
83. 中毒型细菌性痢疾的传播途径是 E
84. 麻疹的主要传播途径 B
85. 流行性乙型脑炎的传播途径是 C

(86~ 87 题共用题干)

患者女，33 岁。左乳发现一 4cmx3cm 大小肿块，与周围组织粘连，边界不清，同侧腋窝淋巴结肿大。

- 86 最可能的诊断是
- A. 乳腺癌
  - B. 乳腺囊性增生
  - C. 乳腺纤维腺瘤
  - D. 乳管内乳头状瘤
  - E. 乳腺炎

答案 A



---

87. 该患者欲行手术治疗，备皮范围为

- A. 胸部、同侧腋下、上臂
- B. 胸部、同侧腋下
- C. 胸部、上臂
- D. 胸部、同侧腋下，颈部
- E. 胸部、双侧腋下

答案 D

(88- 89 题共用题干)

患者女。30 岁。怀孕后被诊断为妊娠合并糖尿病。

88. 治疗的首选药物是

- A. 胰岛素
- B. 消渴丸
- C. 二甲双胍
- D. 甲苯磺丁尿
- E. 优降糖

答案 A

89. 孕产期护理措施正确的是

- A. 新生儿出生后加用糖水
- B. 本病必须剖宫产结束分娩
- C. 饮食控制对疾病不利
- D. 减少活动保证孕期顺利
- E. 口服降糖药对胎儿无害

答案 A

(90~92 题共用题干)

患儿男，5 个月。出生于北方 11 月份，人工喂养，未添加辅食、多汗、烦躁、睡眠不安、夜间啼哭 1 周、诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。

90. 该患儿目前处于疾病的

- A. 暴发期
- B. 后遗症期
- C. 恢复期
- D. 初期
- E. 激期

答案 D

91. 护士在对家长进行健康指导时，错误的是

- A. 按时遵医嘱使用维生素 D



- 
- B. 尽量坚持口服维生素 D
  - C. 避免过早、过久地坐、站、走
  - D. 冬季室内活动时无需开窗以防着凉，阳光透过即可
  - E. 定期领患儿进行室外活动

答案 D

92. 该患儿口服维生素 D 治疗量后一个月，改剂量为每日

- A. 400IU
- B. 350IU
- C. 250IU
- D. 300IU
- E. 200IU

答案 A

(93-94 题共用题干)

患者女，27 岁，心慌气短 8 年，反复咯血 2 年。近 2 日咯血加重而就诊。查体：双颊紫红，唇发绀。呼吸困难。双肺底闻及湿啰音较多。脉搏一强一弱，心率 126 次/min，律齐。心尖区第一心音前有隆隆样杂音。颈静脉无怒张，肝未触及。腹无移动性浊音。下肢不肿。

93. 该患者脉搏一强一弱提示

- A. 右室功能衰竭
- B. 左房功能衰竭
- C. 左室功能衰竭
- D. 右房功能衰竭
- E. 全心功能衰竭

答案 A

94. 心尖区第一心音前隆隆样杂音提示

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣狭窄
- C. 心包炎
- D. 二尖瓣关闭不全
- E. 主动脉瓣狭窄

答案 B

(95—98 题共用题干)

患者男。35 岁。心脏骤停初期复苏成功。但患者意识不清，心电图示三度房室传导阻滞，需继续行二期复苏和后期复务苏。

95. 该患者首选的给药途径是

- A. 肌内注射
- B. 静脉注射
- C. 心内注射
- D. 气管内滴注
- E. 皮下注射

答案 B

96. 心脏复苏的首选药物是

- A. 利多卡因
- B. 异丙肾上腺素
- C. 阿托品
- D. 肾上腺素
- E. 去甲肾上腺素

答案 D

97. 复苏过程中心电图示心室纤颤，此时最有效的治疗方法是

- A. 应用阿托品
- B. 应用肾上腺素
- C. 电击除颤
- D. 加用碳酸氢钠
- E. 应用利多卡因

答案 C

98. 患者后期复苏采用了低温治疗，需持续时间至

- A. 体温 33C~35C
- B. 肌张力正常
- C. 血压平稳
- D. 神志恢复
- E. 呼吸均匀

答案 D

(99~100 题共用题干)

患者男。25 岁，胸部受伤住院 5 天后突发寒战、高热，胸痛，呼吸急促，体检：体温 39.2° C，呼吸 26 次/分，脉搏 100 次/分，血压 130/85mmHg，右胸部饱满，呼吸音消失，叩诊呈浊音，X 线检查示右胸腔积液。



---

99. 为明确诊断，简单而可靠的方法是

- A. B 超检查
- B. CT 检查
- C. 胸膜腔穿刺
- D. 血常规检查
- E. 剖胸探查

答案 C

100. 目前对该患者主要的处理措施是

- A. 抗感染
- B. 镇痛
- C. 胸腔穿刺抽脓
- D. 吸氧
- E. 降温



金英杰医学®  
JINYINGJIE.COM