

口腔解剖学---牙体之恒牙 2

31. 邻面接触区的正确位置是（ ）

- A. 前牙在切 1 / 3，后牙在牙合 1 / 3
- B. 前磨牙在牙合 1 / 3 偏舌侧
- C. 前磨牙在牙合 1 / 3 偏中 1 / 3
- D. 磨牙在牙合 1 / 3 偏颊侧
- E. 磨牙在牙合 1 / 3 偏舌侧

32. 端生牙是指（ ）

- A. 除生长在颌骨表面，还生长在黏膜表面的牙
- B. 牙集中分布于颌骨表面
- C. 此类牙无牙根，借纤维附着于颌骨边缘
- D. 此类牙有牙根，借纤维附着于颌骨边缘
- E. 爬行纲属端生牙

33. 上颌第一磨牙的斜嵴是由（ ）

- A. 近中颊尖三角嵴与远中舌尖三角嵴相连
- B. 近中颊尖三角嵴与近中舌尖三角嵴相连
- C. 远中颊尖三角嵴与近中舌尖三角嵴相连
- D. 远中颊尖三角嵴与远中舌尖三角嵴相连
- E. 由牙尖的两斜面相遇而成的嵴

34. 颊尖偏向远中的牙是（ ）

- A. 下 4
- B. 上 4

C.下 5

D.上 5

E.全部都是

35. 对建立正常的咬合关系起重要作用，应尽量保留，避免拔除的牙是

()

A. 尖牙

B. 第一前磨牙

C. 第二前磨牙

D. 第一磨牙

E. 第二磨牙

36. 拔除那个切牙时最宜用旋转力 ()

A. 上颌中切牙

B. 上颌侧切牙

C. 下颌中切牙

D. 下颌侧切牙

E. 个切牙均可

37. 关于上颌第一磨牙外形高点哪项是正确的 ()

A. 颊面外形高点在颊面中 1/3 处

B. 舌面外形高点在舌面颈 1/3 处

C. 近中邻面外形高点在颈 1/3 处

D. 远中面外形高点在颊面颈 1/3 处

E. 舌面外形高点在舌面中 1/3 处

38. 牙体组织中最硬的组织是（ ）

- A. 牙骨质
- B. 牙本质
- C. 牙釉质
- D. 牙髓
- E. 牙槽骨

39. 上颌尖牙唇轴嵴正确的是（ ）

- A. 唇轴嵴与颈嵴约相平行
- B. 由颈缘延至中 1 / 3 处
- C. 由牙尖的顶端伸延至中 1 / 3 处
- D. 由颈缘延至颈 1 / 3 处
- E. 由牙尖的顶端伸延至颈 1 / 3 处

40. 下颌中切牙不正确的描述是（ ）

- A. 牙冠宽度约为上颌中切牙的 1 / 3
- B. 牙冠宽度约为上颌中切牙的 2 / 3
- C. 近中缘于远中缘对称
- D. 近中切角与远中切角约相等
- E. 全口牙中最小者

41. 下列对下颌尖牙牙冠唇面形态描述哪个不正确（ ）

- A. 牙尖的近中斜缘约占唇面宽度的 1 / 3
- B. 牙尖的远中斜缘约占唇面宽度的 2 / 3
- C. 两斜缘的交角为 90°

D.唇轴嵴止于牙冠中 1 / 3 处

E.冠与根的近中缘相延续呈直线

42. 下颌第一磨牙合面的发育沟有（ ）

A. 颊沟、近中沟、远中沟

B. 颊沟、舌沟、近中沟、远中沟

C. 颊沟、舌沟、近中沟、远中沟、远中舌沟

D. 颊沟、舌沟、近中沟、远中沟、远中颊沟

E. 颊沟、舌沟、中央沟

43. 上颌第一磨牙牙冠颊面形态错误的是（ ）

A. 近远中宽度大于合颈高度

B. 近中缘长而直，远中缘稍短而突

C. 合缘长于颈缘

D. 近中颊尖宽于远中颊尖

E. 外形高点在颈 1/3 与中 1/3 交界处

44. 上颌第一磨牙牙根描述错误的是（ ）

A. 由三根组成，三根分开

B. 两根在颊侧，一根在舌侧

C. 两颊根相距较远

D. 颊根与舌根之间分开较远

E. 牙根未分叉部分叫根干

45. 在磨牙组中哪个牙的远中根可分为颊舌二根（ ）

A. 下颌第一磨牙

B.下颌第二磨牙

C.第三磨牙

D.上颌第一磨牙

E.上颌第二磨牙

46 上颌第一磨牙牙尖从大到小的顺序是（ ）

A.近中颊尖>远中颊尖>近中舌尖>远中舌尖

B.近中颊尖>近中舌尖>远中颊尖>远中舌尖

C.近中舌尖>远中舌尖>近中颊尖>远中颊尖

D.近中舌尖>近中颊尖>远中舌尖>远中颊尖

E.近中舌尖>近中颊尖>远中颊尖>远中舌尖

47. 下颌第一磨牙牙冠上不可能有的发育沟是（ ）

A.颊沟

B.远中颊沟

C.近中沟

D.远中沟

E.远中舌沟

48. 上颌第一磨牙舌面近中舌尖与远中舌尖之间的沟称为（ ）

A.舌沟

B.近中舌沟

C.远中舌沟

D.近中沟

E.远中沟

49. 下颌磨牙远中根可分为颊舌二根的是（ ）

- A. 下颌第一磨牙
- B. 下颌第二磨牙
- C. 下颌第三磨牙
- D. 下颌第一、二磨牙
- E. 下颌第二、三磨牙

50. 上颌第一前磨牙近远中接触区的位置是（ ）

- A. 近远中接触区均在颊 1 / 3 近合缘处
- B. 近远中接触区均在中 1 / 3 近合缘处
- C. 近远中接触区均在舌 1 / 3 近合缘处
- D. 近中接触区在颊 1 / 3 近合缘处，远中接触区在中 1 / 3 近合缘处
- E. 近中接触区在中 1 / 3 近合缘处，远中接触区在颊 1 / 3 近合缘处

51. 哺乳纲动物牙形及附着于颌骨的方式为（ ）

- A. 同形牙，有较完善的牙根，位于颌骨的牙槽窝内
- B. 同形牙，无牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘
- C. 异形牙，牙根发达，深埋于颌骨的牙槽窝内
- D. 同形牙，有较完善的牙根，借纤维膜附着于颌骨的边缘
- E. 异形牙，牙根小，埋于颌骨的一侧

52. 下述对上颌第二前磨牙合面形态描述中正确的是（ ）

- A. 颊缘大于舌缘的宽度
- B. 合面为显著的六边形
- C. 颊尖高大，舌尖短小

D. 近远中点隙相距较近

E. 中央窝窄而深

53. 下颌第一前磨牙的横嵴将合面分成（ ）

A. 较大的三角形近中窝，较小的长圆形远中窝

B. 较小的三角形近中窝，较大的长圆形远中窝

C. 较大的长圆形近中窝，较小的三角形远中窝

D. 较小的长圆形近中窝，较大的三角形远中窝

E. 近远中窝相近，均为三角形

54. 下颌第一磨牙有 5 个牙尖，它们的大小顺序是（ ）

A. 近中颊尖 > 远中颊尖 > 近中舌尖 > 远中舌尖 > 远中尖

B. 近中颊尖 > 近中舌尖 > 远中颊尖 > 远中舌尖 > 远中尖

C. 近中舌尖 > 近中颊尖 > 远中颊尖 > 远中舌尖 > 远中尖

D. 近中舌尖 > 远中舌尖 > 近中颊尖 > 远中颊尖 > 远中尖

E. 远中颊尖 > 近中颊尖 > 近中舌尖 > 远中舌尖 > 远中尖

55. 下述上颌第一、第二磨牙间形态差别哪个是错误的（ ）

A. 上颌第二磨牙极少有第五牙尖

B. 上颌第二磨牙的斜嵴不如第一磨牙明显

C. 上颌第二磨牙近远中舌尖大小差别不如上颌第一磨牙悬殊

D. 上颌第二磨牙颊侧两根分叉度较小

E. 上颌第二磨牙颊根与舌根的分叉度较小

56. 上颌第一前磨牙合面中央窝内近远中向的发育沟称为（ ）

A. 近中沟

- B.远中沟
- C.近远中沟
- D.中央沟
- E.中央近远中沟

57.上颌第一磨牙（ ）

- A.近颊合角、远舌合角为锐角；远颊合角，近舌合角为钝角
- B.近颊合角、远舌合角为钝角；远颊合角，近舌合角为锐角
- C.近颊合角、远颊合角为钝角；远舌合角，近舌合角为锐角
- D.近颊合角、远颊合角为锐角；远舌牙合角，近舌合角为钝角
- E.近颊合角为直角，远颊合角为钝角

58.下列对上颌第一前磨牙的描述中错误的是（ ）

- A.颊尖略偏远中，舌尖略偏近中
- B.颊面外形高点在中 $1/3$ 处
- C.邻面是四边形
- D.有近中沟
- E.有半数分为颊舌二根

59.下颌第二磨牙合面的发育沟是（ ）

- A.颊沟、近中沟、远中沟
- B.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟
- C.颊沟、舌沟、近中沟、远中沟、远中颊沟
- D.颊沟、舌沟、远中舌沟
- E.颊沟、舌沟、近中沟

60.一个 68 岁患者，因牙齿缺失，欲行义齿修复，患者主诉多年来口内多数牙都因龋坏松动拔除或自行脱落。临床检查发现：口内仅剩四个尖牙。而且松动度在 I 度以内，除牙尖有明显磨耗外.无龋坏，四个尖牙之所以还能留在口内的原因，从牙体解剖的角度分析，其原因是（ ）

- A.尖牙位于口角，口角有促进牙齿自洁的作用
- B.尖牙的牙根长，而且牙冠各面光滑，自洁作用好
- C.尖牙的作用是穿刺和撕裂食物，这种作用有利于牙齿稳固
- D.从牙体解剖的角度无法说尖牙比其它牙在口内保留时间更长
- E.以上都不是