



金英杰直播学院

中医专业
金英杰医学
JINYINGJIE.COM
中医外科

100 考点
整理教辅:荞麦
2021 年 5 月 28 日

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

1. 消法是运用不同的治疗方法和方药，使初起的肿疡得到消散，不使邪毒结聚成脓，是一切肿疡初起的治法总则。适用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病以及各种皮肤疾病。

2. 托法是用补益气血和透脓的药物，扶助正气，托毒外出，以免毒邪扩散和内陷治疗法则。适用于外疡中期，即成脓期。分为补托和透托两种方法。

3. 补法是用补养的药物，恢复其正气，助养其新生，使疮口早日愈合的治疗方法。适用于溃疡后期。

4. 切口选择以便于引流为原则，选择脓腔最低点或最薄处进刀。

结扎法又名缠扎法，是通过结扎，促使病变部位经络阻滞，气血不通或病变组织失去营养而致逐渐坏死脱落，从而达到治疗目的的一种方法。

5.挂线法采用普通丝线、药制丝线、纸裹药线或橡皮筋线等来挂断瘘管或窦道的治疗方法。

6.疖特点肿势局限，范围多小于 3 cm，突起根浅，色红、灼热、疼痛，易脓、易溃、易敛。

7.有头疖中心有一脓头，出脓即愈。

8.无头疖无脓头，表面灼热，触之疼痛，2~3 天化脓，溃后多迅速愈合。

9.蝼蛄疖多发生于儿童头部。

10.热毒蕴结证治法：清热解毒。方药：五味消毒饮、黄连解毒汤加减。

- 11.暑热浸淫证治法：清暑化湿解毒。方药：清暑汤加减。
- 12.体虚毒恋，阴虚内热证治法：养阴清热解毒。方药：仙方活命饮合增液汤加减。
- 13.体虚毒恋，脾胃虚弱证治法：健脾和胃，清化湿热。方药：五神汤合参苓白术散加减。
- 14.初起，小者用千捶膏盖贴或三黄洗剂外搽；大者用金黄散或玉露散，以金银花露或菊花露调成糊状敷于患处，或紫金锭水调外敷。
- 15.脓成，宜切开排脓，掺九一丹、太乙膏盖贴；深者可用药线引流。脓尽用生肌散掺白玉膏收口。蝼蛄疖，宜作十字形剪开。
- 16.颜面部疔疮好发于颜面部；疮形虽小，根脚坚硬，如钉丁之状，初起有粟米样脓头；易发走黄而危及生命。
- 17.手足部疔疮发病部位多有受伤史。
- 18.红丝疔发于四肢，先有手足疔疮或皮肤破损，红肿热痛，继则患肢内侧皮肤出现红丝一条或数条，迅速向躯干方向走窜，可伴恶寒发热等症状；邪毒重者可内攻脏腑，发生走黄。
- 19.颜面部疔疮
热毒蕴结证治法：清热解毒。方药：五味消毒饮、黄连解毒汤加减。
火毒炽盛证治法：凉血清热解毒。方药：犀角地黄汤、黄连解毒汤、五味消毒饮加减。
- 20.红丝疔
火毒入络证治法：清热解毒。方药：五味消毒饮加减。
火毒入营证治法：凉血清营，解毒散结。方药：犀角地黄汤、黄连解

毒汤、五味消毒饮加减。

21.手足部疔疮成脓期宜及早切开排脓，一般应尽可能循经切开。

22.红丝疔外治红丝细者，宜用砭镰法。

23.定义和特点发生于体表肌肉之间，局部光软无头，红肿疼痛；结块范围多在 6~9 cm 左右；发病迅速；易肿、易脓、易溃、易敛；或伴有恶寒发热，口渴等全身症状；一般不会损伤筋骨，也不易造成内陷。

24.火毒凝结证治法：清热解毒，行瘀活血。方药：仙方活命饮加减。

25.热胜肉腐证治法：和营清热，透脓托毒。方药：仙方活命饮合五味消毒饮加减。

26.气血两虚证治法：益气养血，托毒生肌。方药：托里消毒散加减。

27.颈痈多见于儿童，冬春季易发。发病前多有乳蛾、口疳、龋齿或头面疮疖，或附近皮肤黏膜破伤病史。多生于颈旁两侧，也可发生于耳后、项后、颌下、颏下。

28.风热痰毒证治法：散风清热，化痰消肿。方药：牛蒡解肌汤或银翘散加减。

29.发定义病变范围较广大的急性化脓性疾病。

30.锁喉痈的治疗

痰热蕴结证治法：散风清热，化痰解毒。方药：普济消毒饮加减。

热胜肉腐证治法：清热化痰，和营托毒。方药：仙方活命饮加减。

热伤胃阴证治法：清养胃阴。方药：益胃汤加减。

31.外治

初起，用玉露散或金黄散或双柏散以金银花露或菊花露调敷；成脓后，

应及早切开，用九一丹药线引流，外盖金黄膏或红油膏；脓尽，用生肌散、白玉膏。

32.湿火蕴结证治法：清热解毒，和营化湿。方药：黄连解毒汤合仙方活命饮加减。

33.湿痰凝滞证治法：和营活血，利湿化痰。方药：桃红四物汤合仙方活命饮加减。

34.气血两虚证治法：调补气血。方药：八珍汤加减。

35.外治

未溃时，红热明显的用玉露膏；红热不显的用金黄膏或冲和膏外敷。

成脓后，宜切开排脓。待腐黑坏死组织与正常组织分界明显时，可以切开，切口应注意低位、够大够深，并清除腐肉。

溃后，用八二丹、红油膏盖贴，脓腔深者用药线引流；脓尽用生肌散、白玉膏收口；疮口有空腔不易愈合者，用垫棉法。

36.有头疽定义及特点发生于肌肤间急性化脓性炎症。好发于颈后，背部等皮肤厚韧处，多见于中老年人及消渴病患者，并容易发生内陷。

37.火毒凝结证治法：清热泻火，和营托毒。方药：黄连解毒汤合仙方活命饮加减。

38.湿热壅滞证治法：清热化湿，和营托毒。方药：仙方活命饮加减。

39.阴虚火炽证治法：滋阴生津，清热托毒。方药：竹叶黄芪汤加减。

40.气虚毒滞证治法：扶正托毒。方药：八珍汤合仙方活命饮加减。

41.流注特点好发于四肢躯干肌肉丰厚处的深部，发病急骤，局部漫肿疼痛，皮色如常，容易走窜，常见此处未愈，他处又起。

42.余毒攻窜证治法：清热解毒，凉血通络。方药：黄连解毒汤合犀角地黄汤加减。

43.暑湿交阻证治法：解毒清暑化湿。方药：清暑汤加减。

44.瘀血凝滞证治法：和营活血，祛瘀通络。方药：活血散瘀汤加减。

45.丹毒临床特点及不同部位丹毒的病名

丹毒是指患部皮肤突然发红成片、色如涂丹的急性感染性疾病。其特点是突然起病，恶寒发热，局部皮肤忽然变赤，色如丹涂脂染，焮热肿胀，边界清楚，迅速扩大，数日内可逐渐痊愈，但容易复发。根据其发病部位的不同，丹毒有不同的病名，生于躯干部——内发丹毒；发于头面部——抱头火丹；发于小腿足部的一流火；新生儿臀部的——赤游丹毒。

46.风热毒蕴证治法：疏风清热解毒。方药：普济消毒饮加减。

47.肝脾湿火证治法：清肝泻火利湿。方药：柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤加减。

48.湿热毒蕴证治法：利湿清热解毒。方药：五神汤合萆薢渗湿汤加减。

49.胎火蕴毒证治法：凉血清热解毒。方药：犀角地黄汤合黄连解毒汤

50.走黄（助理不考）定义疔疮火毒炽盛，早期失治，毒势未能及时控制，走散入营，内攻脏腑而引起的一种全身性危急疾病。又名癀走。

51.内陷（助理不考）定义是疮疡阳证疾患过程中，因正气内虚，火毒炽盛，导致毒邪走散，正不胜邪，毒不外泄，反陷入里，客于营血，内传脏腑的一种危急疾病。

52.乳痈特点多见于产后3~4周的哺乳期妇女。

53. 气滞热壅证治法：疏肝清胃，通乳消肿。方药：瓜蒌牛蒡汤加减。
54. 热毒炽盛证治法：清热解毒，托里透脓。方药：透脓散加味。
55. 正虚毒恋证治法：益气和营托毒。方药：托里消毒散加减。
56. 特点单侧或双侧乳房胀痛并出现肿块，多位于外上象限。乳痛和肿块与月经周期及情志变化密切相关。好发于 25 ~ 45 岁中青年女性。
57. 肝郁痰凝证治法：疏肝解郁，化痰散结。方药：逍遥蒌贝散加减。
58. 冲任失调证治法：调摄冲任。方药：二仙汤合四物汤加减。
59. 乳核特点好发于 20 ~ 25 岁的青年妇女，乳中结核，形如丸卵，边界清楚，表面光滑，推之活动。
60. 内治
- 肝气郁结证治法：疏肝解郁，化痰散结。方药：逍遥散加减。
- 血瘀痰凝证治法：疏肝活血，化痰散结。方药：逍遥散合桃红四物汤加山慈姑、海藻。
61. 乳岩特点乳房部出现无痛、无热、皮色不变而质地坚硬的肿块，推之不移，表面不光滑，凹凸不平，或乳头溢血，晚期溃烂，凹如泛莲。
62. 肝郁痰凝证治法：疏肝解郁，化痰散结。方药：神效瓜蒌散合开郁散加减。
63. 冲任失调证治法：调摄冲任，理气散结。方药：二仙汤合开郁散加减。
64. 正虚毒炽证治法：调补气血，清热解毒。方药：八珍汤加减。
65. 气血两亏证治法：补益气血，宁心安神。方药：人参养荣汤加味。
66. 脾虚胃弱证治法：健脾和胃。方药：参苓白术散或理中汤加减。

67.气瘿点多发生在青春期，甲状腺呈弥漫性肿大，质软不痛，皮色正常，腺体随吞咽动作而上下移动，可压迫气管、食管、血管、神经等而引起各种症状。

68.肉瘿特点颈前喉结一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之瘿，随吞咽上下移动，发展缓慢。

69.气滞痰凝证治法：理气解郁，化痰软坚。方药：逍遥散合海藻玉壶汤加减。

70.气阴两虚证治法：益气养阴，软坚散结。方药：生脉散合海藻玉壶汤加减。

71.瘿痛

1.特点结喉两侧结块，色红灼热，疼痛肿胀，甚而化脓，常伴有发热、头痛等症状。

72.石瘿特点结喉两侧结块，坚硬如石，高低不平，推之不移。

治疗石瘿为恶性肿瘤，一旦确诊，宜早期手术切除。

73.脂瘤特点本病好发于青春期。多见于头面部、臀部、背部等皮脂腺、汗腺丰富的部位，生长缓慢，一般无明显自觉症状。

74.血瘤特点可发生于身体任何部位，大多数为先天性。病变局部色泽鲜红或暗紫，或呈局限性柔软肿块，边界不清，触之如海绵状。

75.肉瘤发于皮里膜外，软似棉，肿似馒，皮色不变，不紧不宽，如肉之隆起。多见于成年女性，好发于肩、背、腹、臀及前臂皮下。大小不一，边界清楚。

76.蛇串疮特点皮肤上出现红斑、水疱或丘疱疹，累累如串珠，排列成

带状，沿一侧周围神经分布区出现。

77.疣目发于手背、手指、头皮等处者。

78.扁瘊发于颜面、手背、前臂等处。

79.鼠乳发于胸背部有跖窝的赘疣。

80.跖疣发于足跖部者。

81.头癣①白秃疮多见于学龄儿童，男性多于女性。②肥疮为头癣中最常见的一种，多见于农村，好发于儿童。

82.手足癣 鹅掌风以成年人多见，男女老幼均可染病。多数为单侧发病，也可波及双手。病程为慢性，反复发作。

②脚湿气以脚丫糜烂瘙痒伴有特殊臭味而得名。多发于成年人，儿童少见。夏秋病重，主要发生在趾缝，也见于足底。

83.体癣①股癣发于股跨、外阴等处者，称阴癣（股癣）。以青壮年男性多见，多发于夏季，好发于面部、颈部、躯干及四肢近端。

②圆癣皮损特征为环形或多环形、边界清楚、中心消退、外围扩张的斑块。

84.花斑癣常发于多汗体质青年，可在家庭中互相传染。皮损好发于颈项、躯干，尤其是多汗部位及四肢近心端，为大小不一、边界清楚的圆形或不规则的无炎症性斑块，常夏发冬愈，复发率高。

85.白屑风特点头发、皮肤多脂发亮，油腻，瘙痒，脱而复生。以青壮年为多，乳儿期亦有发生。

86.油风特点突然发生斑片状脱发，脱发区皮肤变薄，多无自觉症状。可发生于任何年龄，多见于青年，男女均可发病。

87.湿疮特点皮损对称分布，多形损害，剧烈瘙痒，有渗出倾向，反复发作，易成慢性等。

88.瘾疹瘾疹包括急性荨麻疹，慢性荨麻疹，特殊荨麻疹。

89.内治

①风寒束表证治法：疏风散寒，止痒。方药：麻黄桂枝各半汤加减。

②风热犯表证治法：疏风清热，止痒。方药：消风散加减。

③胃肠湿热证治法：疏风解表，通腑泄热。方药：防风通圣散加减。

④血虚风燥证治法：养血祛风，润燥止痒。方药：当归饮子加减。

90.牛皮癣特点皮损多为圆形或多角形的扁平丘疹融合成片，剧烈瘙痒，搔抓后皮损肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，极易形成苔藓样变。

91.

①肝郁化火证治法：疏肝理气，清肝泻火。方药：龙胆泻肝汤加减。

②风湿蕴肤证治法：祛风利湿，清热止痒。方药：消风散加减。

③血虚风燥证治法：养血润燥，息风止痒。方药：当归饮子加减。

92.白疕特点皮损初起为针头大小的丘疹，逐渐扩大可融合成形态不同的斑片，边界清楚，表面覆盖多层干燥银白色鳞屑，刮除鳞屑则露出发亮的半透明的薄膜，为薄膜现象。

93.治疗

(1) 血热内蕴证治法：清热凉血，解毒消斑。方药：犀角地黄汤加减。

(2) 血虚风燥证治法：养血滋阴，润肤息风。方药：当归饮子加减。

(3) 气血瘀滞证治法：活血化瘀，解毒通络。方药：桃红四物汤加减。

(4) 湿毒蕴阻证治法：清利湿热，解毒通络。方药：萆薢渗湿汤加减。

(5) 火毒炽盛证治法：清热泻火，凉血解毒。方药：清瘟败毒饮加减。

95.淋病特点有不洁性交或间接接触传染史，有潜伏期，一般为2~10天，平均3~5天。有急、慢性之分，症状有男、女之分。

96.梅毒分期：可分为一期、二期、三期梅毒。

97.内痔①Ⅰ期：便时带血，滴血或呈喷射状出血，便后出血可自行停止，无痔脱出。②Ⅱ期：常有便血，排便时有痔脱出，便后自行回纳。③Ⅲ期：偶有便血，排便或久站、咳嗽劳累、负重时痔脱出，需用手换纳。④Ⅳ期：内痔平时或腹压稍大时痔核即脱出肛外，手托亦常不能复位，痔核经常位于肛外，易感染，形成水肿、糜烂和坏死，疼痛剧烈。

98.外痔①结缔组织性外痔。②静脉曲张性外痔。③血栓性外痔。

99.血栓性外痔的治疗

血热瘀结证治法：清热凉血，散瘀消肿。方药：凉血地黄汤合活血散瘀汤加减。

100.特点发病男性多于女性，尤以青壮年为多，主要表现为肛门周围疼痛、肿胀、有结块，伴有不同程度发热、倦怠等全身症状。







金英杰医学
JINYINGJIE.COM



中医金鹰



中医王牌重读



中医王牌退费



课表公众号



中西医金鹰



中西医王牌重读



中西医王牌退费

