

巅峰计划临高端班-测评诊断试题-儿科

本套试卷共 100 题，每个人只能作答一次，请慎重填写👊

您的姓名： [填空题] *

1.儿童死亡率最高的时期是 [单选题] *

- A.新生儿期
- B.胎儿期
- C.婴儿期
- D.幼儿期
- E.围生期(正确答案)

2.最易受外界不良因素影响而发生夭折，先天畸形和遗传性疾病的胎龄是 [单选题]

*

- A.16 周内
- B.12 周内(正确答案)
- C.28 周内
- D.20 周内
- E.24 周内

3.小儿生长发育的规律不包括 [单选题] *

- A.个体差异
- B.各器官系统发育不平衡
- C.连续性、非匀速性、阶段性
- D.自下而上(正确答案)

E.两个高峰期

4.小儿出生后各系统、器官的生长发育不平衡，呈现先快后慢的是 [单选题] *

A.呼吸系统

B.淋巴系统(正确答案)

C.消化系统

D.生殖系统

E.神经系统

5.小儿体格的两次生长高峰是 [单选题] *

A.学龄期、青春期

B.新生儿期、婴儿期

C.婴儿期、青春期(正确答案)

D.新生儿期、幼儿期

E.幼儿期、学龄前期

6.小儿出牙延迟的判断标准是 [单选题] *

A.>4 个月未出牙

B.>24 个月未出牙

C.>6 个月未出牙

D.>13 个月未出牙(正确答案)

E.>10 个月未出牙

7.一正常婴儿，体重 7.5 kg，身高 68 cm。前囟 1.0 cm，头围 44 cm，出牙 4 个。能独坐 并能以拇指、示指拿取小球，该儿最可能的月龄是 [单选题] *

A.24 个月

B.5 个月

C.12 个月

D.8 个月(正确答案)

E.18 个月

8.新生儿期计划免疫应接种的疫苗是 [单选题] *

A.脊髓灰质炎与百白破三联混合疫苗

B.卡介苗与百白破三联混合疫苗

C.卡介苗与乙肝疫苗(正确答案)

D.乙肝疫苗与麻疹疫苗

E.脊髓灰质炎糖丸与麻疹疫苗

9.6 个月以下小儿计划免疫预防接种不包括 [单选题] *

A.乙肝疫苗

B.脊髓灰质炎疫苗

C.麻疹疫苗(正确答案)

D.百白破疫苗

E.卡介苗

10.男婴，3 个半月。3 周前曾患肺炎，计划免疫接种程序，此时应接种 [单选题] *

A.百白破混合制剂第一针(正确答案)

B.麻疹疫苗第一针

C.乙肝疫苗第二针

D.百白破混合制剂第二针

E.脊髓灰质炎糖丸第一次

11.小儿乙肝疫苗的接种时间为 [单选题] *

A.1、2、3 个月

- B.0、2、3个月
- C.0、2、6个月
- D.0、1、2个月
- E.0、1、6个月(正确答案)

12.脊髓灰质炎初种的年龄应自什么时候开始 [单选题] *

- A.1个月
- B.2个月(正确答案)
- C.3个月
- D.4个月
- E.5个月

13.初种麻疹减毒活疫苗的时间是 [单选题] *

- A.生后2个月
- B.生后4个月
- C.生后8个月(正确答案)
- D.4岁时加强一次
- E.8岁时加强一次

14.下列何者为卡介苗的初种年龄 [单选题] *

- A.生后3天(正确答案)
- B.3天~3个月
- C.4天~4个月
- D.5天~5个月
- E.6天~6个月

15.小儿营养中最主要的能量来源是 [单选题] *

- A.矿物质
- B.糖类(正确答案)
- C.脂类
- D.膳食纤维
- E.蛋白质

16.母乳与牛乳相比，对母乳特点的描述中错误的是 [单选题] *

- A.含饱和脂肪酸较多(正确答案)
- B.乳糖含量高
- C.含白蛋白多，酪蛋白少
- D.钙磷比例适宜
- E.铁吸收率高

17.人工喂养的婴儿估计每日奶量的计算是根据 [单选题] *

- A.能量需要量(正确答案)
- B.胃容量
- C.身高
- D.体表面积
- E.年龄

18.母乳与牛乳相比，营养丰富，易于消化，是因为母乳中 [单选题] *

- A.蛋白质含量高
- B.含酪蛋白多
- C.含白蛋白、球蛋白较多(正确答案)
- D.含饱和脂肪酸多
- E.含甲型乳糖高

19.新生儿，足月顺产，出生体重 3.3 kg。无新生儿窒息。开奶的时间为产后 [单选题] *

A.24 小时

B.23 小时

C.6 小时

D.12 小时

E.15 分钟至 2 小时内(正确答案)

20..关于小儿维生素 D 缺乏佝偻病的预防措施，不正确的是 [单选题] *

A.适当多晒太阳

B.孕母补充维生素 D 及钙剂

C.早产儿 2 个月时开始补充维生素 D(正确答案)

D.提倡母乳喂养

E.及时添加辅食

21..维生素 D 缺乏性佝偻病初期的临床表现是 [单选题] *

A.胸廓畸形

B.非特异性神经精神症状(正确答案)

C.方颅

D.运动发育迟缓

E.肌肉关节松弛

22.维生素 D 缺乏性佝偻病冬春季多见的病因是 [单选题] *

A.皮肤接触日光中紫外线较少(正确答案)

B.食物中维生素 D 含量不足

C.婴儿食物中钙磷含量少

D.婴儿生长快，钙磷需要量大

E.疾病的影响

23.佝偻病激期的血生化变化是 [单选题] *

- A.血钙稍降低，血磷明显降低，钙磷乘积降低，碱性磷酸酶明显升高(正确答案)
- B.血钙升高，血磷降低，钙磷乘积降低，碱性磷酸酶升高
- C.血钙降低，血磷升高，钙磷乘积降低，碱性磷酸酶升高
- D.血钙降低，血磷降低，钙磷乘积升高，碱性磷酸酶降低
- E.血钙降低，血磷降低，钙磷乘积升高，碱性磷酸酶升高

24.女婴，4个月。烦躁，多汗半月，夜间哭闹不停。其冬季出生，足月顺产，但纯牛奶喂养，未添加辅食。查体：体重6kg，有颅骨软化。最可能的诊断是 [单选题] *

- A.维生素A缺乏
- B.维生素D缺乏性佝偻病(正确答案)
- C.蛋白质-能量营养不良
- D.维生素D缺乏性手足搐搦症
- E.缺铁性贫血

25.男婴，10个月。经常出现夜惊，近1周加重，多汗烦闷，该患儿生后一直混合喂养，未添加辅食，此患儿体格检查最可能发现的阳性体征为 [单选题] *

- A.面色苍白
- B.方颅，乳牙未萌出(正确答案)
- C.肌张力增高
- D.皮下脂肪明显减少
- E.皮肤弹性差

26.患儿女，11个月。多汗，烦躁，睡眠不安，可见肋膈沟，下肢轻度“O”形腿。血清钙稍低，血磷降低，碱性磷酸酶增高。其佝偻病应处于 [单选题] *

A.前驱期

B.初期

C.激期(正确答案)

D.恢复期

E.后遗症期

27.隐匿型维生素 D 缺乏性手足搐搦症特有的阳性体征是 [单选题] *

A.布氏征

B.霍夫曼征

C.面神经征(正确答案)

D.克氏征

E.巴氏征

28.维生素 D 缺乏性手足搐搦症与佝偻病发病机理的不同点在于 [单选题] *

A.钙吸收代谢障碍

B.磷吸收代谢障碍

C.甲状旁腺功能不足(正确答案)

D.维生素 D 缺乏

E.神经系统兴奋性增高

29.维生素 D 缺乏性手足搐搦症喉痉挛主要见于 [单选题] *

A.婴儿(正确答案)

B.幼儿

C.学龄前儿童

D.学龄期儿童

E.以上都不是

30.女婴，5个月。3天内抽搐4次。发作时意识不清，持续2分钟，自行缓解，醒后活泼如常，不伴发热。实验室检查：血钙 1.73 mmol/L，血镁 1.00 mmol/L，血糖 3.9 mmol/L。最可能的诊断是 [单选题] *

A.维生素 D 依赖性佝偻病

B.低镁血症

C.低血糖症

D.婴儿痉挛症

E.维生素 D 缺乏性手足抽搐症(正确答案)

31.患儿，男，2岁。因间断性四肢抽搐1周就医。1日内无热惊厥发作十数次，脑电图无异常。发作后神志清醒，无神经系统症状。查体可见“鸡胸样”畸形和“O”形腿。实验室检查示：血 Ca^{2+} 1.45 mmol/L，血镁、尿镁正常。最有可能的诊断是 [单选题] *

A.维生素 D 缺乏性手足搐搦症(正确答案)

B.原发性甲状旁腺功能减退

C.婴儿痉挛症

D.低血糖症

E.低镁血症

32.关于新生儿呼吸系统生理特点的描述，正确的是 [单选题] *

A.肺表面活性物质至孕 28 周时迅速增加

B.肺表面活性物质是由肺泡 I 型上皮细胞产生

C.湿肺是由于肺部感染炎性渗出造成

D.足月儿生后第 1 小时呼吸频率可达 80~90 次/分

E.早产儿呼吸不规则，易出现呼吸暂停(正确答案)

33.对正常足月新生儿，暂不能引出的神经反射是 [单选题] *

A.腹壁反射(正确答案)

B.觅食反射

C.吸吮反射

D.握持反射

E.拥抱反射

34.出生后即有且终生存在的神经反射是 [单选题] *

A. 拥抱反射

B.膝腱反射(正确答案)

C.握持反射

D.觅食反射

E.腹壁反射

35.足月儿的定义是 [单选题] *

A.体重>2500 g 的新生儿

B.出生体重在同胎龄体重第 10~90 百分位者

C.胎龄≥37 周至<42 周的新生儿(正确答案)

D.胎龄>40 周的新生儿

E.胎龄>28 周的婴儿

36.符合早产儿指甲外观特点的是 [单选题] *

A.反甲

B.甲面多白纹

C.指甲超过指尖

D.指甲未达指尖(正确答案)

E.指甲硬

37.新生儿缺血缺氧性脑病最主要的治疗是 [单选题] *

- A.早期应用神经细胞营养药物
- B.新生儿期后的治疗
- C.早期运动功能训练
- D.早期应用脱水剂减轻脑水肿
- E.早期维持血糖、血气、血循环正常(正确答案)

38.判断新生儿缺血缺氧性脑病严重程度的主要依据是 [单选题] *

- A.血清 CPK-BB
- B.脑电图(正确答案)
- C.颅脑超声
- D.临床表现
- E.头颅 CT

39.新生儿缺血缺氧性脑病最主要的病因是 [单选题] *

- A.肺表面活性物质缺乏
- B.宫内感染
- C.围生期窒息(正确答案)
- D.脑卒中
- E.营养缺乏

40.新生儿缺氧缺血性脑病时发生惊厥，首选的药物是 [单选题] *

- A.甘露醇
- B.地塞米松
- C.苯巴比妥(正确答案)
- D.苯妥英钠
- E.呋塞米

41.患儿，女，1天。足月产，出生1分钟 Apgar 评分3分。查体：P 90次/分，R 30次/分，嗜睡，面色微绀，前囟饱满，心音低钝，四肢肌张力减低，拥抱反射消失。最可能的诊断是 [单选题] *

A.胎粪吸入综合征

B.新生儿败血症

C.新生儿低血糖

D.新生儿缺血缺氧性脑病(正确答案)

E.新生儿肺透明膜病

42.患儿女，出生30小时。出现嗜睡伴肌张力低下，初步诊断为缺氧缺血性脑病。为了解患儿丘脑、基底核有无病灶，应首选的检查是 [单选题] *

A.头颅CT

B.脑电图

C.颅脑透光试验

D.B超(正确答案)

E.头颅MRI

43.早产儿出生后立即出现进行性呼吸困难，最可能发生的疾病是 [单选题] *

A.先天性心脏病

B.胎粪吸入综合征

C.吸入性肺炎

D.湿肺

E.新生儿呼吸窘迫综合征(正确答案)

44.关于新生儿肺透明膜病，下列哪项是错误的 [单选题] *

A.胎龄越小，发病率越高

B.仅见于早产儿(正确答案)

- C.一般生后 6 小时以内出现症状
- D.X 线可见支气管充气征
- E.主要表现为进行性呼吸困难和紫绀

45.早产儿有呼吸暂停，主要是因为 [单选题] *

- A.肺泡数量相对少
- B.呼吸中枢相对不成熟(正确答案)
- C.肺泡表面活性物质少
- D.肋间肌肌力弱
- E.膈肌位置高

46.新生儿肺透明膜病的病因最正确的是 [单选题] *

- A.肺泡壁嗜伊红透明膜附着
- B.宫内吸入羊水中上皮细胞形成透明膜
- C.宫内感染导致肺部炎症渗出
- D.孕晚期给孕妇用激素治疗
- E.肺泡表面活性物质缺乏(正确答案)

47. 新生儿生后 24 小时内出现黄疸应考虑 [单选题] *

- A.生理性黄疸
- B.新生儿败血症
- C.新生儿溶血病(正确答案)
- D.先天性胆道闭锁
- E.新生儿脑膜炎

48.不符合新生儿生理性黄疸的原因是 [单选题] *

- A.红细胞的寿命短

- B.红细胞数量多
- C.红细胞内酶发育不成熟(正确答案)
- D.肠道内正常菌群尚未建立
- E.肝功能不成熟

49.男婴，生后 10 小时出现黄疸，母亲血型 O 型。有确诊意义的检查是 [单选题] *

- A.胆红素测定
- B.血型测定
- C.网织红细胞计数
- D.抗体释放试验(正确答案)
- E.血清游离抗体测定

50.对 21-三体综合征最具诊断价值的是 [单选题] *

- A.智力发育落后
- B.特殊愚型面容
- C.体格发育落后
- D.染色体核型分析(正确答案)
- E.通贯手

51.苯丙酮尿症早治疗的主要目的是 [单选题] *

- A.减少皮肤湿疹
- B.减少尿臭味
- C.使头发及皮肤颜色转为正常
- D.控制惊厥
- E.防止智力发育落后(正确答案)

52. 苯丙酮尿症患儿主要的神经系统异常表现是 [单选题] *

A.智能发育落后(正确答案)

B.肌张力增高

C.腱反射亢进

D.行为异常

E.惊厥

53.苯丙酮尿症属 [单选题] *

A.染色体畸变

B.常染色体显性遗传

C.常染色体隐性遗传(正确答案)

D.X 连锁显性遗传

E.X 连锁隐性遗传

54.较大儿童苯丙酮尿症初筛首选的检查是 [单选题] *

A.尿有机酸分析

B.血氨基酸分析

C.尿三氯化铁试验(正确答案)

D.尿蝶呤分析

E.Guthrie 细菌生长抑制试验

55.男孩儿，2岁，生后6个月发现智能发育落后，8个月出现惊厥，尿有异味儿。查体：T 36.5℃，P 100次/分，R 28次/分。目光呆滞，毛发棕黄，心肺腹未见明显异常。膝腱反射亢进。其饮食治疗中需限制摄入量的氨基酸是 [单选题] *

A.色氨酸

B.精氨酸

C.酪氨酸

D.赖氨酸

E.苯丙氨酸(正确答案)

56.先天性甲状腺功能减退症在新生儿期最早引起注意的临床表现是 [单选题] *

A.智能发育落后

B.特殊容貌

C.生长发育延迟

D.生理性黄疸时间延长(正确答案)

E.皮肤粗糙

57.地方性甲状腺肿的主要原因是 [单选题] *

A.遗传

B.海产品摄入过多

C.精神刺激

D.感染

E.缺碘(正确答案)

58.我国新生儿甲状腺功能减退症的筛查是用于筛查 [单选题] *

A.原发性甲状腺功能低下(正确答案)

B.下丘脑性甲状腺功能低下

C.垂体性甲状腺功能低下

D.桥本甲状腺炎

E.地方性甲状腺功能低下

59.新生儿甲减最早出现的症状为 [单选题] *

A.腹泻

B.贫血

C.生理性黄疸消退延迟(正确答案)

D.心率正常

E.体温低

60.关于甲状腺激素的主要生理作用，下列哪项是错误的 [单选题] *

A.促进新陈代谢

B.促进生长

C.增加酶活力

D.促进中枢神经系统发育

E.抑制脂肪分解和利用(正确答案)

61.先天性甲状腺功能减低症服用甲状腺制剂的治疗时间是 [单选题] *

A.1~2年(正确答案)

B.2~4年

C.4~6年

D.6~8年

终生

62.与散发性先天性甲状腺功能减退症病因无关的是 [单选题] *

A.促甲状腺激素不足

B.甲状腺发育不良

C.甲状腺激素合成障碍

D.甲状腺异位

E.碘缺乏(正确答案)

63.女婴，2个月。过期产，出生体重4 kg，出生后吃奶慢，便秘，大便6~7天一次，至今黄疸尚未完全消退。查体：哭声低哑，手脚凉，腹部膨隆。最可能的诊断是 [单选题] *

- A.习惯性便秘
- B.低血糖
- C.先天性甲状腺功能减退症(正确答案)
- D.新生儿肝炎综合征
- E.先天性巨结肠

64.男孩，2岁。诊断为先天性甲状腺功能减低症，应用L-甲状腺素钠治疗，剂量为每日50 μg，近几天患儿烦躁不安，多汗，腹泻。此时应 [单选题] *

- A.先密切观察不做特殊处理
- B.改用甲状腺干粉片
- C.立即停药
- D.减少剂量(正确答案)
- E.增加剂量

65.川崎病急性期最佳治疗药物是 [单选题] *

- A.丙种球蛋白
- B.糖皮质激素
- C.丙种球蛋白+阿司匹林(正确答案)
- D.阿司匹林
- E.糖皮质激素+阿司匹林

66.下列川崎病的治疗中，易发生冠状动脉瘤和影响冠脉修复，而不宜单独使用的是 [单选题] *

- A.阿司匹林
- B.泼尼松(正确答案)
- C.静脉注射丙种球蛋白
- D.双嘧达莫

E.心脏手术

67.下列哪一项不是川崎病的常见症状 [单选题] *

A.眼结合膜充血，无脓性分泌物

B.化脓性淋巴结炎(正确答案)

C.口腔黏膜弥漫充血和草莓舌

D.持续高热

E.手足肿胀和脱皮

68.小儿麻疹最常见的并发症是 [单选题] *

A.心肌炎

B.脑炎

C.肺炎(正确答案)

D.喉炎

E.结膜炎

69.麻疹患儿合并肺炎时应隔离至出疹后 [单选题] *

A.10天(正确答案)

B.14天

C.7天

D.21天

E.5天

70.麻疹患儿具有传染性的时期是 [单选题] *

A.接触麻疹后7天至出疹后5天

B.接触麻疹后7天至出疹时

C.出疹开始至出疹后7天

D.出疹后 3~7 天

E.出疹前 5 天至出疹后 5 天(正确答案)

71.典型麻疹的出疹顺序是 [单选题] *

A.先耳后、颈部，延及额面部，而后躯干、四肢

B.先耳后、四肢，后躯干、手掌、足心

C.先额部、面部，后躯干、四肢(正确答案)

D.先躯干，后四肢，最后头面部

E.先前胸，后背部，延及四肢、手心、足底

72.女孩，2 岁。发热、流涕、咳嗽 3 天，皮疹 6 小时。查体：精神萎靡，前额及耳后有浅红色斑丘疹，眼结膜充血，口腔黏膜粗糙，两肺呼吸音粗。最可能的诊断是 [单选题] *

A.麻疹(正确答案)

B.幼儿急诊

C.风疹

D.川崎病

E.咽结合膜热

73.风疹的典型临床表现是 [单选题] *

A.潜伏期 5~7 天

B.高热

C.热退后全身出疹

D.颈后、枕后、耳后淋巴结肿痛(正确答案)

E.出疹后脱皮

74.风疹的隔离期为 [单选题] *

A.出疹后 5 天(正确答案)

B.出疹后 3 周

C.出疹后 14 天

D.出疹后 10 天

E.出疹后 4 周

75.不符合幼儿急疹特点的是 [单选题] *

A.高热时可有惊厥

B.红色斑丘疹在颈及躯干多见

C.可有耳后淋巴结肿大

D.出疹期热度更高(正确答案)

E.高热 3~5 天

76.6 个月女婴，发热 3 天，T 39℃。查体：一般情况良好，咽充血，耳后淋巴结肿大，心肺无异常，肝脾未触及，患儿热退后皮疹出现。可能的诊断是 [单选题] *

A.风疹

B.麻疹

C.水痘

D.猩红热

E.幼儿急疹(正确答案)

77.水痘最常见的并发症为 [单选题] *

A.败血症

B.心肌炎

C.皮肤继发细菌感染(正确答案)

D.肺炎

E.脑炎

78.水痘的临床特点是 [单选题] *

- A.潜伏期 5~7 天
- B.热退后全身出疹
- C.皮疹呈斑疹、丘疹、疱疹、结痂并存(正确答案)
- D.皮疹常有融合
- E.疹退后皮肤留有棕色色素沉着

79.引起水痘的病原体是 [单选题] *

- A.水痘病毒
- B.带状疱疹病毒
- C.EB 病毒
- D.水痘-带状疱疹病毒(正确答案)
- E.单纯疱疹病毒

80.小儿初次感染结核杆菌，结核菌素实验呈阳性反应的时间是 [单选题] *

- A.12~16 周
- B.2~3 周
- C.4~8 周(正确答案)
- D.48~72 小时
- E.8~12 周

81.下列关于 PPD 试验的说法最准确的是 [单选题] *

- A.卡介苗接种成功，PPD 试验呈强阳性
- B.粟粒型肺结核 PPD 试验有时可呈阴性(正确答案)
- C.凡是 PPD 试验阴性可除外结核病
- D.PPD 试验阳性可肯定有结核病

E.初次感染结核菌后 2 周，PPD 试验呈阳性

82.做 PPD 试验后观察结果的时间为 [单选题] *

A.12 小时内

B.48~72 小时(正确答案)

C.72 小时后

D.24~48 小时

E.12~24 小时

83.小儿结核病最常见类型是 [单选题] *

A.原发型肺结核(正确答案)

B.结核性脑膜炎

C.结核性腹膜炎

D.结核性胸膜炎

E.粟粒性肺结核

84.结核菌素试验假阴性反应不包括 [单选题] *

A.部分危重结核病患者

B.结核迟发型变态反应前期(初次感染后 4~8 周内)(正确答案)

C.急性传染病

D.应用肾上腺皮质激素治疗时

E.原发性或继发性免疫缺陷病

85.判断小儿结核病的最可靠指标是 [单选题] *

A.持续发热

B.排出物中找到结核菌(正确答案)

C.X 线检查示肺内钙化灶

D.PPD 试验阳性的年长儿

E.以上均不是

86.女孩，3岁。出生时接种过卡介苗，2岁半时 PPD 实验硬结直径 6 mm，最近 PPD 实验硬结直径为 18 mm，其最可能是 [单选题] *

A.曾经有结核感染

B.假阳性反应

C.阴性反应

D.新近有结核感染(正确答案)

E.卡介苗接种反应

87.患儿男，5岁。患有结核病，但结核菌素试验阴性。可见于 [单选题] *

A.合并上呼吸道感染

B.抗结核治疗 1 周

C.接种百白破三联疫苗后

D.粟粒性结核(正确答案)

E.颈淋巴结结核

88.符合单纯型热性惊厥诊断标准的是 [单选题] *

A.发作一周后 EEG 检查见棘波、尖波发放

B.多为局限性发作

C.一次热程中有一次发作(正确答案)

D.惊厥持续时间 > 15 分钟

E.复发总次数 > 5 次

89.不符合典型热性惊厥表现的是 [单选题] *

A.多数呈全身性强直-阵挛性发作

- B.初期体温骤升达 39 °C
- C.惊厥复发总次数 ≤4 次
- D.发作短期嗜睡
- E.惊厥持续 > 10 分钟(正确答案)

90.3 月龄以下婴儿患化脓性脑膜炎，最主要的特点是 [单选题] *

- A.强直-阵挛性惊厥
- B.缺乏典型临床症状(正确答案)
- C.高热
- D.脑膜刺激征阳性
- E.喷射性剧烈呕吐

91.对病原菌尚未明确的化脓性脑膜炎患儿，首选的抗生素是 [单选题] *

- A.氯霉素
- B.万古霉素
- C.头孢曲松(正确答案)
- D.阿奇霉素
- E.青霉素

92.小儿化脓性脑膜炎，最可靠的诊断依据是 [单选题] *

- A.脑脊液外观混浊或脓性
- B.脑脊液细胞数显著增加
- C.糖定量降低
- D.脑脊液检菌阳性(正确答案)
- E.脑膜刺激征阳性

93.新生儿时期最常见的脑膜炎是 [单选题] *

- A.病毒性脑膜炎
- B.流行性脑膜炎
- C.大肠杆菌脑膜炎(正确答案)
- D.流感嗜血杆菌脑膜炎
- E.脑膜炎双球菌脑膜炎

94.化脓性脑膜炎的致病菌可通过多种途径进入脑膜，以下哪种途径最多见 [单选题]

*

- A.呼吸道侵入(正确答案)
- B.皮肤黏膜
- C.新生儿脐部
- D.消化道
- E.腰骶部皮肤窦道使脑脊液与外界交通

95.对脑水肿，何者疗效为佳 [单选题] *

- A.可的松
- B.氢化可的松
- C.去氢化可的松
- D.促肾上腺素皮质激素
- E.地塞米松(正确答案)

96.女婴，4个月。1个半月前诊断为“化脓性脑膜炎”，抗生素治疗3周后病情平稳出院。近1周患儿出现烦躁哭闹、呕吐，家长发现头颅进行性增大，前囟饱满扩大，头皮静脉扩张，头颅CT示脑室系统扩大。最可能的诊断是 [单选题] *

- A.硬脑膜下积液
- B.脑脓肿
- C.脑积水(正确答案)

D.脑室管膜炎

E.抗利尿激素异常分泌综合征

97.患儿，女，2个月。拒食、吐奶、嗜睡3天，查体：面色青灰，前囟紧张，脐部少许脓性分泌物。为明确诊断，最关键的检查是 [单选题] *

A.脐分泌物培养

B.头颅CT

C.血培养

D.血气分析

E.脑脊液检查(正确答案)

98.男婴，3个月。高热伴频繁呕吐2天，嗜睡1天，惊厥2次。查体：精神差，双眼凝视，前囟隆起，脑膜刺激征阴性。实验室检查：血WBC $15.0 \times 10^9/L$ ，N 0.88，L 0.12。最可能的诊断是 [单选题] *

A.结核性脑膜炎

B.化脓性脑膜炎(正确答案)

C.热性惊厥

D.病毒性脑炎

E.中毒性脑病

99.男婴，8个月，发热3小时，体温 39.3°C ，就诊过程中突然双眼上翻，肢体强直，持续半分钟后缓解。查体：咽充血，肺、心腹及神经系统无异常。2个月前曾有同样发作，其表现考虑为 [单选题] *

A.癫痫

B.中毒性脑病

C.热性惊厥(正确答案)

D.病毒性脑炎

E.结核性脑膜炎

100.男孩，2岁。发热伴皮肤出血点1天，昏迷2小时于2月3日出诊。查体：昏迷，血压测不出，全身可见较多瘀点、瘀斑，双下肢有融合成片的紫癜。为快速临床诊断，最重要的检查是 [单选题] *

A.凝血功能

B.头颅MRI

C.血常规

D.瘀点涂片做细菌学检查(正确答案)

E.脑脊液常规

金英杰医学® | 高端学院
JINYINGJIE.COM

金英杰·高端班专属

金英杰医学® | 高端学院
JINYINGJIE.COM

金英杰·高端班专属