

2022年 中西医助理 第二单元 核心押题卷

1. 按 NYHA 分级，II 级患者的表现为

- A. 心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛
- B. 患者患有心脏病，但日常活动量不受限制，一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛
- C. 心脏病患者的体力活动受到轻度限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛
- D. 心脏病患者不能从事任何体力活动，休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重
- E. 患者日常活动量受限制，一般活动引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛

参考答案：C

参考解析：NYHA 分级是按诱发心力衰竭症状的活动程度将心功能的受损状况分为四级。这一分级方案于 1928 年由美国纽约心脏病学会 (NYHA) 提出。I 级：患者患有心脏病，但日常活动量不受限制，一般活动不引起疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。II 级：心脏病患者的体力活动受到轻度的限制，休息时无自觉症状，但平时一般活动下可出现疲乏、心悸、呼吸困难或心绞痛。III 级：心脏病患者体力活动明显受限，小于平时一般活动即引起上述症状。IV 级：心脏病患者不能从事任何体力活动。休息状态下也出现心衰的症状，体力活动后加重。选项 C 正确当选。

2. 下列各项中，不属于心力衰竭基本病因的是

- A. 缺血性心肌损害
- B. 心肌炎和心肌病
- C. 心肌代谢障碍性疾病
- D. 压力负荷（后负荷）过重
- E. 过度劳累与情绪激动

参考答案：E

参考解析：心力衰竭基本病因包括：1. 原发性心肌损害：（1）缺血性心肌损害：冠心病心肌缺血和（或）心肌梗死是引起心力衰竭的最常见原因之一。（2）心肌炎和心肌病。（3）心肌代谢障碍性疾病。2. 心脏负荷过重：（1）压力负荷（后负荷）过重：见于高血压、主动脉瓣狭窄、肺动脉高压、肺动脉瓣狭窄等左、右心室收缩期射血阻力增加的疾病。（2）容量负荷（前负荷）过重：见于以下两种情况：①心脏瓣膜关闭不全，血液反流，如主动脉瓣关闭不全、二尖瓣关闭不全等。②左、右心或动静脉分流性先天性心血管病如间隔缺损、动脉导管未闭等。选项 E 正确当选。

3. 容量负荷过重见于

- A. 高血压
- B. 肺动脉高压
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

参考答案：E

参考解析：容量负荷（前负荷）过重见于以下两种情况：①心脏瓣膜关闭不全，血液反流，如主动脉瓣关闭不全、二尖瓣关闭不全等；②左、右心或动静脉分流性先天性心血管病如室间隔缺损、动脉导管未闭等。

4. 下列各项中，不属于急性心力衰竭发病机制的是

- A. 急性弥漫性心肌损害

- B. 心脏负荷突然加重
- C. 神经内分泌激活
- D. 心肾综合征
- E. 严重心律失常

参考答案：E

参考解析：急性心力衰竭发病机制有：1. 急性弥漫性心肌损害。2. 急性机械性阻塞。3. 心脏负荷突然加重。4. 神经内分泌激活。5. 心肾综合征。6. 慢性心衰的急性失代偿。选项E正确当选。

5. 急性上呼吸道感染不包括下列哪种疾病

- A. 普通感冒
- B. 急性咽结膜炎
- C. 急性病毒性咽炎
- D. 急性支气管炎
- E. 急性咽-扁桃体炎

参考答案：D

参考解析：急性上呼吸道感染的临床表现有：（一）普通感冒；（二）急性病毒性咽炎和喉炎；（三）急性咽-扁桃体炎；（四）急性疱疹性咽峡炎；（五）急性咽结膜炎。选项D正确当选。

6. 引起急性支气管炎最常见的病因是

- A. 病毒或细菌感染
- B. 吸入刺激性气体
- C. 过敏反应
- D. 寒冷空气刺激
- E. 粉尘

参考答案：A

参考解析：病原微生物病毒是引起急性支气管炎最常见的微生物，常见病毒为腺病毒、流感病毒（甲、乙）、冠状病毒、鼻病毒、单纯疱疹病毒、呼吸道合胞病毒和副流感病毒。常见细菌为流感嗜血杆菌、肺炎链球菌等。近年来衣原体和支原体感染明显增加。在病毒感染的基础上继发细菌感染也较多见。选项A正确当选。

7. 急性胃炎在中医中密切相关的脏腑是

- A. 肝脾
- B. 肺脾
- C. 肺肾
- D. 脾肾
- E. 心肝

参考答案：A

参考解析：本病病位在胃，与肝、脾关系密切。病机是胃失和降，胃络受损。病理性质多属实证。

8. 治疗急性胃炎湿热中阻证应首选

- A. 香苏散
- B. 清中汤
- C. 保和丸
- D. 柴胡疏肝散
- E. 失笑散

参考答案：B



参考解析：急性胃炎湿热中阻证，证候：胃痛灼热，胸腹痞满，头身重着，口苦口黏，纳呆，肛门灼热，大便不爽，舌苔厚腻，脉弦滑。治法：清化湿热，理气止痛。方药：清中汤加减。选项 B 正确当选。

9. 慢性肾炎有多少由急性肾炎转变而来

- A. 全部
- B. 少数
- C. 半数
- D. 大多数
- E. 没有

参考答案：B

参考解析：急性链球菌感染后肾炎迁延不愈，病程超过 1 年以上者可转为慢性肾炎，但仅占 15%~20%。大部分慢性肾炎并非由急性肾炎迁延所致。

10. 慢性肾小球肾炎与慢性肾盂肾炎的鉴别，有诊断意义的是

- A. 尿比重有改变
- B. 影像学检查见双肾非对称性损害，呈肾间质性损害影像
- C. 尿常规示蛋白尿、血尿
- D. 病因
- E. 服用抗生素有效

参考答案：B

参考解析：慢性肾盂肾炎多见于女性患者，有反复尿路感染病史，多次尿沉渣或尿细菌培养阳性，肾功能损害以肾小管为主，影像学检查可见双肾非对称性损害，呈肾间质性损害影像学征象。选项 B 正确当选。

11. 治疗缺铁性贫血的前提是

- A. 病因诊断
- B. 病理诊断
- C. 西医诊断
- D. 中医诊断
- E. 临床诊断

参考答案：A

参考解析：（缺铁性贫血）IDA 的病因诊断是治疗 IDA 的前提，如婴幼儿、青少年和妊娠妇女营养不足引起的 IDA，应改善饮食；胃、十二指肠溃疡伴慢性失血或胃癌术后残胃癌所致的 IDA，应多次检查大便潜血、做胃肠道 X 线或内镜检查，必要时手术根治；月经过多引起的 IDA 应调理月经；寄生虫感染者应驱虫治疗等。选项 A 正确当选。

12. 与慢性原发免疫性血小板减少症不相符合的是

- A. 血小板 $40 \times 10^9/L$
- B. 骨髓巨核细胞显著增加
- C. 血小板相关补体阳性
- D. 血小板生存时间明显缩短
- E. 血小板形成的巨核细胞显著增加

参考答案：E

参考解析：原发免疫性血小板减少症慢性型：血小板常在 $50 \times 10^9/L$ 左右，骨髓巨核细胞数量显著增加，90% 以上的患者血小板生存时间明显缩短，有血小板形成的巨核细胞显著减少（ $<30\%$ ）。

13. 不属甲亢主要临床表现的是

- A. 眼征
- B. 甲状腺危象
- C. 高代谢症候群
- D. 弥漫性甲状腺肿
- E. 胫前黏液性水肿

参考答案：B

参考解析：甲亢主要临床表现有：高代谢症候群、弥漫性甲状腺肿、眼征和胫前黏液性水肿。甲状腺危象为甲亢的特殊临床表现。

14. 下列关于甲减实验室检查的说法，错误的是

- A. 血清 TSH 升高
- B. FT4 升高
- C. TT3 正常
- D. FT3 正常
- E. 心电图见低电压

参考答案：B

参考解析：甲状腺功能检查：血清 TSH 增高、FT4 降低是诊断原发性甲减的必备指标；TT3 和 FT3 可在正常范围，严重甲减时降低；只有 TSH 升高而 T3、T4 正常，为亚临床甲减。选项 B 正确当选。

15. 治疗类风湿关节炎时，属慢作用抗风湿药物的是

- A. 泼尼松
- B. 青霉胺
- C. 甲氨蝶呤
- D. 扶他林
- E. 阿司匹林

参考答案：C

参考解析：改善病情的抗风湿药及免疫抑制剂：甲氨蝶呤：常用剂量 7.5~20mg，每周 1 次，一次口服、肌内注射或静脉注射。疗程至少半年。是目前治疗 RA 的首选药之一。选项 C 正确当选。

16. 饮食不洁同时感受外邪易发生

- A. 疡
- B. 痢
- C. 漏
- D. 痰
- E. 岩

参考答案：B

参考解析：恣食膏粱厚味、醇酒炙博或辛辣刺激之品可使脾胃功能失调，湿热火毒内生，同时感受外邪则易发生痢、有头疽、疔疮等疾病。选项 B 正确当选。

17. 手术区皮肤消毒的范围，应距切口周围

- A. 5cm
- B. 10cm
- C. 15cm
- D. 20cm
- E. 25cm

参考答案：C

参考解析：手术区皮肤的消毒范围应包括手术切口周围 15cm 的区域。选项 C 正确当选。

18. 下列属于常用局麻药的是

- A. 苯巴比妥
- B. 肾上腺素
- C. 二甲双胍
- D. 利多卡因
- E. 哌替啶

参考答案：D

参考解析：常用酯类局麻药有普鲁卡因、丁卡因等，酰胺类局麻药有利多卡因、布比卡因、罗哌卡因等。选项 D 正确当选。

19. 血钠 $<120\text{mmol/L}$ ，尚见肌痉挛性抽痛、腱反射减弱，病人神志不清，少尿，尿素氮升高，属

- A. 低渗性缺水轻度缺钠
- B. 低渗性缺水中度缺钠
- C. 低渗性缺水重度缺钠
- D. 高渗性缺水轻度缺水
- E. 高渗性缺水中度缺水

参考答案：C

参考解析：低渗性缺水重度缺钠：血钠 $<120\text{mmol/L}$ 。除有中度缺钠症状外，还有肌痉挛性抽痛、腱反射减弱或消失，病人神志不清、木僵乃至昏迷常伴有严重休克、少尿或无尿，尿素氮升高。选项 C 正确当选。

20. 外科输血的适应症中，急性出血需要输血时，失血量最少达总血量的

- A. 0.08
- B. 0.1
- C. 0.15
- D. 0.2
- E. 0.25

参考答案：B

参考解析：外科输血的适应证：急性出血，当失血量达总血容量的 10%~20% (500~1000ml)。

21. 术后顽固性呃逆，应首选的治疗措施是

- A. 压迫眶上缘
- B. 星状神经节封闭
- C. 颈部膈神经封闭
- D. 肌内注射异丙嗪
- E. 肌内注射地西洋

参考答案：C

参考解析：术后早期发生呃逆可压迫眶上缘，针刺内关、足三里、天突、鸠尾等穴位。对顽固性呃逆可采用颈部膈神经封闭。选项 C 正确当选。

22. 程度积分法分为 () 个级别

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

参考答案：C

参考解析：疼痛程度积分法：1分：轻痛，不影响睡眠及食欲。2.5分：困扰痛，疼痛反复发作，有痛苦表情，痛时中断工作，并影响食欲睡眠。5分：疲惫痛，持续疼痛，表情痛苦。7.5分：难忍痛，疼痛明显，勉强坚持，有显著的痛苦表情。10分：剧烈痛，剧痛难忍，伴情绪、体位的变化，呻吟或喊叫，脉搏或呼吸加快，面色苍白，多汗，血压下降。选项C正确当选。

23. 管状淋巴管炎常发生的部位是

- A. 颈项
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 上肢
- E. 下肢

参考答案：E

参考解析：管状淋巴管炎常见于四肢，尤以下肢多见。选项E正确当选。

24. 胞宫的功能是

- A. 产生卵子
- B. 主月经
- C. 司血海，主疏泄
- D. 主第二性发育
- E. 产生性激素

参考答案：B

参考解析：中医认为，子宫具有主行月经、孕育胎儿的功能。选项B正确当选。

25. 下列关于孕激素生理作用的叙述是，正确的是

- A. 降低子宫平滑肌兴奋性，升高基础体温
- B. 促进子宫内膜腺体及间质增生、恢复
- C. 使子宫颈口松弛，黏液分泌增加，变稀薄
- D. 促进卵泡发育
- E. 促进水钠潴留

参考答案：A

参考解析：孕激素可以降低子宫平滑肌兴奋性及其对缩宫素的敏感性，抑制子宫收缩，有利于胚胎及胎儿宫内生长发育。兴奋下丘脑体温调节中枢，使基础体温在排卵后升高0.3~0.5℃。选项A正确当选。

26. 有关胎儿附属物描述错误的是

- A. 胎盘是由羊膜、叶状绒毛膜和底蜕膜组成
- B. 胎膜由羊膜、绒毛膜及蜕膜构成
- C. 胎盘血循环主要靠渗透、扩散作用进行
- D. 羊水是羊膜腔内的液体，弱碱性
- E. 脐带为连接胎儿与胎盘的纽带，内含脐动脉、脐静脉及胶样物质

参考答案：B

参考解析：胎儿附属物是指胎儿以外的组织，包括胎盘、胎膜、脐带和羊水。选项B正确当选。

27. 西医的孕期用药原则中，哪个时期应特别注意尽量避免用药

- A. 孕期1~3周
- B. 孕期2~4周

- C. 孕期 2~6 周
- D. 孕期 3~6 周
- E. 孕期 4~8 周

参考答案: E

参考解析: 西医孕期用药原则: 尽量单一用药, 避免联合用药; 可能用疗效肯定的老药, 避免用对胎儿影响难以确定的新药; 用药剂量宜小不宜大, 避免大剂量用药; 敏感期 (指孕 12 周之前, 特别是 4~8 周) 尽量不用药。选项 E 正确当选。

28. 第二产程达 1 小时胎头无明显下降, 称为

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期停止
- C. 第二产程延长
- D. 第二产程停滞
- E. 胎头下降停止

参考答案: D

参考解析: 第二产程又称胎儿娩出期。从宫口完全扩张 (开全) 到胎儿娩出结束, 是娩出胎儿的全过程。第二产程达 1 小时, 胎头下降无进展, 称为第二产程停滞。选项 D 正确当选。

29. 产后宫缩痛持续时间为

- A. 1~2 天
- B. 2~3 天
- C. 3~4 天
- D. 4~5 天
- E. 5~6 天

参考答案: B

参考解析: 产后宫缩痛于产后 1~2 日出现, 持续 2~3 天疼痛自然消失。

30. 肾阳不足, 封藏失职, 冲任不固, 可导致的妇科疾病是

- A. 妊娠腹痛
- B. 胎萎不长
- C. 不孕
- D. 经行浮肿
- E. 崩漏

参考答案: E

参考解析: 肾阳不足, 封藏失职, 冲任不固, 可致崩漏。选项 E 正确当选。

31. 小儿听力发育完善是在几岁

- A. 1 岁
- B. 2 岁
- C. 3 岁
- D. 4 岁
- E. 5 岁

参考答案: D

参考解析: 出生时中耳鼓膜有羊水潴留, 听力较差; 3~7 日后羊水逐渐吸收听觉已相当好; 3~4 个月时头可转向声源, 听到悦耳声时会微笑; 7~9 个月时能确定声源, 开始区别语言的意义; 1 岁时听懂自己的名字; 2 岁后能区别不同声音; 4 岁听觉发育完善。选项 D 正确当选。

32. 下列各项中, 与胎黄发病无关的脏腑是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 肝
- D. 胆
- E. 肾

参考答案：E

参考解析：胎黄的发病与先天禀赋因素及后天感受湿邪或湿热毒邪密切相关。病机为湿邪或湿热之邪阻滞脾胃，肝失疏泄，胆汁外溢，而发为胎黄，病位主要在脾胃肝胆。选项E正确当选。

33. 小儿上呼吸道感染的中医辨证论治，应以何法为主

- A. 清法
- B. 分利
- C. 通腑
- D. 解表
- E. 宣肺

参考答案：D

参考解析：小儿急性上呼吸道感染以疏风解表为基本原则。根据不同的证型分别治以辛温解表、辛凉解表、清暑解表、清热解毒。治疗兼证，在解表基础上，分别佐以化痰、消导、镇惊之法。选项D正确当选。

34. 治疗病毒性心肌炎风热犯心证，首选的方剂是

- A. 玉屏风散
- B. 荆防败毒散
- C. 葛根芩连汤
- D. 银翘散
- E. 生脉散

参考答案：D

参考解析：病毒性心肌炎风热犯心证的治法为疏风清热，宁心复脉，代表方为银翘散加减。选项D正确当选。

35. 常见肠炎类型不包括

- A. 轮状病毒肠炎
- B. 肠梗阻
- C. 诺如病毒肠炎
- D. 产毒性细菌引起的肠炎
- E. 侵袭性细菌引起的肠炎

参考答案：B

参考解析：常见肠炎类型包括：轮状病毒肠炎、诺如病毒肠炎、产毒性细菌引起的肠炎、侵袭性细菌引起的肠炎、金黄色葡萄球菌肠炎、假膜性小肠结肠炎、真菌性肠炎。选项B正确当选。

36. 下述病史与急性肾小球肾炎关系最为密切的是

- A. 1~3周前上呼吸道感染
- B. 3天前腹泻
- C. 2周前腰部外伤史
- D. 3个月前有猩红热史
- E. 2个月前有水痘病史

参考答案：A

参考解析：急性肾小球肾炎临床表现：（1）前驱感染：发病前1~3周有上呼吸道或皮肤等前驱感染。（2）典型表现：起病时可有低热、疲倦乏力、食欲不振等，肾炎症状主要表现为水肿、血尿和高血压。

37. 中医治疗病毒性脑炎痰瘀阻络证的首选方剂是

- A. 指迷茯苓丸
- B. 茵陈蒿汤
- C. 生脉散
- D. 人参养营汤
- E. 沙参麦冬汤

参考答案：A

参考解析：病毒性脑炎之痰瘀阻络证，治法：涤痰通络，活血化瘀。方药：指迷茯苓丸合桃红四物汤加减。选项A正确当选。

38. 以下为协调作用于胞宫产生月经的是

- A. 营卫、气血、天癸
- B. 心、肝、脾、肾诸脏
- C. 天癸、胞宫、胞脉
- D. 冲、任、督、带诸脉
- E. 肾气、天癸、冲任、气血

参考答案：E

参考解析：月经是肾气、天癸、冲任、气血协调作用于胞宫，并在其他脏腑、经络的协同作用下，使胞宫定期藏泻而产生的生理现象，是女性生殖功能正常的反映。选项E正确当选。

39. 孕妇开始自觉胎动的时间是

- A. 妊娠12~16周
- B. 妊娠16~20周
- C. 妊娠22~24周
- D. 妊娠25~26周
- E. 妊娠27周以上

参考答案：B

参考解析：一般妊娠20周左右开始自觉有胎动。

40. 一位少女骑自行车不慎跌倒，伤及外阴，血肿最易发生在

- A. 小阴唇
- B. 大阴唇
- C. 会阴部
- D. 阴阜部
- E. 阴蒂部

参考答案：B

参考解析：大阴唇皮下为疏松结缔组织和脂肪组织，含丰富的血管、淋巴管和神经，外伤后易形成血肿。

41. 维持阴道酸碱度的是

- A. 乳杆菌
- B. 双歧杆菌
- C. 放线菌
- D. 酵母菌

E. 酪酸梭菌

参考答案：A

参考解析：阴道黏膜分为底层、中层和表层。排卵前，在雌激素作用下，阴道黏膜底层细胞增生，逐渐演变为中层细胞与表层细胞，使阴道上皮增厚，表层细胞角化，其程度在排卵期最明显，细胞内富含糖原，经乳杆菌分解为乳酸，使阴道内保持一定酸度，可防止致病菌的繁殖。选项A正确当选。

42. 关于正常产道下列哪项正确

- A. 中骨盆平面的横径长而前后径短
- B. 入口平面是前后径长而横径短
- C. 出口平面是前后径短而横径长
- D. 骨盆轴的上段向下向后，中段向下，下段向下向前
- E. 骨盆倾斜度正常值为 80°

参考答案：D

参考解析：中骨盆平面：呈前后径长的椭圆形，是骨盆最小平面，最狭窄。骨盆入口平面呈横椭圆形。骨盆出口平面：由两个不同平面的三角形组成，骨盆轴的上段向下向后，中段向下，下段向下向前。骨盆倾斜度指妇女站立时骨盆入口平面与地平面所形成的角度，一般为 60° 。

43. 小儿注意力缺陷障碍痰火内扰证治疗首选方为

- A. 实脾饮
- B. 六味地黄丸
- C. 黄连温胆汤
- D. 杞菊地黄丸
- E. 归脾汤合甘麦大枣汤

参考答案：C

参考解析：注意力缺陷多动障碍之痰火内扰证。证候：多动多语，烦躁不宁，冲动任性，难以制约，兴趣多变，注意力不集中，胸闷烦热，懊恼不眠，口苦食少，溲赤便结，舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热化痰，宁心安神。方药：黄连温胆汤加减。

44. 小儿抽动障碍痰火扰心证治疗首选方为

- A. 醒脾散
- B. 大定风珠
- C. 千金龙胆汤
- D. 礞石滚痰丸
- E. 黄连温胆汤

参考答案：D

参考解析：抽动障碍之痰火扰心证。证候：头面、躯干、四肢肌肉抽动，频繁有力，喉中痰鸣，怪声不断，甚或骂人，烦躁口渴，睡眠不安，舌质红，苔黄腻，脉滑数。治法：泻火涤痰，清心安神。方药：礞石滚痰丸加减。

45. 某男，身热较著，微恶风寒，汗出不畅，头胀痛，目胀，鼻塞，流浊涕，口干而渴，咳嗽，痰黄黏稠，咽燥，舌苔薄白，边尖红，脉浮数。其中医证型是

- A. 风寒束表证
- B. 暑湿伤表证
- C. 风热犯表证
- D. 阴虚感冒证
- E. 阳虚感冒证

参考答案：C

参考解析：急性上呼吸道感染，风热犯表证，证候：身热较著，微恶风寒，汗出不畅，头胀痛，目胀，鼻塞，流浊涕，口干而渴，咳嗽，痰黄黏稠，咽燥，或咽喉肿痛，舌苔薄白微黄，边尖红，脉浮数。选项C正确当选。

46. 某男，初起见发热，干咳，随后痰量增多，咳嗽加剧。白细胞计数和分类无明显改变，X线检查见肺纹理增粗。应考虑的诊断是

- A. 急性上呼吸道感染
- B. 急性支气管炎
- C. 慢性阻塞性肺气肿
- D. 肺结核
- E. 流行性感

参考答案：B

参考解析：急性支气管炎，初为干咳或有少量黏液痰，随后痰量增多，咳嗽加剧，偶伴血痰。血常规检查无明显改变。X线检查可见正常或肺纹理增粗。选项B正确当选。

47. 某患者，咳嗽新起，咳声嘶哑，干咳无痰，黏稠难出，咳引胸痛，鼻燥咽干，恶风头痛，舌尖红，苔薄黄而干。其中医证型是

- A. 风寒袭肺证
- B. 燥热伤肺证
- C. 风热犯肺证
- D. 凉燥伤肺证
- E. 寒饮犯肺证

参考答案：B

参考解析：急性支气管炎燥热伤肺证，证候：咳嗽新起，咳声嘶哑，干咳无痰或痰少黏稠难出，或黏连成丝，或咳引胸痛，多伴有鼻燥咽干，恶风发热，头痛等表证，舌尖红，苔薄黄而干，脉浮数或小数。选项B正确当选。

48. 患者慢性心力衰竭5年，现症见喘咳气急，张口抬肩，不能平卧，痰黄稠，心悸烦躁，胸闷脱痞，口唇紫绀，舌质紫暗，舌苔厚腻，脉弦滑而数。其治法应选

- A. 温化痰饮，泻肺逐水
- B. 温阳利水
- C. 益气养阴，活血化瘀
- D. 养心补肺，益气活血
- E. 温补心肾

参考答案：A

参考解析：慢性心衰痰饮阻肺证，证候：喘咳气急，张口抬肩，不能平卧，痰多色白或黄稠，心悸烦躁，胸闷脱痞，面青汗出，口唇紫绀，舌质紫暗，舌苔厚腻或白或黄，脉弦滑而数。治法：温化痰饮，泻肺逐水。方药：苓桂术甘汤合丹参饮加减。选项A正确当选。

49. 患者，男性，45岁。近来出现心动过速。查体：心率为160次/分，律规则，按压颈动脉窦后，心率突然减慢至90次/分，但运动后又增快至160次/分。诊断最可能是

- A. 阵发性室上性心动过速
- B. 阵发性室性心动过速
- C. 窦性心动过速
- D. 阵发性房性心动过速伴2:1房室传导
- E. 心房扑动，2:1房室传导

参考答案：A

参考解析：阵发性室上性心动过速：颈动脉按摩能使心率突然减慢。结合阵发性室上性心动过速心率 160 次/分以上，本题考虑为阵发性室上性心动过速。

50. 男性患者，30 岁。患风湿性心脏病二尖瓣狭窄伴关闭不全 4 年，半年前骤发心悸，心电图示快速房颤，经洋地黄治疗，心率减慢。目前心率 75 次/分，心律绝对不规则。血沉与抗“O”滴度正常。应首选的治疗措施是

- A. 继续用地高辛控制心室率
- B. 停用洋地黄
- C. 地高辛加用心得安治疗
- D. 药物或电击复律
- E. 地高辛加糖皮质激素

参考答案：C

参考解析：二尖瓣狭窄伴关闭不全患者出现心房颤动，急性发作时常伴有快速心室律，如血流动力学稳定，可先静脉推注毛花苷 C，以减慢心室律，该药起效较慢。选项 C 正确当选。

51. 患者，女，32 岁，胃热隐痛，口舌干燥，五心烦热，渴欲含漱，嘈杂干呕，大便干燥，舌红无苔，舌裂纹少津，脉细数，可以判断患者宜用

- A. 黄芪建中汤
- B. 失笑散合丹参饮加减
- C. 柴胡疏肝散加减
- D. 一贯煎合芍药甘草汤加减
- E. 保和丸加减

参考答案：D

参考解析：根据患者的症状可以判断属于急性胃炎的胃阴不足证。证候：胃热隐痛，口舌干燥，五心烦热，渴欲含漱，嘈杂干呕，大便干燥，舌红无苔，舌裂纹少津，脉细数。治法：养阴益胃，和中止痛。方药：一贯煎合芍药甘草汤加减。

52. 患者，男，49 岁。慢性胃炎 3 年。胃脘隐痛，嘈杂，口干咽燥，五心烦热，舌红少津，脉细。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 四君子汤加减
- B. 益胃汤加减
- C. 失笑散合丹参饮加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 三仁汤加减

参考答案：B

参考解析：胃阴不足，虚热内生，胃失濡润，气失和降，则见胃痛隐隐，嘈杂；胃阴亏虚，阴津不能上滋，则口燥咽干；五心烦热，舌红少津，脉细为阴虚内热之象。辨证为胃阴不足证，治法为养阴益胃，和中止痛，方用益胃汤加减。选项 B 正确当选。

53. 患者男性，持续性上腹隐痛 3 个月，食欲不振，消瘦。查体：面色苍白，上腹部有压痛，未触及包块，肝、脾肋下未及。对确诊有帮助的检查是

- A. 纤维胃镜加活检
- B. 肝放射性核素扫描
- C. B 型超声检查
- D. 血清胃泌素测定
- E. 胃酸测定

参考答案：A

参考解析：胃镜及组织学检查胃镜及组织学检查是慢性胃炎诊断的最可靠方法。选项 A 正确

当选。

54. 患者，男，43岁。慢性肾小球肾炎病史3年。现症见面色无华，少气乏力，手足心热，腰酸痛，舌红，少苔，脉细。查体：血压150/90mmHg。尿蛋白1.5g/24小时。应首选的中西医治疗方案是

- A. 氢氯噻嗪，玉屏风散合金匱肾气丸
- B. 氯沙坦，参芪地黄汤
- C. 缬沙坦，杞菊地黄丸
- D. 贝那普利，知柏地黄丸
- E. 阿替洛尔，无比山药丸

参考答案：B

参考解析：患者慢性肾小球肾炎病史3年，现血压150/90mmHg，尿蛋白1.5g/24小时，故应将血压控制在125/75mmHg以下。可选用ACEI，如贝那普利，或用血管紧张素II受体拮抗剂（ARB），如氯沙坦或缬沙坦。症见面色无华，少气乏力，手足心热，腰酸痛，舌红，少苔，脉细，辨证为气阴两虚证，治法为益气养阴，代表方为参芪地黄汤加减。选项B正确当选。

55. 患者，女，19岁。患肾病综合征，症见眼睑浮肿，时有四肢、全身浮肿，身发痲痒，恶风发热，小便不利，舌红，苔薄黄，脉滑数。其证型是

- A. 湿毒浸淫
- B. 风水相搏
- C. 水湿浸渍
- D. 湿热内蕴
- E. 脾虚湿困

参考答案：A

参考解析：疮毒内归脾肺，脾失运化，肺失宣降，三焦水道失畅，水液溢于肌肤，则见眼睑浮肿，时有四肢、全身浮肿，身发痲痒，恶风发热，小便不利。舌红，苔薄黄，脉滑数均为湿热内蕴之象。辨证为湿毒浸淫证。选项A正确当选。

56. 7岁患儿，面色无华，血常规检查血红蛋白87g/L，腹胀，善食易饥，恶心呕吐，嗜食生米、泥土、茶叶等，神疲肢软，气短头晕，舌质淡，苔白，脉虚弱。其中医治法是

- A. 杀虫消积，养心安神
- B. 益气补血，养心安神
- C. 健脾和胃，益气养血
- D. 活血化瘀，益气养阴
- E. 杀虫消积，补益气血

参考答案：E

参考解析：缺铁性贫血虫积证，证候：面色萎黄少华，腹胀，善食易饥，恶心呕吐，或有便溏，嗜食生米、泥土、茶叶等，神疲肢软，气短头晕，舌质淡，苔白，脉虚弱。治法：杀虫消积，补益气血。方药：化虫丸合八珍汤加减。选项E正确当选。

57. 魏某，女性，34岁。在服用氯霉素后出现发热，头晕，乏力，心悸，气短，食欲减退，骨髓象示增生活跃，但巨核细胞明显减少。最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 白血病
- D. 恶性贫血
- E. 肾性贫血

参考答案：B



参考解析：结合题干服用氯霉素的诱因，以及题干中的症状诊断该患者为药物性再障。

58. 李某，女性，60岁，服丙基硫氧嘧啶治疗1.5年后，甲状腺较前缩小，T3抑制试验3小时>50%，24小时<50%，TT3、TT4正常。对此病人采取

- A. 改用手术治疗
- B. 停用丙基硫氧嘧啶
- C. 继续用丙基硫氧嘧啶
- D. 加大丙基硫氧嘧啶剂量
- E. 放射性¹³¹I治疗

参考答案：C

参考解析：继续用丙基硫氧嘧啶抑制T4在周围组织中转化为T3。

59. 王某，颈前肿胀5个月，伴眼突，烦躁易怒，手指颤抖，多汗，面红目赤，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，舌红苔黄，脉弦数。治疗应首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 逍遥散
- C. 天王补心丹
- D. 柴胡疏肝散
- E. 镇肝息风汤

参考答案：A

参考解析：甲亢肝火旺盛证，证候：颈前肿胀，眼突，烦躁易怒，易饥多食，手指颤抖，恶热多汗，面红烘热，心悸失眠，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，月经不调，舌质红，苔黄，脉弦数。治法：清肝泻火，消瘿散结。方药：龙胆泻肝汤加减。选项A正确当选。

60. 李某，女，28岁，两手指关节肿胀变形3年，伴疼痛，屈伸受限，痛处不移，皮肤失去弹性，稍硬，面色黧黑，手臂麻木，舌质暗红，有瘀点，苔薄白，脉弦涩。查类风湿因子(+)，X光片：关节间隙变窄。当诊断的证型是

- A. 湿热痹阻证
- B. 阴虚内热证
- C. 寒热错杂证
- D. 痰瘀互结证
- E. 肝肾亏损证

参考答案：D

参考解析：痰瘀互结证，证候：关节肿痛且变形，屈伸受限，或肌肉刺痛，痛处不移，皮肤失去弹性，按之稍硬，肌肤紫暗，面色黧黑，或有皮下结节，肢体顽麻，舌质暗红或有瘀点、瘀斑，苔薄白，脉弦涩。治法：活血化瘀，祛痰通络。方药：身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸加减。选项D正确当选。

61. 患者女性，发热4天，体温38℃，两膝关节肿痛，行动不便，下肢沉重酸胀，伴饮食无味，纳呆，偶有恶心呕吐，全身困乏无力，下肢浮肿，在某医院诊断为类风湿关节炎，舌苔黄腻，脉滑数。治疗应首选的方剂是

- A. 丁氏清络饮
- B. 四妙丸
- C. 桂枝芍药知母汤
- D. 独活寄生汤
- E. 身痛逐瘀汤

参考答案：C

参考解析：类风湿关节炎湿热痹阻证，证候：发热，口苦，饮食无味，纳呆或有恶心，泛泛

欲吐，关节肿痛以下肢为重，全身困乏无力，下肢沉重酸胀，浮肿或有关节积液，舌苔黄腻，脉滑数。治法：清热利湿，祛风通络。方药：四妙丸加减。选项 C 正确当选。

62. 癫痫患者，发则突然跌仆，目睛上视，口吐白沫，手足抽搐，喉间痰鸣，舌苔白腻，脉弦滑。治疗应首选的方剂是

- A. 醒脾汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 左归丸
- E. 定痫丸

参考答案：E

参考解析：阳痫，证候：突然仆倒，不省人事，面色潮红，牙关紧闭，两目上视，四肢抽搐，口吐涎沫；或喉中痰鸣或发怪叫，移时苏醒如常人，发病前常有眩晕、头昏、胸闷、乏力，舌质红，苔白腻或黄腻，脉弦数或弦滑。治法：急以开窍醒神，继以泻热涤痰息风。方药：黄连解毒汤和定痫丸加减。选项 E 正确当选。

63. 患者，男，51 岁。高血压病史 20 年。平素头晕目眩，头重如蒙，肢体麻木，胸脘痞闷。现症：突然出现短暂性神经功能缺失，彩色经颅多普勒（TCD）可见血管狭窄、动脉粥样硬化斑块。应首先考虑的诊断是

- A. 腔隙性梗死
- B. TIA
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑栓塞
- E. 癫痫

参考答案：B

参考解析：TIA 多数在 50 岁以上发病，有高血压、高脂血症、糖尿病等病史，突然局灶性神经功能缺失发作，彩色经颅多普勒（TCD）可见血管狭窄、动脉粥样硬化斑块。选项 B 正确当选。

64. 患者，男，30 岁。被路人发现昏迷不醒送入医院。查体：血压 110/80mmHg，心率 60 次/分，流涎，瞳孔针尖大小，口唇发绀，肌肉震颤，皮肤湿冷，双肺可闻较多湿啰音。应首先考虑的诊断是

- A. 巴比妥类中毒
- B. 癫痫发作
- C. 氰化物中毒
- D. 硝酸盐中毒
- E. 有机磷杀虫药中毒

参考答案：E

参考解析：流涎、皮肤湿冷、瞳孔缩小、双肺可闻及湿啰音是有机磷杀虫药中毒的毒蕈碱样症状，肌肉震颤为烟碱样症状，昏迷不醒为中枢神经系统症状。选项 E 正确当选。

65. 女性，40 岁，突然昏迷，抽搐，呼气有大蒜味，瞳孔明显缩小，皮肤冷汗，两肺湿啰音。下列哪种疾病可能性大

- A. 一氧化碳中毒
- B. 安定中毒
- C. 脑出血
- D. 有机磷杀虫药中毒
- E. 蛛网膜下腔出血



参考答案: D

参考解析: 有机磷杀虫药中毒呼吸有大蒜味, 故选 D 合适。

66. 患者, 男, 20 岁。肌注青霉素后突然晕倒, 血压测不到。应首先采取的抢救措施是

- A. 立即静脉点滴呋塞米 (速尿)
- B. 静脉点滴 5% 碳酸氢钠
- C. 立即皮下注射肾上腺素
- D. 静脉注射间羟胺
- E. 静脉点滴 20% 甘露醇

参考答案: C

参考解析: 对于过敏性休克的紧急治疗应首先采取的抢救措施是立即皮下注射肾上腺素加强心肌收缩, 提高心功能。选项 C 正确当选。

67. 患者患喘证 20 年, 现症见喘促短气, 气怯声低, 喉有鼾声, 咳声低弱, 痰吐稀薄, 自汗畏风, 痰少质黏, 烦热而渴, 咽喉不利, 面颧潮红, 舌质淡红, 脉细数。其中医治法是

- A. 补肾纳气
- B. 扶阳固脱, 镇摄肾气
- C. 补肺益气养阴
- D. 开郁降气平喘
- E. 化痰降逆

参考答案: C

参考解析: 喘证肺气虚耗证, 证候: 喘促短气, 气怯声低, 喉有鼾声, 咳声低弱, 痰吐稀薄, 自汗畏风, 或见咳呛, 痰少质黏, 烦热而渴, 咽喉不利, 面颧潮红, 舌质淡红或有剥苔, 脉细数。治法: 补肺益气养阴。方药: 生脉散合补肺汤加减。选项 C 正确当选。

68. 患者, 男, 70 岁。患糖尿病 2 年, 不规则服用降糖药。突发昏迷 6 小时。血压 90/60mmHg, 心率 130 次/分, 律齐。血钠 160mmol/L, 血糖 34mmol/L, 尿酮体 (-), 动脉血 pH7.3。应首先考虑的治疗药物是

- A. 静脉滴入碳酸氢钠
- B. 静脉滴入低渗盐水
- C. 小剂量胰岛素与低渗盐水静脉滴入
- D. 大剂量胰岛素与低渗盐水静脉滴入
- E. 小剂量胰岛素与等渗盐水静脉滴注

参考答案: E

参考解析: 高渗性非酮症糖尿病昏迷临床可见血糖 $>33.3\text{mmol/L}$, 血钠 $>155\text{mmol/L}$, 血浆渗透压显著升高, 但无酮症或较轻。根据症状, 患者为高渗性非酮症昏迷, 治疗应该以小剂量胰岛素与等渗盐水静脉滴注。选项 E 正确当选。

69. 患者表情迟钝, 言语不利, 或思维异常, 行为古怪, 善忘, 易惊恐, 肌肤甲错, 口干不欲饮, 选用的治法为

- A. 温补脾肾
- B. 补益肝肾
- C. 补精填髓养神
- D. 健脾益气, 豁痰开窍
- E. 活血化瘀, 开窍醒神

参考答案: E

参考解析: 血管性痴呆瘀血内阻证, 证候: 表情迟钝, 言语不利, 或思维异常, 行为古怪, 善忘, 易惊恐, 肌肤甲错, 口干不欲饮, 舌质暗或有瘀斑, 脉细涩。治法: 活血化瘀, 开窍

醒神。方药：通窍活血汤加减。

70. 患者男性，33岁，手术后出现厌食、恶心、肢体软弱无力，脉搏细快，肢端湿冷，出现休克，属

- A. 轻度脱水
- B. 中度脱水
- C. 重度脱水
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

参考答案：C

参考解析：结合患者的症状考虑该患者为重度脱水。重度脱水：轻、中度脱水继续发展，出现休克，常伴有代谢性酸中毒。

71. 患者，男，47岁。上消化道出血，呕血量约1500ml；现头晕心悸，神志淡漠，巩膜，轻度黄染，腹部膨隆，查体：血压80/60mmHg，心率120次/分，腹部移动性浊音(+)。首先应该

- A. 紧急胃镜检查明确出血部位
- B. 配血，快速输液，等待输血
- C. 配血，等待输血
- D. 急查红细胞压积
- E. 以上都不是

参考答案：B

参考解析：根据患者上消化道出血，呕血量约1300ml；现头晕心悸，神志淡漠临床表现，考虑为失血性休克。治疗时，应首先配血，快速输液，等待输血。选项B正确当选。

72. 患者，男，65岁，神情痴呆，失语，四肢麻木；舌干红无苔，脉弦细数。治疗首选

- A. 苏合香丸
- B. 保立苏汤
- C. 柴胡细辛汤
- D. 琥珀安神汤
- E. 补阳还五汤合收呆至神汤

参考答案：E

参考解析：脑挫裂伤恢复期。证候：神情痴呆，或失语，或语言謇涩，或错语健忘，或半身不遂，四肢麻木；舌干红无苔，脉弦细数。治法：益气养阴，祛瘀开窍。方药：补阳还五汤合收呆至神汤加减。

73. 患者，男，42岁，腹部受暴力冲击，出现持续上腹部剧烈疼痛，肩背疼痛伴恶心、呕吐、腹胀明显，有腹膜刺激征，腹腔穿刺液淀粉酶含量增高，最可能损伤的脏器是

- A. 肠
- B. 胰
- C. 脾
- D. 肝
- E. 肾

参考答案：B

参考解析：结合患者的症状以及临床检查可考虑该患者损伤脏器为胰。选项B正确当选。

74. 患者，男，50岁。夜间右足背蛇咬伤8小时，蛇种类不清，局部伤口无红肿，疼痛轻微，感觉麻木，头昏、眼花、嗜睡、气急，四肢麻痹，张口困难，双目直视，眼睑下垂，神志模糊，舌质红，苔薄白，脉弦数。最可能的诊断为

- A. 火毒
- B. 风毒
- C. 风火毒
- D. 热毒
- E. 湿毒

参考答案：B

参考解析：风毒（神经毒）证的证候：局部伤口无红肿，疼痛轻微，感觉麻木；全身症状有头昏、眼花、嗜睡、气急，严重者呼吸困难，四肢麻痹，张口困难，口角流涎，双目直视，眼睑下垂，复视，表情肌麻痹，神志模糊甚至昏迷；舌质红，苔薄白，脉弦数或迟弱。治法：活血通络，驱风解毒。方药：活血驱风解毒汤（经验方）加减。

75. 患者面部突发肿物，直径约 1cm，质软，边界清楚，表面与皮肤粘连，肿物中央皮肤表面有一小孔。应首先考虑的诊断是

- A. 脂肪瘤
- B. 纤维瘤
- C. 神经纤维瘤
- D. 皮脂腺囊肿
- E. 动脉血管瘤

参考答案：D

参考解析：皮脂腺囊肿可单发或多发，多呈圆形，直径多在 1~3cm，略隆起。质软，界清，表面与皮肤粘连，稍可移动，肿物中央皮肤表面可见一小孔，有时可见一黑色粉样小栓。一般无自觉症状，合并感染时，局部可出现红肿、疼痛、触痛、化脓甚至破溃。选项 D 正确当选。

76. 23 岁妇女，月经规则 6/35 天一次，末次月经 8 月 20 日，推算其排卵期应为

- A. 9 月 5 日左右
- B. 9 月 7 日左右
- C. 8 月 30 日左右
- D. 9 月 4 日左右
- E. 9 月 11 日左右

参考答案：E

参考解析：排卵多发生在下次月经来潮前 14 日左右。此病人末次月经 8 月 20 日，推算下次月经为 9 月 25 日左右，故推算其排卵期应在 9 月 11 日左右。选项 E 正确当选。

77. 患者，女，孕 37 周，常规产检，结果为“胎儿宫内缺氧？待查”，以下不能提示存在宫内缺氧的是

- A. 12 小时胎动计数小于 3 次
- B. 胎动消失
- C. 胎动频繁挣扎
- D. 观察 20 分钟无胎动，提示胎儿储备能力下降
- E. 胎动受声振刺激后加强

参考答案：D

参考解析：胎动为胎儿在宫内的健康状况的一种标志。不同孕周胎动数值不一。足月时，12 小时胎动次数 >100 次。晚间胎动多于白天。胎动减少可能示胎儿宫内缺氧。对高危妊娠孕妇应作胎动计数，每天早、中、晚计数三次，每次一小时，三次之和×4、即为 12 小时胎动次数。>30 次/12h 表示正常，<20 次/12h 表示胎儿宫内缺氧。如胎动逐渐减少，表示缺氧在加重。12 小时内无胎动，即使胎心仍可听到，也应引起高度警惕。答案选项中观察 20 分

钟无胎动，还不能提示存在宫内缺氧的情况，需要进一步检查。

78. 患者，女，24岁，已婚。孕39周，阵发性下腹痛约13小时，伴阴道少许出血，肛门坠胀，有排便感。检查：宫缩45秒/3分钟，宫口已开大达9cm。其诊断是

- A. 分娩先兆
- B. 先兆早产
- C. 已临产，第一产程
- D. 已临产，第二产程
- E. 已临产，第三产程

参考答案：C

参考解析：第一产程：①规律宫缩。②宫颈扩张，子宫颈口逐渐扩张，从1cm开张到10cm为宫口开全。③胎头下降，伴随着宫缩和宫颈扩张，胎先露逐渐下降。④胎膜破裂。选项C正确当选。

79. 初产妇，24岁。从分娩后第3天体温在38.5℃左右，子宫收缩好，无压痛，会阴伤口无肿胀及压痛，恶露淡红色，无臭味，双乳肿胀且硬。首先应考虑的诊断是

- A. 会阴伤口感染
- B. 乳腺炎
- C. 产褥感染
- D. 上呼吸道感染
- E. 泌乳热

参考答案：C

参考解析：产后随子宫蜕膜的脱落，含有血液、坏死蜕膜等组织经阴道排出，称恶露。正常恶露有血腥味，但无臭味，持续4~6周。总量250~500mL。选项C正确当选。

80. 小儿，男，3岁，站位测身高91cm，体重14kg。评价其生长发育状况最恰当的是

- A. 正常范围
- B. 身长体重低于正常
- C. 身长正常，体重低于标准
- D. 体重正常，身长低于标准
- E. 身长体重超过正常

参考答案：A

参考解析：根据公式：1岁至青春前期体重：年龄×2(kg)+8(kg)。2~12岁身高(长)的估算公式为：身高(cm)=7×年龄+75。结合题干中给出的信息，此小儿的生长发育状况是在正常范围内。故正确的选项是A。

81. 足月女婴，25天。出生后2周出现身黄，目黄，其色晦暗，持续不退，精神倦怠，四肢欠温，不欲吮乳，大便溏薄，小便短少，舌质偏淡，舌苔白腻。治疗应首先考虑的方剂是

- A. 茵陈理中汤
- B. 茵陈蒿汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 茵陈四苓汤
- E. 茵陈四逆汤

参考答案：A

参考解析：足月儿，25天出现黄疸，可诊断为病理性黄疸。面目皮肤发黄，其色晦暗，持续不退，不思乳食，舌质偏淡，舌苔白腻，辨证为寒湿阻滞证，治法为温中化湿退黄，方用茵陈理中汤加味。选项A正确当选。

82. 患儿，男，2岁。鼻塞流涕，咽部充血，兼见咳嗽较剧，咳声重浊，喉中痰鸣，舌苔厚

腻。其诊断是

- A. 感冒夹滞
- B. 感冒夹惊
- C. 感冒夹痰
- D. 风寒感冒
- E. 时行感冒

参考答案：C

参考解析：感冒夹痰的证候：感冒兼见咳嗽较剧，痰多，喉间痰鸣。治法：辛温解表，宣肺化痰；辛凉解表，清肺化痰。方药：在疏风解表的基础上，风寒夹痰证加用三拗汤、二陈汤加减。风热夹痰证加用桑菊饮加减。

83. 患儿，女，7岁。2周前曾有感冒，现发热，低热绵延，鼻塞流涕，咽红肿痛，肌痛肢楚，胸闷胸痛舌红苔薄，脉数。诊断为病毒性心肌炎，中医辨证为风热犯心证，治疗应首选的方剂是

- A. 银翘散
- B. 失笑散
- C. 生脉散
- D. 葛根黄芩黄连汤
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

参考答案：A

参考解析：病毒性心肌炎风热犯心证。证候：发热，低热绵延，或不发热，鼻塞流涕，咽红肿痛，咳嗽有痰，肌痛肢楚，头晕乏力，心悸气短，胸闷胸痛，舌质红，舌苔薄，脉数或结代。治法：清热解毒，宁心复脉。方药：银翘散加减。

84. 患儿，18个月。腹泻时轻时重，已经3个月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色白，粮神萎靡，睡时露睛，舌淡苔白，指纹色淡。治疗应首选

- A. 异功散合平胃散
- B. 附子理中汤合四神丸
- C. 保和丸合二陈汤
- D. 金匱肾气丸合人参乌梅汤
- E. 参苓白术散合理中丸

参考答案：B

参考解析：患儿腹泻时轻时重3个月，诊断为小儿腹泻。大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色白，精神萎靡，睡时露睛，舌淡苔白，指纹色淡，辨证为脾肾阳虚证，治法为温补脾肾，固涩止泻。代表方为附子理中汤合四神丸加减。选项B正确当选。

85. 患儿，男，7岁。诊断为抽动障碍。证见面色萎黄，精神疲惫，胸闷不适，食欲不振，睡卧露睛，喉中作声，肌肉抽动，时作时止，时轻时重，舌质淡，苔白或腻，脉沉弦无力，其治疗应首选

- A. 醒脾散
- B. 人参归脾汤
- C. 知柏地黄汤
- D. 归脾汤
- E. 参苓白术散

参考答案：A

参考解析：此患儿为抽动障碍脾虚肝旺证的表现。证候：面色萎黄，精神疲惫，胸闷不适，食欲不振，睡卧露睛，喉中作声，肌肉抽动，时作时止，时轻时重，舌质淡，苔白或腻，脉

沉弦无力。治法：益气健脾，平肝息风。方药：醒脾散加减。

86. 患儿，9岁。反复发作性腹痛2年余。发作时腹痛剧烈，面色苍白，大汗淋漓并伴呕吐，止后如常。舌红苔白腻，脉弦滑。查脑电图有病性放电。其病证是

- A. 风痫
- B. 惊痫
- C. 痰痫
- D. 瘀血痫
- E. 虚痫

参考答案：C

参考解析：痰痫证候：发作时痰涎壅盛，喉间痰鸣，神志恍惚，状如痴呆，或为失神，瞪目直视，或仆倒于地，手足抽搐不甚明显，肢体麻木、疼痛或头痛、腹痛，骤发骤止，日久不愈，舌苔白腻，脉弦滑。选项C正确当选。

综合分析题

患者，男，28岁。2天前被木刺刺伤手指，未进行消毒处理。现症见：指端剧烈跳痛，触之痛甚，畏寒、发热、头痛，体温38.7℃，食欲不振，疼痛造成夜眠不安，舌红，苔黄，脉数。

87. 其诊断是

- A. 手部淋巴结炎
- B. 脓性指头炎
- C. 化脓性腱鞘炎
- D. 化脓性滑囊炎
- E. 脓毒症

参考答案：B

参考解析：根据“木刺刺伤手指”及患者的现症“指端剧烈跳痛，触之痛甚”可诊断为脓性指头炎。选项B正确当选。

88. 其证型是

- A. 风毒在表证
- B. 火毒结聚证
- C. 热盛肉腐证
- D. 风毒入里证
- E. 阴虚邪留证

参考答案：C

参考解析：根据患者的现症可判断为热盛肉腐证。选项C正确当选。

89. 其治疗是

- A. 驱风镇痉
- B. 祛风镇痉，清热解毒
- C. 益胃养阴，疏风通络
- D. 补养气血，托毒透邪
- E. 清热解毒，透脓止痛

参考答案：E

参考解析：热盛肉腐证，治法为清热解毒，透脓止痛。选项E正确当选。

90. 治疗应首选

- A. 玉真散合五虎追风散加减
- B. 五味消毒饮加减



- C. 清营汤加减
- D. 托里消毒散加减
- E. 附子理中汤加减

参考答案：B

参考解析：热盛肉腐证，代表方为黄连解毒汤合五味消毒饮。选项B正确当选。

综合分析题

患儿，男，3岁。胃脘胀满，疼痛拒按，嗳腐谷酸，呕吐，呕吐物为不消化食物。舌质红，苔厚腻，脉滑。

91. 其诊断是

- A. 胃炎
- B. 腹泻
- C. 消化性溃疡
- D. 急性胰腺炎
- E. 肠蛔虫症

参考答案：A

参考解析：根据患儿的临床表现可诊断为胃炎乳食积滞证。选项A正确当选。

92. 其证型是

- A. 寒邪犯胃
- B. 乳食积滞
- C. 湿热中阻
- D. 肝气犯胃
- E. 脾胃虚寒

参考答案：B

参考解析：根据患儿的临床表现可诊断为胃炎乳食积滞证。选项B正确当选。

93. 治疗应首选

- A. 香苏散合良附丸加减
- B. 黄连温胆汤加减
- C. 保和丸加减
- D. 柴胡疏肝散加减
- E. 黄芪建中汤加减

参考答案：C

参考解析：胃炎乳食积滞证，治法：消食消乳，和胃止痛。方药：伤食用保和丸；伤乳用消乳丸。选项C正确当选。

综合分析题

某女，35岁，一周因跑步吸入冷空气后出现干咳气促、伴少量黏液痰，现咳嗽加剧，咳痰白稀，气促明显，伴头痛鼻塞、骨节酸痛、恶寒。查体：体温38.8℃，两肺闻及散在干、湿啰音，部位不固定，咳嗽后啰音消失，余未查及异常。舌淡红，苔薄白。脉浮紧。血常规：白细胞 $10.9 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.68。

94. 应首先考虑的病证诊断是

- A. 普通感冒（风寒束表证）
- B. 支原体肺炎（风热犯肺证）
- C. 急性上呼吸道感染（外寒内饮证）

- D. 大叶性肺炎（痰热郁肺证）
E. 急性支气管炎（风寒袭肺证）

参考答案：E

参考解析：患者“一周内吸入冷空气，干咳气促、伴少量黏液痰，现咳嗽加剧，咳痰白稀，气促明显，伴头痛鼻塞、骨节酸痛、恶寒。两肺闻及散在干、湿啰音，部位不固定，咳嗽后啰音消失。舌淡红，苔薄白。脉浮紧。”可考虑为急性支气管炎风寒袭肺证。选项E正确当选。

95. 以下哪种治疗措施是不恰当的
A. 适当休息，注意保暖，多饮暖水
B. 应用解热镇痛药复方阿司匹林
C. 选用茶碱类平喘药
D. 应用抗生素治疗
E. 注意保暖，避免吸入冷空气

参考答案：D

参考解析：一般不主张应用抗生素治疗急性支气管炎，但有细菌感染证据时应及时使用。选项D正确当选。

96. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 三拗汤合止嗽散加减
B. 杏苏散加减
C. 二陈汤合三子养亲汤加减
D. 小青龙汤加减
E. 麻杏石甘汤加减

参考答案：A

参考解析：急性支气管炎风寒袭肺证，治法：疏风散寒，宣肺止咳。方药：三拗汤合止嗽散加减。选项A正确当选。

97. 若患者肺热内郁，咳痰渐黄，可酌情加

- A. 生石膏、黄芩
B. 半夏、厚朴
C. 桔梗、甘草
D. 百部、紫菀
E. 前胡、瓜蒌

参考答案：A

参考解析：若夹痰湿，咳而痰黏，胸闷，加半夏、厚朴、茯苓以燥湿化痰；若风寒外束，肺热内郁，加生石膏、桑白皮、黄芩以解表清里。选项A正确当选。

综合分析题

某男，71岁，既往吸烟史50余年，慢性支气管炎20余年，常晨起咳嗽，夜间有阵咳或排痰，为大量白色黏液痰，近1年来出现劳动后气短、喘息及呼吸困难，现见咳逆喘息，不得平卧，痰多稀薄，并伴有恶寒发热，背冷无汗，渴不多饮。查体：桶状胸，呼吸动度减弱，剑突下出现收缩期心脏搏动，叩诊肺部呈过清音，心浊音界缩小，听诊两肺呼吸音减弱，呼气延长，心率90次/分，律齐。舌苔白滑，脉弦紧。肺功能检查：FEV₁/FVC50%，FEV₁，45%。

98. 应首先考虑的病证诊断是

- A. 慢性阻塞性肺病（外寒内饮证）
B. 慢性支气管炎（痰浊壅肺证）

- C. 支气管肺炎（痰热郁肺证）
- D. 肺气肿（肺肾两虚证）
- E. 支气管哮喘（痰热郁肺证）

参考答案：A

参考解析：根据患者病史及临床表现可考虑为慢性阻塞性肺疾病外寒内饮证。选项A正确当选。

99. 以下措施哪项是不合理的

- A. 应用祛痰药
- B. 缓解期长期吸入糖皮质激素
- C. 持续高浓度吸氧
- D. 应用抗生素控制感染
- E. 应用抗胆碱能药物舒张支气管

参考答案：C

参考解析：慢阻肺的治疗应选择持续低流量吸氧，一般浓度为28%~30%，应避免吸入氧浓度过高，抑制呼吸中枢而引起二氧化碳潴留。选项C正确当选。

100. 中医治法是

- A. 温肺散寒，解表化饮
- B. 清肺化痰，降逆平喘
- C. 健脾化痰，降气平喘
- D. 补肺健脾，益气平喘
- E. 补肺纳肾，降气平喘

参考答案：A

参考解析：慢阻肺外寒内饮证，治法：温肺散寒，解表化饮。选项A正确当选。

101. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 小青龙汤加减
- B. 三子养亲汤合二陈汤加减
- C. 平喘固本汤合补肺汤加减
- D. 越婢加半夏汤或桑白皮汤加减
- E. 补肺汤合四君子汤加减

参考答案：A

参考解析：慢阻肺外寒内饮证，方药：小青龙汤加减。选项A正确当选。

综合分析题

患者，男，76岁，有糖尿病史10年，近1年来头晕、头痛、颈项板紧，乏力并伴有口干口苦，烦躁易怒，大便秘结。查体：面红目赤，血管搏动征，主动脉瓣区第二心音亢进，主动脉瓣收缩期杂音。血压170/105mmHg，心率85次/分，呼吸20次/分。舌红，苔薄黄。脉弦滑。

102. 首先考虑的诊断是

- A. 高血压病（2级，中危）
- B. 高血压病（2级，中/高危）
- C. 高血压病（3级，极高危）
- D. 高血压病（3级，高危）
- E. 高血压病（2级，高危）

参考答案：B



参考解析：根据患者的糖尿病史及血压水平可考虑为高血压 2 级，中高危。选项 B 正确当选。

103. 针对该患者，以下不合理的措施是

- A. 减轻体重，低钠饮食
- B. 应使用药物降低血压
- C. 直接启动两种药物联合治疗
- D. 一周内将血压逐渐降至 140/90mmHg 以下
- E. 若出现顽固性高血压，因首先寻找原因

参考答案：D

参考解析：应尽早将血压降至低到上述目标血压水平，但并非越快越好。大多数高血压病人应在数周至数月内将血压逐渐降至目标水平。年轻、病情较短的高血压病人可较快达标。但老年人、病程较长或已有靶器官损害或并发症的病人降压速度宜适度缓慢。选项 D 正确当选。

104. 中医治法是

- A. 活血化瘀
- B. 祛痰降浊
- C. 平肝潜阳
- D. 滋补肝肾
- E. 温补肾阳

参考答案：C

参考解析：高血压肝阳上亢证，证候：头晕头痛，口干口苦，面红目赤，烦躁易怒，大便秘结，小便黄赤，舌质红苔薄黄，脉弦细有力。治法：平肝潜阳。选项 C 正确当选。

105. 治疗此证应首选的方剂是

- A. 天麻钩藤饮加减
- B. 济生肾气丸加减
- C. 半夏白术天麻汤加减
- D. 杞菊地黄丸加减
- E. 镇肝息风汤

参考答案：A

参考解析：高血压肝阳上亢证，方药：天麻钩藤饮加减。选项 A 正确当选。

106. 若出现阳亢化风者，宜加

- A. 阿胶、鸡子黄
- B. 天竺黄、黄连
- C. 龟板、鳖甲
- D. 羚羊角粉、珍珠母
- E. 酸枣仁、柏子仁

参考答案：D

参考解析：阳亢化风者，加羚羊角粉、珍珠母以镇肝息风；若大便秘结，小便黄赤者可加山栀子、大黄。选项 D 正确当选。

综合分析题

患者，男，65 岁。胃癌大部切除术后半年。

107. 胃癌最早最常见的转移方式是

- A. 直接蔓延
- B. 淋巴转移

- C. 血行转移
- D. 种植转移
- E. 上行转移

参考答案：B

参考解析：胃癌转移途径有直接蔓延、淋巴结转移、血行转移、腹腔内种植。其中淋巴结转移是最早、最常见的转移方式。选项B正确当选。

108. 早期胃癌是指病变局限在

- A. 黏膜层
- B. 黏膜层和黏膜下层
- C. 黏膜层和肌层
- D. 肌层
- E. 胃全层，未发生远处转移

参考答案：B

参考解析：早期胃癌指病灶局限且深度不超过黏膜下层的胃癌，而不论有无淋巴结转移。进展期胃癌指胃癌深度超过黏膜下层，侵及肌层者称为中期胃癌，侵及浆膜或浆膜外者称为晚期胃癌。选项B正确当选。

109. 现症见神疲乏力，面色无华，少气懒言，动则气促，自汗，消瘦。舌苔薄白，舌质淡白，边有齿痕，脉沉细无力。其中医证型是

- A. 痰湿内阻证
- B. 脾胃虚寒证
- C. 脾胃虚弱证
- D. 肝胃不和证
- E. 气血两虚证

参考答案：E

参考解析：胃癌气血两虚证，证候：神疲乏力，面色无华，少气懒言，动则气促，自汗，消瘦，舌苔薄白，舌质淡白，舌边有齿痕，脉沉细无力或虚大无力。选项E正确当选。

综合分析题

患者，男，36岁。水肿1年，晨起颜面水肿，纳差，乏力，肢节酸重，腰痛，伴胸闷气喘，腹胀膨隆。查体：面色萎黄，踝部浮肿，血压150/90mmHg。舌淡红苔薄白，脉细弱。生化检查：白蛋白25g/L，甘油三酯2.8mmol/L，胆固醇6.0mmol/L。尿常规检查：尿蛋白(+++)。24小时尿蛋白量：3.6g/d。肾功能检查：GFR115mL/min，Ccr80mL/min。

110. 首先考虑的诊断是

- A. 慢性肾小球肾炎
- B. 高血压肾病
- C. 肾病综合征
- D. 慢性肾衰竭
- E. 过敏性紫癜

参考答案：C

参考解析：根据患者水肿1年，血压高，白蛋白低，大量蛋白尿，考虑为肾病综合征。选项C正确当选。

111. 以下处理措施不合理的是

- A. 利尿治疗不宜过快、过猛，以免造成有效血容量不足
- B. ACEI、ARB可用于血压正常的患者降低尿蛋白

- C. 使用糖皮质激素应初始足量，缓慢减量，长期维持
- D. 首选细胞毒药物
- E. 用血浆或血浆白蛋白等静脉输注提高血浆渗透压

参考答案：D

参考解析：细胞毒药物这类药物可用于“激素依赖型”或“激素抵抗型”的患者，协同激素治疗。若无激素禁忌，一般不作为首选或单独治疗用药。选项D正确当选。

112. 若全身水肿，按之没指，伴有胸闷腹胀，身重困倦，纳呆，泛恶，小便短少，舌苔白腻，脉濡缓。中医治法是

- A. 疏风解表，宣肺利水
- B. 宣肺解毒，利湿消肿
- C. 健脾化湿，通阳利水
- D. 清热利湿，利水消肿
- E. 温运脾阳，利水消肿

参考答案：C

参考解析：肾病综合征水湿浸渍证，证候：全身水肿，按之没指，伴有胸闷腹胀，身重困倦，纳呆，泛恶，小便短少，舌苔白腻，脉濡缓。治法：健脾化湿，通阳利水。方药：五皮饮合胃苓汤。选项C正确当选。

113. 若浮肿明显，肌肤绷急，腹大胀满，胸闷烦热，口苦，口干，大便干结，小便短赤，舌红苔黄腻，脉沉数或濡数，治疗此证应首选的方剂是

- A. 越婢加术汤加减
- B. 麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
- C. 五皮饮合胃苓汤
- D. 疏凿饮子加减
- E. 实脾饮加减

参考答案：D

参考解析：肾病综合征湿热内蕴证，证候：浮肿明显，肌肤绷急，腹大胀满，胸闷烦热，口苦，口干，大便干结，小便短赤，舌红苔黄腻，脉沉数或濡数。治法：清热利湿，利水消肿。方药：疏凿饮子加减。选项D正确当选。

配伍选择题

- A. 风热犯肺证
- B. 燥热伤肺证
- C. 凉燥伤肺证
- D. 风寒袭肺证
- E. 痰热郁肺证

114. 某患者，咳嗽新起，咳声粗亢，或咳声嘎哑，咳痰黏稠或稠黄，咳时汗出，常伴鼻流黄涕，头痛口渴，喉燥咽痛，或有发热，微恶风寒等表证，舌苔薄黄，其中医证型是

参考答案：A

参考解析：急性支气管炎风热犯肺证，证候：咳嗽新起，咳声粗亢，或咳声嘎哑，咳痰黏稠或稠黄，咳时汗出，常伴鼻流黄涕，头痛口渴，喉燥咽痛，或有发热，微恶风寒等表证，舌苔薄黄，脉浮数或浮滑。选项A正确当选。

115. 某患者，干咳，痰少或无痰，咽干鼻燥，兼有头痛，恶寒，发热无汗，苔薄白而干，脉浮紧，其中医证型是

参考答案：C

参考解析：急性支气管炎凉燥伤肺证，证候：干咳，痰少或无痰，咽干鼻燥，兼有头痛，恶寒，发热，无汗，苔薄白而干，脉浮紧。选项 C 正确当选。

配伍选择题

- A. 肝-颈静脉反流征阴性
- B. 肝肿大伴压痛
- C. 上部部位凹陷性水肿
- D. 肺动脉瓣区第二音（P2）亢进
- E. 心尖区收缩期奔马律

116. 急性左心衰的体征是

参考答案：D

参考解析：左心衰急性肺水肿时的体征表现为心率增快，心尖区第一心音减弱，心尖部常可闻及舒张早期奔马律，肺动脉瓣区第二心音亢进，两肺满布湿性啰音和哮鸣音。选项 D 正确当选。

117. 急性右心衰的体征是

参考答案：B

参考解析：右心衰时的体征：（1）颈静脉怒张：显示体循环静脉压增高，当压迫腹部肿大的肝脏时，颈静脉怒张更明显，称为肝-颈反流征阳性。（2）肝脏肿大及压痛：肝肿大常发生于下肢浮肿之前。长期肝内淤血可导致心源性肝硬化。（3）水肿：是右心衰竭较晚期的表现。水肿开始出现在身体下垂的部位，能起床活动的患者，水肿从双下肢开始，卧床的患者从腰骶部开始。严重右心衰竭者可呈现全身水肿，并伴有胸、腹水。（4）右心室增大或全心增大：心浊音界向两侧扩大，剑突下可见明显搏动。选项 B 正确当选。

配伍选择题

- A. 天麻钩藤饮
- B. 杞菊地黄丸
- C. 半夏白术天麻汤
- D. 济生肾气丸
- E. 血府逐瘀汤

118. 高血压病肝阳上亢证首选方剂是

参考答案：A

参考解析：肝阳上亢证证候：头晕头痛，口干口苦，面红目赤，烦躁易怒，大便秘结，小便黄赤，舌质红苔薄黄，脉弦细有力。治法：平肝潜阳。方药：天麻钩藤饮加减。

119. 高血压病痰湿内盛证首选方剂是

参考答案：C

参考解析：痰湿内盛证证候：头晕头痛，头重如裹，困倦乏力，胸闷，腹胀痞满，少食多寐，呕吐痰涎，肢体沉重，舌胖苔腻，脉濡滑。治法：祛痰降浊。方药：半夏白术天麻汤加减。

120. 高血压病肝肾阴虚证首选方剂是

参考答案：B

参考解析：肝肾阴虚证证候：头晕耳鸣，目涩，咽干，五心烦热，盗汗，不寐多梦，腰膝酸软，大便干涩，小便热赤，舌质红少苔，脉细数或弦细。治法：滋补肝肾，平潜肝阳。方药：杞菊地黄丸加减。

配伍选择题

- A. 质子泵抑制剂+羟氨苄青霉素+铋剂
- B. 铋剂+克拉霉素+甲硝唑
- C. 质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素+甲硝唑
- D. 质子泵抑制剂+铋剂+克拉霉素
- E. 铋剂+克拉霉素+甲硝唑+羟氨苄青霉素

121. 治疗消化性溃疡的三联疗法是

参考答案：B

参考解析：三联疗法为质子泵抑制剂或铋剂，再加上任两种抗生素。选项 B 正确当选。根除幽门螺杆菌的常用三联疗法

122. 治疗消化性溃疡的四联疗法是

参考答案：C

参考解析：四联疗法为质子泵抑制剂与铋剂合用，再加上任两种抗生素。选项 C 正确当选。

配伍选择题

- A. 左归丸合当归补血汤
- B. 清瘟败毒饮
- C. 六味地黄丸合桃红四物汤
- D. 八珍汤
- E. 左归丸、右归丸合当归补血汤

123. 再障肾阴虚证，治疗应首选的方剂是

参考答案：A

参考解析：再障肾阴虚证，方药：左归丸合当归补血汤加减。选项 A 正确当选。

124. 再障肾虚血瘀证，治疗应首选的方剂是

参考答案：C

参考解析：再障肾虚血瘀证，方药：六味地黄丸或金匱肾气丸合桃红四物汤加减。选项 C 正确当选。

配伍选择题

- A. 逍遥散合二陈汤加减
- B. 龙胆泻肝汤加减
- C. 天王补心丹加减
- D. 生脉散加味
- E. 安神定志丸加减

125. 治疗甲亢肝火旺盛证宜选

参考答案：B

参考解析：肝火旺盛证证候：颈前肿胀，眼突，烦躁易怒，易饥多食，手指颤抖，恶热多汗，面红烘热，心悸失眠，头晕目眩，口苦咽干，大便秘结，月经不调，舌质红，舌苔黄，脉弦数。治法：清肝泻火，消瘿散结。方药：龙胆泻肝汤加减。

126. 治疗甲亢阴虚火旺证宜选

参考答案：C

参考解析：阴虚火旺证证候：颈前肿大，眼突，心悸汗多，手颤，易饥多食，消瘦，口干咽燥，五心烦热，急躁易怒，失眠多梦，月经不调，舌质红，舌苔少，脉细数。治法：滋阴降火，消瘿散结。方药：天王补心丹加减。

127. 治疗甲亢气阴两虚证宜选

参考答案：D

参考解析：气阴两虚证证候：颈前肿大，眼突，心悸失眠，手颤，消瘦，神疲乏力，气短汗多，口干咽燥，手足心热，纳差，大便溏薄，舌质红或淡红，舌苔少，脉细或细数无力。治法：益气养阴，消瘿散结。方药：生脉散加味。

128. 治疗甲亢气滞痰凝证宜选

参考答案：A

参考解析：气滞痰凝证证候：颈前肿胀，烦躁易怒，胸闷，两胁胀满，善太息，失眠，月经不调，腹胀便溏，舌质淡红，舌苔白腻，脉弦或弦滑。治法：疏肝理气，化痰散结。方药：逍遥散合二陈汤加减。

配伍选择题

A. 透托法

B. 温通法

C. 清热法

D. 消法

E. 补托法

129. 肿疡已成，毒盛正气不虚，尚未溃破或溃而脓出不畅者，治疗应首选

参考答案：A

参考解析：透托法用于毒气虽盛而正气未衰者。选项A正确当选。

130. 没有成脓的初期肿疡，治疗应首选

参考答案：D

参考解析：消法适用于尚未成脓的初期肿疡。选项D正确当选。

配伍选择题

A. 黏膜表面麻醉

B. 局部浸润麻醉

C. 区域阻滞麻醉

D. 神经阻滞麻醉

E. 以上均非

131. 常用于眼、鼻腔、咽喉、气管及尿道等部位的表浅手术的麻醉方法是

参考答案：A

参考解析：黏膜表面麻醉：用渗透性强的局麻药与黏膜接触，产生黏膜痛觉消失的方法称为黏膜表面麻醉，亦称为黏膜麻醉。常用于眼、鼻腔、咽喉、气管及尿道等部位的表浅手术或内镜检查术。

132. 适用于皮下小囊肿摘除的麻醉方法是

参考答案：C

参考解析：区域阻滞麻醉：在手术部位的周围和基底部浸润局麻药，以阻滞进入手术区域的神经支和神经末梢，称区域阻滞麻醉。本法最适用于皮下小囊肿摘除，浅表小肿块活检，舌、阴茎或带蒂肿块等手术和乳腺手术。

配伍选择题

A. 10%葡萄糖酸钙

B. 5%碳酸氢钠

C. 10%氯化钾



D. 5%葡萄糖溶液

E. 5%葡萄糖盐水

133. 在补液时，当尿量尚未监测时，不应补充

参考答案：C

参考解析：钾的补充原则是尿多补钾，尿量 $<40\text{ml/h}$ ，或24小时尿量少于500ml，暂不补钾。故尿量尚未监测时不应补钾。

134. 高渗性缺水最好首先采用何种液体进行纠正

参考答案：D

参考解析：高渗性缺水最好先补等渗液。选项中5%葡萄糖溶液为等渗液。

配伍选择题

A. 立即停止输血，半坐位，吸氧和利尿

B. 主要措施为抗休克、抗感染，包括使用广谱抗生素、补液、利尿、降温、纠酸等

C. 立即减慢输血速度，严重者停止输血，抑制发热反应的常用药物为解热镇痛药

D. 保证血源质量，防止血源污染，严格无菌操作

E. 停止输血，积极抗休克、维持循环功能、保护肾功能和防治弥散性血管内凝血（DIC）

135. 针对输血后的细菌污染反应，应采取上述的治疗方法为

参考答案：B

参考解析：细菌污染反应采取有效的抗休克、抗感染治疗。选项B正确当选。

136. 针对输血后的溶血反应，应采取上述的治疗方法为

参考答案：E

参考解析：溶血反应：①抗休克。②保护肾功能。③若DIC明显，则使用肝素。④必要时行血浆交换治疗。⑤若血压低，则使用多巴胺、间羟胺升压。选项E正确当选。

配伍选择题

A. 阴阜

B. 小阴唇

C. 大阴唇

D. 前庭大腺

E. 阴道前庭

137. 耻骨联合前面隆起的脂肪垫是

参考答案：A

参考解析：阴阜为耻骨联合前面隆起的脂肪垫。选项A正确当选。

138. 当外阴部发生炎症时，最易形成囊肿的部位是

参考答案：D

参考解析：前庭大腺最易形成囊肿。选项D正确当选。

配伍选择题

A. 子宫增大

B. 宫颈变软

C. 子宫肌细胞肥大

D. 足月时子宫动脉变直

E. 临产后子宫峡部可伸至6~10cm

139. 妊娠期生殖系统的变化哪项不正确

参考答案：E

参考解析：临产后子宫峡部可伸至7~10cm。选项E正确当选。

140. 子宫增大的原因为

参考答案：C

参考解析：子宫肌细胞肥大从而导致子宫增大，其他的是子宫增大的程度不是原因。选项C正确当选。

配伍选择题

A. 32cm

B. 34cm

C. 46cm

D. 48cm

E. 50cm

141. 正常2岁小儿，其头围大小是

参考答案：D

参考解析：正常2岁小儿头围是48cm。选项D正确当选。

142. 正常5岁小儿，其头围大小是

参考答案：E

参考解析：正常5岁小儿头围是50cm。选项E正确当选。

配伍选择题

A. 出生后2周

B. 出生后2~3天

C. 出生后6~7天

D. 出生后24小时

E. 出生后4~5天

143. 生理性胎黄，黄疸出现的时间是

参考答案：B

参考解析：生理性黄疸出生后2~3天出现。选项B正确当选。

144. 病理性胎黄，黄疸出现的时间是

参考答案：D

参考解析：病理性黄疸生后24小时出现。选项D正确当选。

配伍选择题

A. 柯萨奇病毒

B. 合胞病毒

C. 轮状病毒

D. 腺病毒

E. 流感病毒

145. 咽-结合膜热的主要病原体是

参考答案：D

参考解析：咽-结合膜热由腺病毒3、7型所致，常发生于春夏季，多呈高热、咽痛、眼部刺痛。选项D正确当选。

146. 秋季腹泻最常见的病原体是

参考答案：C

参考解析：80%婴幼儿腹泻是由病毒感染引起的，病毒性肠炎主要病原为轮状病毒，其次为肠道病毒（包括柯萨奇病毒、埃可病毒、肠道腺病毒）。选项C正确当选。

配伍选择题

- A. 心忡不宁，胸闷憋气，心前区痛如针刺，舌质紫暗，脉结代
- B. 心悸不宁，憋气乏力，少气懒言，烦热口渴，舌红少苔，脉细数
- C. 心悸怔忡，神疲乏力，畏寒肢冷，舌质淡胖，脉缓无力
- D. 寒热起伏，心悸胸闷，肌肉酸痛，腹痛泄泻，舌质红，苔黄腻，脉濡数
- E. 心悸气短，胸闷胸痛，发热咳嗽，咽红肿痛，舌红脉数

147. 病毒性心肌炎湿热侵心证的证候有

参考答案：D

参考解析：D为病毒性心肌炎湿热侵心证。选项D正确当选。

148. 病毒性心肌炎痰瘀阻络证的证候有

参考答案：A

参考解析：A为病毒性心肌炎痰瘀阻络证。选项A正确当选。

配伍选择题

- A. 经间期出血
- B. 月经先后无定期
- C. 产后小便异常
- D. 恶阻
- E. 带下病

149. 与肾阴虚有关的病证是

参考答案：A

参考解析：肾阴亏虚，精亏血少，冲任不足，血海不能按时满盈，出现月经后期、月经过少、闭经；冲任亏虚，不能摄精成孕，出现不孕；虚热内生，热扰冲任，血海不宁，迫血妄行，可致月经先期、经间期出血、崩漏等。选项A正确当选。

150. 与脾虚运化失司有关的病证是

参考答案：D

参考解析：偏脾虚者易见月经过多、经行泄泻、妊娠恶阻、子肿。选项D正确当选。

