

2022年中西医医师资格执业押题

第四单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列选项为饮食不洁同时感受外邪最易发生的是
 - 漏
 - 痈
 - 岩
 - 痰
 - 疡
- 除以下哪项外,均是血管瘤的治疗方法
 - 穿刺
 - 手术
 - 放射
 - 冷冻
 - 硬化剂注射
- 以下情况属于补托法的适应症的是
 - 气血生化不及而致其功能失常
 - 身体经络的局部虚弱
 - 毒气虽盛而正气未衰
 - 正虚毒盛,正气不能托毒外达
 - 肿疡邪毒不致结聚成脓而得到消散
- 灭菌的概念为
 - 杀灭一切活的微生物
 - 杀灭病原微生物
 - 杀灭细菌
 - 杀灭有害微生物
 - 杀灭芽孢类微生物
- 局部浸润麻醉的适应症不包括
 - 鼻腔部位手术
 - 皮下小囊肿摘除
 - 甲状腺腺瘤摘除术
 - 封闭治疗
 - 浅表小肿块活检
- 关于溶血反应的治疗,错误的是
 - 抗休克
 - 换血治疗
 - 保护肾功能
 - 防治弥散性血管内凝血
 - 使用抗组胺药物
- 适用于肿疡、溃疡、皮肤病糜烂结痂渗液不多的是
 - 箍围药
 - 油膏
 - 膏药
 - 掺药
 - 草药
- 对于高血压患者,术前应将血压维持在
 - 140/90mmHg 以下
 - 130/80mmHg 以下
 - 130-140/80-90mmHg
 - 160/100mmHg 以下
 - 140/80mmHg 以下
- 外科常见休克厥逆型选方应为
 - 生脉饮
 - 独参汤
 - 人参养营汤
 - 四味回阳汤
 - 保元饮合固阴煎
- 下列哪项属于食管癌津亏热结证用方的是
 - 二陈汤加减
 - 大补元煎加减
 - 五汁安中饮加味
 - 启膈散合逍遥散加减
 - 桃红四物汤合犀角地黄汤加减

11. 肾气、天癸、气血、冲任通过何处来产生月经

- A. 经络
- B. 天癸
- C. 胞络
- D. 胞宫
- E. 胞脉

12. 以下不属于子宫在中医中的称谓的是

- A. 胞宫
- B. 子脏
- C. 子处
- D. 女子胞
- E. 龙门

13. 以下关于产道的检查的描述, 错误的是

- A. 耻骨弓角度正常值为 90°
- B. 坐骨棘间径正常值为11cm
- C. 骶棘韧带宽度正常情况能容纳三横指, 否则为中骨盆狭窄
- D. 骨盆入口前后径长度正常值约11cm
- E. 软产道包括对子宫下段、宫颈、阴道以及盆底软组织

14. 卵泡早期分泌量少, 其后逐渐增高, 排卵前达高峰, 以后降低, 黄体期再度增高. 符合上述变化的激素是

- A. 促卵泡素
- B. 促黄体素
- C. 雌激素
- D. 泌乳素
- E. 孕激素

15. 在产后三审中, 验津液之盛衰的是

- A. 乳汁的多少
- B. 饮食的多少
- C. 小腹的痛与不痛
- D. 大便的通与不通
- E. 小便的利与不利

16. 中医认为, 妇产科疾病的发生与中哪些情志致病因素关系最为密切

- A. 喜、怒、忧
- B. 喜、悲、惊
- C. 忧、恐、惊
- D. 喜、忧、恐

E. 怒、思、恐

17. 导致胎膜早破的病因是

- A. 胎膜受力不均
- B. 生殖道感染
- C. 羊膜腔压力增高
- D. 营养因素
- E. 以上都是

18. 宫腔注药法禁用于

- A. 慢性子宫内膜炎
- B. 输卵管阻塞
- C. 急性盆腔炎
- D. 慢性输卵管炎
- E. 以上都是

19. 以下哪项是异位妊娠的基本病机

- A. 肾气亏虚
- B. 湿热下注
- C. 瘀血阻滞冲任胞宫
- D. 冲任不固, 带脉失约
- E. 少腹血瘀实证

20. 先兆子宫破裂的四个重要症状不包括

- A. 病理缩复环
- B. 下腹部压痛
- C. 胎心率变化
- D. 子宫痉挛性狭窄环
- E. 血尿

21. 正常8个月小儿体重约

- A. 9kg
- B. 8kg
- C. 7kg
- D. 10kg
- E. 11kg

22. 下列脏腑与厌食关系密切的是

- A. 肾与膀胱
- B. 肝胆
- C. 脾胃
- D. 心与小肠
- E. 肺与大肠

23. 儿童糖尿病的诊断标准是

- A. 空腹血糖 7.0mmol/L
- B. 空腹血糖>6.0mmol/L
- C. 空腹血糖 6.9mmol/L
- D. 随机血糖 10.0mmol/L
- E. 随机血糖<11.1mmol/L

24. 小儿发生壮热、昏迷、抽搐之惊风、疫毒痢、暑温等疾病, 多与下列那些脏腑关系最密切

- A. 肝、肾
- B. 肺、脾
- C. 脾、肾
- D. 心、肝
- E. 肺、脾、肾

25. 关于望诊的说法错误的是

- A. 面呈黑色, 主寒证、肾虚、痛证、瘀证、水饮内停
- B. 头方发少、囟门迟闭, 可见于佝偻病
- C. 肛门瘙痒, 入夜尤甚, 多为蛲虫侵扰
- D. 端坐喘促, 痰鸣哮喘, 多为哮喘
- E. 口腔、舌部黏膜破溃糜烂, 满口白屑, 状如雪花, 多见于麻疹黏膜斑

26. 小儿肺炎变证之心阳虚衰证, 治疗方剂为

- A. 麻杏石甘汤
- B. 桑菊饮
- C. 参附龙牡救逆汤
- D. 五虎汤合葶苈大枣泻肺汤
- E. 麻杏石甘汤合银翘散

27. 关于病毒性心肌炎的中医病因病机, 说法错误的是

- A. 小儿素体正气亏虚是发病之内因
- B. 耗气伤阴、血脉阻滞为主要病理变化
- C. 病理产物为瘀血、痰浊
- D. 病变部位主要在心, 常涉及脾、肾
- E. 发病外因为温热邪毒侵袭

28. 鹅口疮的病原体是

- A. 柯萨奇病毒
- B. 白色念珠菌
- C. 葡萄球菌
- D. 流感杆菌
- E. 链球菌

29. 小儿急性肾小球肾炎邪陷心肝证的治法是

- A. 疏风利水, 清热解毒
- B. 疏风宣肺, 利水消肿
- C. 清热解毒, 活血化瘀
- D. 泻肺逐水, 疏风利水
- E. 平肝泻火, 清心利水

30. 下列哪项为治疗小儿癫痫持续状态的首选药物

- A. 苯巴比妥
- B. 水合氯醛
- C. 地西洋
- D. 苯妥英钠
- E. 甘露醇

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

31. 患者, 女, 28岁, 因重度贫血输入大量库存血, 后出现四肢乏力、手足麻木, 伴心律减慢, 听诊心音遥远而弱, 心电图早期T波高尖, 基底变窄, 该症状属于

- A. 重度脱水
- B. 中度脱水
- C. 轻度脱水
- D. 高钾血症
- E. 低钾血症

32. 患者, 女, 20岁, 发现颈前区单一肿块4个月, 随吞咽上下活动, 边界清楚, B超示: 甲状腺B超: 左侧甲状腺内见一0.15*0.2cm低回声结节, 边界清楚, 包膜完整. 现症: 颈部肿块不红、不热、不痛; 伴烦躁易怒, 胸胁胀满; 舌苔白, 脉弦. 应首先考虑的诊断是

- A. 甲状腺功能减退症 肝郁气滞证
- B. 单纯性甲状腺肿 痰凝血瘀证
- C. 甲状腺腺瘤 痰凝血瘀证
- D. 甲状腺癌 气滞痰凝证

E.甲状腺腺瘤 肝郁气滞证

33. 患者,女,54岁,面部出现有红、肿、热、痛的小结节,逐渐肿大并隆起,出现脓栓,应诊断为

- A. 痰核
- B. 疔
- C. 痈
- D. 丹毒
- E. 疽

34. 患者,女,35岁,不慎被热水烫伤双足,患处现有水疱,创面微湿,红白相间,痛觉较迟钝.初步估计烫伤面积和烧伤深度为

- A. 6%浅II°
- B. 7% I°
- C. 6% 浅II°
- D. 7% 深II°
- E. 8% III°

35. 男性,40岁.背部起一肿块,初起时呈片状稍隆起的紫红色浸润区,质地坚韧,界限不清,随后肿块上有粟粒状脓头,肿块渐向周围扩大,脓头增多,色红灼热疼痛;舌红,苔黄,脉滑数.该患者应该选用的治法是

- A. 和营托毒,清热利湿
- B. 祛风清热利湿
- C. 清热利湿解毒
- D. 补益气血,托毒生肌
- E. 滋阴生津,清热托毒

36. 患者,女性,26岁,初产妇,产后3周双乳出现红肿热痛,可触及包块,现症: 肿块逐渐增大,皮肤烦红灼热,疼痛剧烈,呈持续性搏动性疼痛,壮热不退,口渴喜饮,患部拒按,按之应指.舌质红,苔黄腻,脉滑数.首选治疗为

- A. 瓜蒌牛蒡汤 维生素E
- B. 五味消毒饮合透脓散 青霉素
- C. 托里消毒散 青霉素
- D. 逍遥散 切开排脓
- E. 五味消毒饮合透脓散 切开排脓

37. 患者,男,53岁,消化性溃疡反复发作17年,近1周有溃疡病活动症状,今日突然出现持续性上腹部剧烈疼痛、恶心呕吐,伴轻度休克症状,查体: 腹部压痛及腹肌强直,腹腔内积气积液,为明确诊断需进行的检查为

- A. 腹部CT
- B. 腹部B超发现包块
- C. 立位腹部透视
- D. 血常规
- E. 血淀粉酶测定

38. 邢某,男性,43岁,慢性乙肝病史9年,近期出现乏力、嗜睡、厌食、脾肿大、脾功能亢进、腹水,现症: 腹大胀满,按之如囊裹水,颜面浮肿,得热稍舒,精神困倦,怯寒懒动,小便少,大便溏;苔白腻,脉缓.该患者的治疗选方为

- A. 中满分消丸
- B. 五苓散
- C. 真武汤
- D. 膈下逐瘀汤
- E. 实脾饮

39. 患者,男,4岁,啼哭时可见腹股沟上段内侧由外上向内下前斜行凸现一圆形囊性包块,平卧时可自行回纳.包块消失后,用手指紧压腹股沟管腹环处,嘱患儿咳嗽、站立或鼓腹,包块不再出现.应首先考虑的诊断是

- A. 腹股沟直疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 股疝
- D. 脐疝
- E. 切口疝

40. 患者,女,61岁,既往高血压病史3年,高血脂病史1年,现出现右下肢酸痛、麻木、皮温发凉,伴间歇性跛行,夜间症状明显加重.现症: 右下肢发凉麻木、刺痛,夜间静息疼痛,病位有瘀点瘀斑,皮色紫红色;舌有瘀点、瘀斑,脉弦涩.治疗选方为

- A. 桃仁红花煎
- B. 四妙勇安汤
- C. 桃红四物汤
- D. 丹参饮
- E. 阳和汤

41. 患者,男,40岁,工作时足部被钉子穿透后,自行简单处理后,未至医院就诊.受伤后第二天出现头昏头痛、失眠,伤口局部疼痛,附近肌肉有牵拉感,遂至医

院就诊。现逐渐咀嚼不便、张口困难、苦笑面容。对于本病患者死亡的主要原因为

- A. 病毒性脑炎
- B. 酸中毒
- C. 水、电解质紊乱
- D. 肺部感染
- E. 呼吸困难、窒息

42. 患者,女,26岁,从梯子上跌伤后枕部着地,伤后有意识障碍约一刻钟,清醒后出现头昏并呕吐多次,有近事遗忘症,神经系统检查结果为阴性.应诊断为

- A. 脑震荡
- B. 脑挫伤
- C. 硬膜外血肿
- D. 原发性脑干损伤
- E. 继发性脑干损伤

43. 患者,男,32岁,2小时前突发右下腹疼痛,查体发现右下腹局限性显著压痛,结肠充气试验阳性,现症:转移性右下腹痛,呈持续性、进行性加剧,右下腹拒按;伴恶心纳差,轻度发热;苔白腻,脉弦紧.该患者治疗宜选用

- A. 复方大柴胡汤合红藤煎剂
- B. 大黄牡丹汤合透脓散
- C. 大黄牡丹汤
- D. 复方大柴胡汤
- E. 大黄牡丹汤合红藤煎剂

44. 患者,女,40岁,半年前触及左侧乳房见一肿块,较小,发展缓慢,每于月经前1周出现疼痛,经后疼痛消失,遂就诊.现症:乳房肿块结节感明显,胀痛轻微;伴月经紊乱,量少,色淡,腰酸乏力.舌质淡红,苔薄白,脉弦细.治疗应首选的方剂为

- A. 二仙汤
- B. 逍遥散
- C. 失笑散合开郁散
- D. 逍遥散合桃红四物汤
- E. 桃红四物汤合失笑散

45. 患者,男,47岁,右上腹痛2个月,发热8天.患者2个月前无明显诱因出现右上腹持续性胀痛,逐渐加重,8天前发热,体温最高达38℃.既往发现HBsAg(+)9年.巩膜轻度黄染,胸前可见蜘蛛.腹部膨隆,脐周可见静脉曲张.总胆红素41.8 μmol/L,直接胆红素25.1 μmol/L.AFP 524ng/ml.腹部B超:肝右叶近肝门见一大小约6cm×5.5cm病变,边界不清,内部回声.现症:脘腹胀满,胁痛肢楚,神疲乏力,纳呆便溏,四肢肿胀;舌淡胖,苔白腻,脉弦而滑.考虑该患者诊断为

- A. 病毒性肝炎 肝肾阴虚证
- B. 肝硬化 脾虚湿困证
- C. 原发性肝癌 脾虚湿困证
- D. 原发性肝癌 痰湿阻滞证
- E. 肝硬化失代偿期 气滞血瘀证

答案: C

解析: 根据"右上腹痛2个月,发热8天.患者2个月前无明显诱因出现右上腹持续性胀痛,逐渐加重,8天前发热,体温最高达38℃.既往发现HBsAg(+)9年.巩膜轻度黄染,胸前可见蜘蛛.腹部膨隆,脐周可见静脉曲张.总胆红素 41.8 μmol/L,直接胆红素25.1 μmol/L.AFP 524ng/ml.腹部B超:肝右叶近肝门见一大小约6cm×5.5cm病变,边界不清,内部回声"诊断为原发性肝癌.根据"脘腹胀满,胁痛肢楚,神疲乏力,纳呆便溏,四肢肿胀;舌淡胖,苔白腻,脉弦而滑"辨证为脾虚湿困证,治法为益气健脾,化湿祛痰,方药为四君子汤合逍遥散.

46. 李某,女,32岁,产后3小时内因出现子宫收缩乏力出现失血量达700mL,应采取的措施是

- A. 应给与抗生素
- B. 让产妇排尿与排便
- C. 让产妇进食清淡半流食
- D. 适当补充维生素和铁剂
- E. 按摩子宫并肌注子宫收缩剂

答案: E

解析: 胎儿娩出后24小时内失血量 500mL可诊断为产后出血,若病因为子宫收缩乏力,可采用以下方法加强宫缩: 按摩子宫. 应用宫缩剂. 可采用宫腔纱条填塞法压迫止血、结扎盆腔血管或行髂内动脉或子宫动脉栓塞,必要时行子宫次全切除术或子宫全切除术.

47. 患者,女,31岁,妊娠中晚期出现肢体面目肿胀,可能诊断为

- A. 子冒
- B. 子晕
- C. 子痫
- D. 子肿
- E. 晕厥

48. 王某,女,34岁,以往有多次刮宫史,妊娠32周出现无诱因、无痛性反复阴道流血,考虑诊断为

- A. 胎动不安
- B. 胎膜早破
- C. 前置胎盘
- D. 胎盘早剥
- E. 异位妊娠

49. 李某,28岁,既往哮喘病史,妊娠34周,近期哮喘发作,服用气管扩张剂后效果一般,现胎心基线下降至107bpm持续12分钟,基线变异 5bpm,伴晚期减速,最有可能的诊断是

- A. 胎膜早破
- B. 胎盘早剥
- C. 羊水栓塞
- D. 前置胎盘
- E. 胎儿窘迫

50. 25岁妇女,月经规则5/33天一次,末次月经8月25日,推算其排卵期应在

- A. 9月13日左右
- B. 9月9日左右
- C. 9月12日左右
- D. 9月10日左右
- E. 9月5日左右

51. 邢某,初产妇,28岁,产后身热多汗,烦渴引饮,头晕头痛,现神昏谵语,灼热烦躁,猝然晕倒,不省人事,身热肢厥,牙关紧闭;舌绛,脉洪大.治法是

- A. 清营泻热,清心开窍
- B. 活血化瘀,镇逆安神
- C. 清暑泄热,透邪外达
- D. 清热解暑,益气生津
- E. 补益心脾,养血安神

52. 患者,女,33岁.近2年经前小腹疼痛,有灼热感,拒按,遇热痛增,月经先期、量多、经色深红、质黏稠夹血块,心烦口渴,溲黄便结,性交疼痛,盆腔结节包块触痛明显;舌红有瘀点,苔黄,脉弦数,诊断为子宫

内膜异位症。治疗首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 理冲汤
- E. 清热调血汤

53. 患者,女,26岁,孕51天,近3天出现阴道下血,腰酸腹痛下坠,色暗红;舌边有瘀点,脉弦滑.B超示宫内胚胎存活。治疗选用的方剂是

- A. 寿胎丸
- B. 胎元饮
- C. 桂枝茯苓丸合寿胎丸
- D. 补肾固冲丸
- E. 当归散

54. 患者,女,48岁.外阴瘙痒逐渐加重3年,抓破后伴有局部疼痛.查见大阴唇、阴唇间沟等处皮肤有抓痕,黏膜变白,皮肤变薄、干燥、失去弹性。首先考虑的诊断是

- A. 外阴慢性单纯性苔藓
- B. 外阴硬化性苔藓
- C. 外阴白癜风
- D. 外阴银屑病
- E. 外阴湿疹

55. 张某,女,18岁,月经停闭,第二性征已发育,但月经尚未来潮,现症: 小腹冷痛拒按,得热痛减,面色青白、形寒肢冷;舌紫黯,苔白,脉沉紧.治法是

- A. 温经散寒,活血通经
- B. 益气健脾,养血调经
- C. 燥湿化痰,活血通经
- D. 养阴清热,养血调经
- E. 行气活血,祛瘀通经

56. 苏某,女性,34岁.近半年,月经周期缩短,5天/24天,月经提前,量多,经色紫红,质稠,面红颧赤,心烦口渴,溲黄便结;舌红苔黄,脉滑数.B超: 子宫及附件未见异常.基础体温呈双相型,高温相9天.治疗应首选

- A. 补中益气汤
- B. 固阴煎
- C. 清经散
- D. 丹栀逍遥散
- E. 两地汤

57. 患者,女,61岁.近2年劳动、行走或咳嗽时阴道内有物脱出,妇科检查发现: 子宫颈已脱出阴道口,但

宫体仍在阴道内。现症：阴中有物脱出，腰酸腿软，头晕耳鸣，小便频数，小腹下坠；舌质淡，苔薄，脉沉弱。治疗应首选的方剂是

- A. 归脾汤
- B. 补中益气汤
- C. 大补元煎
- D. 八珍汤
- E. 举元煎

58. 张某，初产妇，29岁，产后小便不通，小腹胀急疼痛，伴腰膝酸软，面色晦暗，舌淡，苔润，脉沉细迟弱。可辨证为

- A. 气滞证
- B. 肺脾气虚证
- C. 肾阳亏虚证
- D. 血瘀证
- E. 气虚证

59. 徐某，女，结婚5年未避孕未孕，月经先期，量少色淡，头晕耳鸣，腰酸腿软，五心烦热。舌红，苔少，脉细数。检查排卵功能不良。治疗方剂为

- A. 开郁种玉汤
- B. 十全大补汤
- C. 启宫丸合四物汤
- D. 归肾丸合五子衍宗丸
- E. 养精种玉汤合清骨滋肾汤

60. 石某，女，26岁，因计划外妊娠，于孕12+周行流产术，术后3天起，出现阴道流血，量时多时少，色紫黯，有血块，小腹阵发性疼痛，腰骶酸胀；舌紫黯，脉细涩，治疗应选择的是

- A. 举元煎
- B. 清经散
- C. 生化汤
- D. 八珍汤
- E. 固经丸

61. 张某，刚满月。母乳喂养，准备添加辅食，添加的原则错误的是

- A. 消化不良时应暂停喂食该种辅食
- B. 不要同时添加多种辅食
- C. 从菜汁到菜泥
- D. 从米汤开始到稀粥
- E. 婴儿生病时，为补充营养，可继续添加新品种

62. 吴某，女，4岁。暴受惊恐后突然抽痉，惊惕不安，惊叫急啼，四肢厥冷，大便色青，苔薄白，脉乱不齐。治疗方剂为

- A. 镇惊丸
- B. 清营汤
- C. 犀角地黄汤
- D. 琥珀抱龙丸
- E. 清瘟败毒饮

63. 男婴，足月产，先天性胆道闭锁，出生后6小时即出现身黄、目黄、哭闹不安、呕吐、乳食不思，3周后仍未消退，血清总胆红素 133.4 μ mol/L。现症：面目皮肤发黄，色泽晦暗，精神倦怠，四肢欠温，不欲吮乳，时时啼哭，大便溏薄，小便短少，舌质偏淡，舌苔白腻。诊断为

- A. 生理性黄疸 寒湿阻滞证
- B. 病理性黄疸 湿热蕴蒸证
- C. 生理性黄疸 气滞血瘀证
- D. 病理性黄疸 寒湿阻滞证
- E. 病理性黄疸 气滞血瘀证

64. 患儿，4岁。于秋季，发热咽痛2天，体温达39.1℃，遂就诊，检查发现：咽部充血，软腭上有2~4mm大小的疱疹，疱疹周围有红晕。心肺听诊正常。可能的诊断是

- A. 咽结合膜
- B. 疱疹性咽峡炎
- C. 急性化脓性扁桃体炎
- D. 支气管炎
- E. 支气管肺炎

65. 张某，女，1岁半。舌尖、舌边出现多处疱疹，2天后溃烂，色赤疼痛，烦躁多啼，口干欲饮，小便短黄，舌尖红，苔薄黄，指纹紫。诊断为疱疹性口炎。选用的方剂为

- A. 泻心导赤散
- B. 六味地黄丸
- C. 银翘散
- D. 清胃散
- E. 清热泻脾散

66. 赵某,女,5岁,1周前出现上呼吸道感染症状.现头痛2天,呕吐伴血压增高1天,嗜睡.脑膜刺激征阳性.现症:表情淡漠,目光呆滞,喃喃自语,神识不清,口角流涎,纳差乏力,舌质胖嫩,苔白,脉弦滑.治法是

- A. 涤痰开窍
- B. 豁痰化瘀
- C. 健脾化痰
- D. 泻火涤痰
- E. 涤痰通络

67. 纪某,女,2岁.平素喜食米饭等以碳水化合物为主的食物,外表似"泥膏样",四肢水肿.现症:四肢浮肿,按之凹陷,面色无华,神疲乏力,四肢欠温,小便短少,舌质淡嫩,苔薄白,脉沉缓无力.治疗方剂为

- A. 肥儿丸
- B. 防己黄芪汤合五苓散
- C. 参苓白术散
- D. 资生健脾丸
- E. 石斛夜光丸

68. 刘某,男,4岁.1周前出现结膜充血、流泪、畏光,口腔两颊黏膜近白齿处出现直径约0.5~1mm的灰白色斑点,周围有红晕.3天前开始出疹,出疹时热象高达38.6,皮疹先见于耳后、发际,最后在手心、足心及鼻准部见疹点.现症:高热不退,咳嗽气急,鼻翼扇动,口渴烦躁,疹点密集色暗,舌红苔黄,脉数.可辨证为

- A. 麻疹顺证,初热期
- B. 风疹逆证,邪毒闭肺证
- C. 麻疹逆证,热毒攻喉证
- D. 风疹逆证,邪陷心肝证
- E. 麻疹逆证,邪毒闭肺证

69. 宋某,男,5岁.1个月前外出玩耍后,回家未洗手情况下进食零食,10天前开始腹痛,脐周为主,睡眠不安,磨牙;现症:右上腹阵发性绞痛,弯腰曲背,辗转不安,恶心、呕吐,肢冷汗出,常吐出蛔虫.舌苔黄腻,脉弦数.辨证为

- A. 厥证
- B. 蛔虫证
- C. 蛔厥证
- D. 虫疫证

E. 肠虫证

70. 患儿,男,7岁.因重症肺炎出现心搏呼吸骤停,欲实施心肺复苏术,下列关于治疗说法错误的是

- A. 胸外按压时,对年长儿可用双手掌根部重叠压住患儿胸骨中下1/3处
- B. 胸外按压幅度婴儿约为4cm,儿童约为5cm
- C. 单人施救时,心脏按压频率与人工通气频率之比为15:2
- D. 口对口人工呼吸时,吹气频率要求儿童为18~20次/分,婴儿为30~40次/分
- E. 药物治疗首选肾上腺素

71. 王某,女,5岁.现症:睡中遗尿,小便黄而少,伴见性情急躁,手足心热,面赤唇红,口渴多饮,舌红苔黄腻,脉滑数.治疗方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 草薢渗湿汤
- C. 缩泉丸
- D. 交泰丸合导赤散
- E. 菟丝子散

72. 杜某,女,3岁,2周前上呼吸道感染,近3天出现自发性皮肤出血,瘀点、瘀斑呈针尖至米粒大,遍布全身,以四肢多见.血常规:血小板 $18 \times 10^9/L$.血清中检出血小板抗体.现症:皮肤出现瘀斑瘀点,色红鲜明,密集成片,伴有齿衄、鼻血,面红目赤,心烦口渴,便秘尿少,舌红,苔黄,脉数.治疗选用

- A. 银翘散
- B. 犀角地黄汤
- C. 清营汤
- D. 归脾汤
- E. 大补阴丸合茜根散

73. 马某,男,6岁,平素强进饮食,近几日出生腕腹胀满,疼痛拒按,不思乳食,噎腐吞酸,腹痛欲泻,泻后痛减,矢气频作,粪便臭秽,时时啼哭,舌淡红,苔厚腻,脉象沉滑.该患儿治疗宜选用

- A. 大承气汤
- B. 小承气汤
- C. 香砂平胃散
- D. 保和丸
- E. 消乳丸

74. 患儿,女,7岁,因家长听信广告购买含有雌激素的药物给孩子服用,现患儿出现为乳房、大小阴唇及阴毛的发育,且近期蹿长,骨骼生长加速.GnRH兴奋试验阴性。现症:乳核增大、触之疼痛、阴道分泌物增多。伴胸闷不舒、心烦易怒、暖气叹息,痤疮、便秘,舌红,苔黄,脉弦数。该患儿的诊断为

- A. 假性性早熟 肝经郁热证
- B. 真性性早熟 阴虚火旺证
- C. 中枢性性早熟肝经郁热证
- D. 异性性早熟 阴虚火旺证
- E. 月经先期 肝经郁热证

75. 患儿,男,7岁,上课时动作过多、注意力不集中,平素情绪易冲动,做事不顾后果,检查发现智力正常。现症:多动多语,烦躁不宁,冲动任性,难以制约,兴趣多变,注意力不集中,胸闷烦热,懊慌不眠,口苦食少,溲赤便结,舌红,苔黄腻,脉滑数。该患儿治疗选方为

- A. 杞菊地黄丸
- B. 甘麦大枣汤
- C. 清瘟败毒饮
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 黄连温胆汤

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(76~78题共用题干)

患者,男,35岁,喝酒后与他人打架,左侧腹部被击中后腹部疼痛剧烈。数分钟后者出现口渴、心慌、烦躁不安,神志模糊,被送至急诊。查体:BP97/70mmHg,P127次/分,听诊心音低钝较弱;全腹有压痛、反跳痛,腹肌轻度抵抗感,叩诊有振水感。腹穿有血性液体。辅助检查:Hb 97g/L。呼吸困难,呼吸音低微,紫绀,大汗淋漓,四肢厥冷;舌淡苔白,脉微弱。

76. 该患者首先考虑诊断为

- A. 肝破裂
- B. 左肾破裂
- C. 脾破裂
- D. 外伤性血气胸
- E. 胃、十二指肠穿孔

77. 该患者中医辨证最可能为

- A. 血虚气脱证
- B. 气脱证
- C. 气滞血瘀证
- D. 气血两虚证
- E. 肝郁气滞证

78. 中医治疗应选用的方剂为

- A. 复元活血汤
- B. 参附汤
- C. 四物汤
- D. 柴胡疏肝散

E. 当归补血汤合参附汤

(79~81题共用题干) 患者,男,31岁,,骑摩托车时不慎被扶手撞到右侧胸部,自觉疼痛逐渐加重,胸闷,呼吸短促,胸胁刺痛,固定不移,面色发青,舌紫暗,脉沉涩。右侧胸部叩诊呈鼓音,呼吸音降低。胸部X线示肺萎陷,胸腔积气。

79. 该患者诊断为

- A. 闭合性气胸
- B. 开放性气胸
- C. 张力性气胸
- D. 急性肺栓塞
- E. 血胸

80. 如需进行胸腔穿刺排气,其穿刺点位置应该在

- A. 锁骨中线第2肋间
- B. 锁骨中线第3肋间
- C. 腋中线第7肋间
- D. 腋后线第7肋间
- E. 腋后线第8肋间

81. 治疗首选的方剂为

- A. 参附汤
- B. 理气止痛汤
- C. 四君子汤
- D. 复元活血汤
- E. 生脉散

(82~84题共用题干)

患者,男,31岁,近3个月出现无痛性间歇性便血、肛中有物脱出,常于疲劳、饮酒后症状加重。多于便后肛门出血,量较多,痔核较大,便时痔核能脱出肛外,便后能自行还纳。现症: 肛内肿物脱出,触之疼痛明显;舌暗红,苔白,脉涩。

82. 首先应考虑的诊断为

- A. I期内痔
- B. II期内痔
- C. III期内痔
- D. 血栓性外痔
- E. 结缔组织性外痔

83. 以下哪项治疗方法的本质不是使痔核缺血、坏死并脱落

- A. 结扎术
- B. 冷冻疗法
- C. 枯痔法
- D. 胶圈套扎疗法
- E. 塞药法

84. 该患者治疗宜选用

- A. 凉血地黄汤
- B. 脏连丸
- C. 止痛如神汤
- D. 补中益气汤
- E. 青蒿鳖甲汤合三妙丸

(85~87题共用题干)

患者,女,33岁。饱餐后出现上腹部剧痛伴恶心呕吐,呕后腹痛反而加重,服解痉剂无效。检查: 体温39.2℃,心率120次/分,血清淀粉酶355U/L,血钙85.63mmol/L。现症: 腹部紧张,有压痛、反跳痛。口苦咽干,泛恶不止,身目俱黄,便干溲赤;舌红绛,苔黄腻,脉弦滑数。

35. 应首先考虑为

- A. 急性肠梗阻
- B. 溃疡病穿孔
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性心肌梗死
- E. 急性胰腺炎

86. 该患者的中医证型为

- A. 痰浊痹阻证
- B. 热毒证
- C. 脾胃湿热证
- D. 脾胃实热证
- E. 气滞血瘀证

87. 选用的中医治法为

- A. 疏肝理气,活血化瘀

B. 清热泻火,通里逐积,活血化瘀

C. 清热利湿,行气通下

D. 通腑排毒,养阴清热

E. 活血清热,通里攻下

(88~90题共用题干)

患者,女,25岁,皮肤出现小出血点7天。初起为粟粒样大小的红色丘疹,之后逐渐扩大为棕红色斑块,边界清楚,周围有炎性红晕,基底浸润明显,表面覆盖多层干燥的银白色鳞屑,轻轻刮除表面鳞屑,渐露出一层淡红发亮的半透明薄膜。刮除薄膜后,出现小出血点。现症: 红斑增多,刮去鳞屑可见发亮薄膜、点状出血,有同形反应,伴瘙痒;心烦,口渴,大便干,尿黄;舌红,苔黄,脉数。

88. 应首先考虑的诊断

- A. 湿疹
- B. 带状疱疹
- C. 银屑病
- D. 荨麻疹
- E. 尖锐湿疣

89. 该患者中医辨证分型应为

- A. 心肾亏虚
- B. 血热蕴毒
- C. 瘀滞肌肤
- D. 火毒炽盛
- E. 风热血燥

90. 对应的方剂应首选

- A. 清营汤
- B. 地黄饮子
- C. 清营汤合桃红四物汤
- D. 凉血地黄汤
- E. 草薢渗湿汤

(91~93题共用题干)

王某,经产妇,27岁,现妊娠34周。妊娠早期经过顺利。妊娠32周时超声检查发现羊水过多,胎儿大于妊娠周数,未见明显畸形。怀孕后体重减轻4kg,近期有多饮、多食、多尿症状。FPG5.4mmol/L。现症: 妊娠期间,多食易饥,形体逐渐消瘦,口干多饮,大便秘结小便频数;苔黄燥,脉滑实有力。

91. 该患者的诊断是

- A. 胎盘早期剥离
- B. 胎儿消化道发育异常
- C. 妊娠期糖尿病
- D. 母子血型不合

E. 风疹病毒感染

92. 该患者中医证型为

A. 上消

B. 肾阴亏虚证

C. 阴阳两虚证

D. 肺热津伤证

E. 胃热炽盛证

93. 该患者治疗首选

A. 济生肾气丸

B. 消渴方

C. 金匱肾气丸

D. 六味地黄丸合生地黄饮子

E. 玉女煎

(94~96题共用题干)

赵某,女,29岁,16岁月经初潮,既往月经规律,5天/31天,近4个月月经周期紊乱。初期月经先后无定期,量多或少,曾停经2个半月后突然阴道大量出血,治疗后经量减少,但仍淋漓不净,经血色鲜红而质稠,口燥咽干,心烦潮热,大便干结;舌红,少苔,脉细数。基础体温呈单相型。尿HCG(-)。

94. 该患者诊断为

A. 排卵性月经过多

B. 子宫内膜不规则脱落

C. 黄体功能不足

D. 无排卵性异常子宫出血

E. 闭经

95. 中医证型为

A. 肾阳虚证

B. 脾虚证

C. 血热-实热证

D. 血热-虚热证

E. 血瘀证

96. 治疗方剂是

A. 清热固经汤

B. 左归丸合二至丸

C. 逐瘀止血汤

D. 固本止崩汤

E. 保阴煎合生脉散

(97~99题共用题干)

患者,女,32岁。G1P1L1A0。现计划妊娠二胎,未避孕,未再孕1年半。患者平素月经量少,50+天一行。平素精神抑郁,胸胁胀满;舌紫暗,边尖有瘀点,脉沉涩。B超示:双侧卵巢内每个切面可见10余个直径为2~9mm小卵泡。激素测定:LH/FSH值=3,T水平升高。

97. 其诊断是

A. 排卵障碍性异常子宫出血

B. 闭经

C. 多囊卵巢综合征

D. 子宫内膜异位症

E. 子宫腺肌病

98. 其证型是

A. 肾阴虚证

B. 肾阳虚证

C. 肝经湿热证

D. 痰湿阻滞证

E. 气滞血瘀证

99. 治疗应首选

A. 左归丸

B. 右归丸

C. 龙胆泻肝汤

D. 膈下逐瘀汤

E. 苍附导痰丸合佛手散

(100~102题共用题干)

患者,女,31岁,已婚,既往无基础疾病。现孕8个月,头晕头痛,耳鸣作响,颜面潮红,心悸怔忡,夜寐多梦,舌红,少苔,脉弦细滑数,血压150/90mmHg。蛋白尿阴性

100. 该疾病的基本病理变化为

A. 过度水钠潴留

B. 全身小动脉痉挛

C. 血液浓缩

D. 凝血功能障碍,慢性DIC

E. 染色体异常

101. 其中医治法为

A. 健脾温肾,行水消肿

B. 理气行滞,除湿消肿

C. 滋阴清热,平肝息风

D. 滋阴养血,平肝潜阳

E. 清热豁痰,息风开窍

102. 首选方药是

A. 杞菊地黄丸

B. 天仙藤散

- C. 白术散合五苓散
- D. 半夏白术天麻汤加钩藤
- E. 牛黄清心丸

(103~105题共用题干)

李某,初产妇,26岁,已婚。足月顺产1男婴,现产后2天,乳汁甚少,乳房下垂不胀,乳汁不稠;形体肥胖,胸闷痰多,纳少便溏;舌淡胖,苔腻,脉沉细。

103. 考虑诊断为

- A. 产褥感染
- B. 产后缺乳
- C. 急性乳腺炎
- D. 产后乳腺炎
- E. 子痫

104. 该患者的治疗选方为

- A. 通乳丹
- B. 丹溪治湿痰方
- C. 苍附导痰丸合漏芦散
- D. 下乳涌泉散
- E. 生化汤

105. 中医治法为

- A. 补气活血通乳
- B. 健脾化痰通乳
- C. 补气养血,佐以通乳
- D. 益气温阳通乳
- E. 疏肝解郁通乳

(106~108题共用题干)

王某,女,1岁。10天前出现发热等上呼吸道感染症状。5天前出现呕吐,随后出现腹泻。大便呈黄色水样或蛋花汤样。在家休息观察后,症状逐渐减轻,今日未再出现腹泻。

106. 该患儿诊断为

- A. 坏死性肠炎
- B. 金黄色葡萄球菌肠炎
- C. 生理性腹泻
- D. 轮状病毒肠炎
- E. 诺如病毒肠炎

107. 若患儿出现: 泻下过度,质稀如水,心烦不安,目眶及囟门凹陷,皮肤干燥,啼哭无泪,口渴引饮,小便短少,唇红而干,舌红少津,无苔,脉细数,该患儿治疗应选择

- A. 附子理中汤合四神丸
- B. 葛根芩连汤
- C. 人参乌梅汤
- D. 参苓白术散
- E. 藿香正气散

108. 若出现重度脱水,尤其有明显血容量和组织灌注不足的症状,应首选快速应用

- A. 1/3张含钠液
- B. 1/4张含钠液
- C. 2:1含钠液
- D. 1/2张含钠液
- E. 2/3张含钠液

(109~111题共用题干)

韩某,女,3岁。近5个月皮肤黏膜逐渐苍白,口唇和甲床颜色浅淡,不爱活动,食欲减退,遂来诊。血常规示: Hb 104g/L, RBC $3 \times 10^{10} / L$; 总铁结合力65.2umol/L, 血清铁蛋白11.4ug/L。现症: 头晕目涩,面色苍白,肌肤不泽,毛发枯黄,爪甲易脆,四肢震颤抽动,两颧潮红,潮热盗汗,腰膝酸软,发育迟缓,舌红,苔少,脉细数。

109. 该患儿诊断为

- A. 营养性缺铁性贫血
- B. 特发性血小板减少性紫癜
- C. 蛋白质-能量营养不良
- D. 厌食症
- E. 佝偻病

110. 西医治疗首选

- A. 注射铁剂
- B. 补充促红细胞生成素
- C. 口服糖皮质激素
- D. 口服铁剂
- E. 输血

11. 中医治疗首选

- A. 右归丸
- B. 左归丸
- C. 归脾汤
- D. 异功散
- E. 补中益气汤

(112~114题共用题干)

郑某,女,4个月,该患儿出生后一直因母乳不足,混合喂养,尚未添加辅食.经常出现夜惊不宁,惊惕不安,近4天加重,多汗,烦闹.血生化改变轻微,血清25-(OH)D₃下降,血钙略下降,血磷降低,骨骼X线摄片无明显异常.现症:多汗乏力,烦躁,睡眠不安,夜惊,发稀枕秃,囟门迟闭,肌肉松软,纳呆,大便不实,舌质淡红,苔薄白,指纹偏淡.

112. 该患儿诊断为

- A. 疳证
- B. 营养不良
- C. 维生素D缺乏性手足搐搦症 初期
- D. 维生素D缺乏性佝偻病 激期
- E. 维生素D缺乏性佝偻病 初期

113. 该患儿证型为

- A. 肝肾阴虚证
- B. 脾阳虚证
- C. 肺脾气虚证
- D. 脾虚肝旺证
- E. 肾虚骨弱证

114. 治疗选用

- A. 益脾镇惊散
- B. 四君子汤合黄芪桂枝五物汤
- C. 补肾地黄丸
- D. 六味地黄丸
- E. 六君子汤

(115~117题共用题干)

钱某,女,6岁.发热,咽痛1天后出疹.皮疹多为散在淡红色斑丘疹.先见于面部,一天内波及全身.伴耳后、枕后及颈部淋巴结肿大.现症:壮热口渴,烦躁不宁,疹色鲜红,疹点较密,小便短赤,大便秘结,舌质红,苔黄糙,脉洪数.

115. 该患儿诊断为

- A. 麻疹
- B. 风疹
- C. 水痘
- D. 幼儿急疹
- E. 猩红热

116. 中医认为,本病病位在

- A. 肺卫
- B. 肺胃
- C. 肺脾
- D. 脾胃
- E. 肺脾胃

117. 患儿治疗选方为

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散
- C. 化斑解毒汤
- D. 解肌透痧汤
- E. 凉营清气汤

(118~120题共用题干)

患儿,男,7岁,1年前外出接触花粉后,出现的喘息、气促、胸闷,回家后自行缓解.今日接触冷空气后,再次出现上述症状且加重,遂就诊.检查发现两肺听诊以哮鸣音为主,呼气延长.支气管舒张试验阳性.现症:咳喘哮鸣,声高息涌,痰稠色黄,发热面红身胸闷膈满,渴喜冷饮,小便黄赤,大便干燥,舌红,舌苔黄腻,脉象滑数.

118. 该患儿的西医诊断为

- A. 支气管哮喘
- B. 反复呼吸道感染
- C. 支气管肺炎
- D. 急性上呼吸道感染
- E. 合胞病毒肺炎

119. 该患儿首选治疗为

- A. 口服泼尼松
- B. 静脉注射糖皮质激素
- C. 吸入 受体激动剂
- D. 气管插管
- E. 镇静剂

120. 中医治疗首选

- A. 小青龙汤合三子养亲汤
- B. 越婢加半夏汤
- C. 玉屏风散
- D. 六君子汤
- E. 麻杏石甘汤

B型题

答题要求

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案.请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择.

(121~122题共用备选答案)

- A. 赤游丹
- B. 抱头火丹
- C. 流火
- D. 内发丹毒
- E. 腿游风

121. 新生儿发于臀部的丹毒称为

122. 生于小腿足部的丹毒称为

(123~124题共用备选答案)

- A. 风毒
- B. 蛇毒内陷
- C. 风火毒
- D. 火毒
- E. 混合毒

123. 毒蛇咬伤后,局部伤口无红肿,疼痛轻微;全身症状严重,神志模糊,甚至昏迷的属于

124. 毒蛇咬伤后,局部肿痛严重,五官、内脏出血的属于

(125~126题共用备选答案)

- A. 驱蛔承气汤
- B. 桃核承气汤
- C. 甘遂通结汤
- D. 复方大承气汤
- E. 温脾汤

125. 以上属于治疗肠梗阻气滞血瘀证首选的是

126. 以上属于治疗肠梗阻肠腑热结证首选的是

(127~128题共用备选答案)

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 济生肾气丸
- C. 滋阴除湿汤
- D. 八正散
- E. 暖肝煎

127. 治疗睾丸炎湿热下注证应首选的是

128. 治疗睾丸炎寒湿凝滞证应首选的是

(129~130题共用备选答案)

- A. 除湿胃苓汤
- B. 当归饮子
- C. 凉血地黄汤
- D. 桃红四物汤
- E. 消风散合四物汤

129. 以上属于银屑病血虚风燥证选用的方剂是

130. 以上属于湿疹脾虚湿蕴证选用的方剂为

(131~132题共用备选答案)

- A. 不超过3小时
- B. 不超过4小时
- C. 不超过10小时
- D. 不超过12小时
- E. 不超过14小时

131. 经产妇第一产程

132. 初产妇第二产程

(133~134题共用备选答案)

- A. 滋阴养血,平肝潜阳
- B. 滋阴清热,平肝息风
- C. 健脾利湿,平肝潜阳
- D. 理气行滞,除湿消肿
- E. 清热豁痰,息风开窍

133. 子痫之脾虚肝旺证选用的治法为

134. 子痫之痰火上扰证选用的治法为

(135~136题共用备选答案)

- A. 寒证
- B. 肾虚
- C. 热证
- D. 脾虚
- E. 湿热

135. 带下色白质稠,如唾如涕,绵绵不断,多属

136. 带下量多质稠,色黄或黄白相兼有臭味,多属

(137~138题共用备选答案)

- A. 潜伏期延长
- B. 活跃期延长
- C. 第二产程停滞
- D. 活跃期停滞
- E. 正常产程

137. 经产妇临产18小时,宫口开大2cm,属于

138. 破膜且宫口开大8cm,宫缩正常,宫口扩张4小时以上无进展属于

(139~140题共用备选答案)

- A. 二仙汤合二至丸
- B. 六味地黄丸
- C. 知柏地黄汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 五味消毒饮

139. 外阴炎湿热下注证的选方是

140. 外阴炎肝肾阴虚证的选方是

(141~142题共用备选答案)

- A. 肾常虚
- B. 脾常不足
- C. 肺常不足
- D. 阴常不足
- E. 心常有余

141. 感冒夹痰的原因是

142. 感冒夹滞的原因是

(143~144题共用备选答案)

- A. 支气管肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 合胞病毒肺炎
- D. 腺病毒肺炎
- E. 衣原体肺炎

143. 以发热、咳嗽、呼吸困难为主要症状的肺炎类型为

144. 以刺激性剧烈咳嗽为突出表现的肺炎类型为
(145~146题共用备选答案)

- A. 高血压,低蛋白血症,水肿
- B. 高血压,大量蛋白尿
- C. 血尿,低蛋白血症,高血压
- D. 血尿,水肿和高血压
- E. 大量蛋白尿,低蛋白血症,水肿,高脂血症

145. 以上哪项肾病综合征的主要临床症状

146. 以上哪项急性肾小球肾炎的主要临床症状

(147~148题共用备选答案)

- A. 健脾养心,益气安神
- B. 清热化痰,息风止动
- C. 益气健脾,平肝息风
- D. 滋阴潜阳,柔肝息风
- E. 平肝潜阳,息风止动

147. 抽动障碍肝亢风动证的治法是

148. 抽动障碍痰火扰神证的治法是

(149~150题共用备选答案)

- A. 四妙散
- B. 葛根黄芩黄连汤
- C. 银翘散
- D. 犀角地黄汤
- E. 知柏地黄丸

149. 治疗过敏性紫癜阴虚火旺证的方剂是

150. 治疗过敏性紫癜湿热痹阻证的方剂是

中西医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
- 第二单元 西诊40、药理30、针灸30、传染20、伦理10、中医经典20
- 第三单元 中西医内科150
- 第四单元 中西医外科50、中西医妇科50、中西医儿科50

中西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

- 第一单元 中基20、中诊20、中药20、方剂20、
西诊20、针灸15、药理15、传染10、伦理5、法规5
- 第二单元 中西医内科75、中西医外科25、中西医妇科25、中西医儿科25