

临 床 助 理 医 师 资 格 考 试

押 题 密 卷

全 真 模 考

第一单元

一、A1型选择题

1. 下列关于 DNA 碱基组成的叙述, 正确的是

- A. DNA 分子中 A 和 T 含量不同
- B. 同一个体在成年期与少儿期碱基组成不同
- C. 同一体在不同营养状态下碱基组成不同
- D. 同一体不同组织的碱基组成不同
- E. 不同生物来源的 DNA 碱基组成组分不同

2. 蛋白质的功能可完全由糖或脂类物质代替的是

- A. 构成组织
- B. 氧化功能
- C. 调节作用
- D. 免疫作用
- E. 催化作用

3. 能合成尿素的主要脏器是

- A. 脑
- B. 肌组织
- C. 肾
- D. 肝
- E. 心

4. 关于氧化磷酸化下述哪项不是其主要内容

- A. 生物氧化
- B. 氧化呼吸链
- C. 氧化磷酸化
- D. P/O 比值
- E. 脂解激素

5. 下列有关乳酸循环的叙述, 错误的是

- A. 可防止乳酸在体内堆积
- B. 最终从尿中排出乳酸
- C. 使肌肉中的乳酸进入肝脏异生成葡萄糖
- D. 可防止酸中毒
- E. 使能源物质避免损失

6. 关于 L-抗坏血酸的特性错误的是

- A. 参与人体多种羟化反应
- B. 促进胶原蛋白合成
- C. 参与氧化还原反应
- D. 保护维生素免遭氧化
- E. 促进叶酸转变成二氢叶酸

7. 关于突触传递的特点叙述错误的是

- A. 双向传递
- B. 时间延搁
- C. 易受药物的影响

- D. 易受环境因素的影响
 - E. 易疲劳
8. 纯净胃液正常 pH 为
- A. 0.7~1.5
 - B. 0.8~1.5
 - C. 0.9~1.5
 - D. 0.9~1.6
 - E. 0.9~1.7
9. 精子的获能部位在
- A. 曲细精管
 - B. 输精管
 - C. 附睾
 - D. 女性生殖道
 - E. 膀胱
10. 关于汗液的叙述, 下列哪项是错误的
- A. 汗液中的 Na^+ 浓度受醛固酮调节
 - B. 汗液的渗透压高于血浆
 - C. 汗液的主要成分为水分
 - D. 汗液是由汗腺细胞主动分泌的
 - E. 汗液中不含蛋白质
11. 以下病变中发生脂肪变的是
- A. 气球样变
 - B. 虎斑心
 - C. Mallory 小体
 - D. Russell 小体
 - E. 阿尔茨海默病的脑组织
12. 病毒性肝炎时, 肝细胞的灶性坏死属于哪种病理变化
- A. 固缩性坏死
 - B. 液化性坏死
 - C. 干酪性坏死
 - D. 凝固性坏死
 - E. 水样变
13. 活体内出现的不溶于血液的异常物体, 沿血流运行阻塞相应的血管腔的过程叫
- A. 梗死
 - B. 栓塞
 - C. 梗塞
 - D. 栓子
 - E. 以上都不是
14. 肉芽组织由哪些成分组成
- A. 毛细血管和弹性纤维
 - B. 毛细血管和胶原纤维
 - C. 中动脉和成纤维细胞
 - D. 成纤维细胞和小细胞
 - E. 毛细血管和成纤维细胞

15. 长期大量使用糖皮质激素，可引起
- A. 肾上腺髓质萎缩
 - B. 肾上腺皮质逐渐萎缩
 - C. 肾上腺皮质高度增生
 - D. 促肾上腺皮质激素分泌增加
 - E. 促肾上腺皮质激素释放激素增加
16. 下列不属于血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）特点的是
- A. 引起反射性心率加快
 - B. 可用于各型高血压
 - C. 减少循环组织中的血管紧张素 II
 - D. 可防治高血压患者心肌细胞肥大
 - E. 对肾脏有保护作用
17. 下列关于多巴胺药理作用的叙述中，哪一项是不正确的
- A. 减少肾血流量，使尿量减少
 - B. 对血管平滑肌 β_2 受体作用很弱
 - C. 直接激动心脏 β_1 受体
 - D. 间接促进去甲肾上腺素释放
 - E. 激动血管平滑肌多巴胺受体
18. 治疗闭角型青光眼应选择的药物为
- A. 毛果芸香碱
 - B. 新斯的明
 - C. 肾上腺素
 - D. 阿托品
 - E. 去甲肾上腺素
19. 用药的间隔时间主要取决于
- A. 药物与血红蛋白的结合率
 - B. 药物的吸收速度
 - C. 药物的排泄速度
 - D. 药物的消除速度
 - E. 药物的分布速度
20. 许多心理治疗方法中强调成功治疗的最关键因素是
- A. 良好医患关系
 - B. 保密性原则
 - C. 针对性原则
 - D. 灵活性原则
 - E. 完善治疗计划
21. 知觉过程中，依据过去的知识经验，力求对知觉对象做出某种解释，使其具有一定的意义，这是知觉的
- A. 选择性
 - B. 整体性
 - C. 理解性
 - D. 恒常性
 - E. 定势
22. 临终关怀的根本目的是为了

- A. 缩短患者的生存时间
 - B. 防止患者自杀
 - C. 减轻家庭的经济负担
 - D. 提高临终患者的生存质量
 - E. 节约卫生资源
23. 医务人员共同的首要义务和天职是
- A. 维护医务人员和医院的自身利益
 - B. 维护医务人员之间、医院间的和谐
 - C. 维护医务人员和医院的声誉
 - D. 维护医务人员和医院的经济效益
 - E. 维护患者的利益和社会公益
24. 在流行病学研究中，由因到果的研究为
- A. 生态学研究
 - B. 筛检
 - C. 队列研究
 - D. 现状研究
 - E. 病例对照研究
25. 下述医院常见的有害因素的内容有误的是
- A. 医院环境因素
 - B. 医院专业因素
 - C. 医院管理因素
 - D. 医院社会因素
 - E. 医院人员因素
26. 有机磷农药中毒的紧急处理原则之一是
- A. 吸痰
 - B. 对症处理
 - C. 使用解磷定
 - D. 输液
 - E. 血液透析
27. 对急性吸入中毒患者，首要措施是
- A. 立即清除口腔分泌物
 - B. 立即气管切开
 - C. 立即给予解毒剂
 - D. 立即脱离现场及急救
 - E. 立即给氧
28. 环境污染对健康影响的特点不包括下列哪项
- A. 受影响人群一般很广泛
 - B. 常常引起慢性中毒
 - C. 消除污染后健康损害即可立即恢复
 - D. 不同个体对污染物的反应不同
 - E. 污染物通过多途径进入人体
29. 医疗机构麻醉药品处方保存的最低年限是
- A. 1年
 - B. 2年

- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

30. 关于医师资格考试条件不正确的是

- A. 有高等学校医学专业本科以上学历，在执业医师指导下，在医疗机构中试用期满 1 年的可参加执业医师考试
- B. 取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历，在医疗机构中工作满 2 年可参加执业医师考试
- C. 取得执业助理医师执业证书后，具有中等专业学校医学专业学历，在医疗机构中工作满 5 年的可参加执业医师考试
- D. 具有中等专业学校医学专业学历，在执业医师指导下，在医疗机构中试用期满 1 年的，可以参加执业助理医师资格考试
- E. 以师承方式学习传统医学满 2 年，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业考核合格并推荐，可以参加执业医师资格考试

31. 医疗机构在药品购销中暗中收受回扣或者其他利益，依法对其给予罚款处罚的机关是

- A. 劳动保障行政部门
- B. 中医药管理部门
- C. 药品监督管理部门
- D. 工商行政管理部门
- E. 卫生行政部门

32. COPD 气道炎症最主要的效应细胞是

- A. 肥大细胞
- B. 嗜酸性粒细胞
- C. 中性粒细胞
- D. 巨噬细胞
- E. 淋巴细胞

33. 下列疾病所致的肺动脉高压中最主要由低氧血症所致的是

- A. 肺血栓栓塞
- B. 结缔组织病
- C. COPD
- D. 特发性肺动脉高压
- E. 心源性肺水肿

34. 对于胸腔积液，错误的是

- A. 积液量在 300~500ml 时可无临床症状
- B. 积液量小于 500ml 可有 X 线表现
- C. CT 检查对提示积液性质无效
- D. B 超是敏感性最高的检查胸腔积液的无创性诊断方法
- E. X 胸片可不表现为弧形向上的积液影

35. 下列治疗肺结核的药物中能够抑制细菌蛋白质合成的是

- A. INH
- B. RFP
- C. PZA
- D. EMB
- E. SM

36. 支气管扩张为明确诊断, 首选下列哪项检查
- A. 肺功能
 - B. 气管镜
 - C. 肺组织病理
 - D. HRCT
 - E. 支气管造影
37. 肺癌的放射治疗正确的是
- A. 未分化癌不需放射
 - B. 放射治疗不能缓解阻塞症状、骨转移的剧痛及脑转移的颅内高压症状
 - C. 对有全身衰竭、严重脏器功能损害者均可适用放射治疗
 - D. 近年来多采用放疗手术相结合的治疗方法
 - E. 放射治疗不能改变肺癌的自然规律, 对任何病人都不能根治
38. 慢性呼吸衰竭缺氧明显伴二氧化碳潴留时, 采用氧疗的给氧浓度应该
- A. 小于 25%
 - B. 小于 35%
 - C. 小于 45%
 - D. 小于 55%
 - E. 小于 65%
39. 支气管哮喘发作时的呼吸功能检查, 下列哪项结果是错误的
- A. FEV₁ 下降
 - B. FEV₁/FVC% 下降
 - C. MMFR 上升
 - D. MEF50% 减少
 - E. PEF 减少
40. 慢性肺心病最常见的病因是
- A. 支气管扩张
 - B. 慢性阻塞性肺疾病
 - C. 严重胸廓畸形
 - D. 支气管哮喘
 - E. 肺栓塞
41. 病毒性心肌炎与急性心梗常常难以鉴别, 下述哪项可作为两者在病史中的鉴别项
- A. 病理性 Q 波
 - B. 血清肌钙蛋白增高
 - C. 有无上感病史
 - D. CM-MB 增高
 - E. 心律失常
42. 陈旧性心肌梗死患者心电图示频发室性期前收缩。首选药物是
- A. 美西律 (慢心律)
 - B. 胺碘酮
 - C. 奎尼丁
 - D. β 受体拮抗剂
 - E. 钙拮抗剂
43. 急性心包炎心包积液时最突出的症状是
- A. 心前区疼痛

- B. 休克晕厥
 - C. 呼吸困难
 - D. 声音嘶哑
 - E. 胸闷心悸
44. 冠心病时诊断冠状动脉病变的金标准是
- A. 心电图
 - B. Holter
 - C. 放射性核素
 - D. CT
 - E. 冠状动脉造影
45. 引起左室后负荷增高的主要因素是
- A. 肺动脉高压
 - B. 体循环高压
 - C. 回心血量增加
 - D. 血细胞比容增大
 - E. 主动脉瓣关闭不全
46. 下述急性左心衰的患者出现急性肺水肿的机制错误的是
- A. 肺静脉压增高
 - B. 心排出量减少
 - C. 肺毛细血管压降低
 - D. 心脏收缩力突然减小
 - E. 血管内液体渗出增多
47. 下列关于高血压的治疗不正确的是
- A. 建议患者减轻体重、减少钠盐摄入
 - B. 戒烟限酒
 - C. 早期及时用药，严格控制血压不超过 140/90mmHg
 - D. 多重心血管危险因素协同控制
 - E. 降压药物的选择应个体化
48. 对控制慢性肾脏病变肾功能进行性减退无明确作用的措施是
- A. 纠正血脂异常
 - B. 消除水肿
 - C. 限制蛋白质的摄入
 - D. 减少尿蛋白
 - E. 控制血压
49. 慢性肾功能不全的分期
- A. 肾功能不全失代偿期，尿毒症期
 - B. 尿毒症早期，尿毒症晚期
 - C. 肾功能不全代偿期、氮质血症期、肾功能衰竭期、尿毒症期
 - D. 肾功能不全代偿期、氮质血症期、失代偿期、尿毒症期
 - E. 肾功能不全代偿期，失代偿期，肾功能衰竭期、尿毒症期
50. 慢性肾脏病指肾损害或 $GFR < 60\text{ml}/(\text{min} \cdot 1.73\text{m}^2)$ 持续几个月以上
- A. 1 个月
 - B. 2 个月
 - C. 3 个月

- D. 4 个月
- E. 5 个月
- 51. 膀胱肿瘤复发率较高，可达
 - A. 60%
 - B. 70%
 - C. 80%
 - D. 90%
 - E. 50%
- 52. 肾结核的血尿表现为
 - A. 全程血尿
 - B. 间歇性无痛血尿
 - C. 初始血尿
 - D. 终末血尿
 - E. 镜下血尿
- 53. 急性肾炎与急进性肾炎的最主要鉴别点为
 - A. 有无前驱链球菌感染的证据
 - B. 肾功能下降的速度及严重程度
 - C. 蛋白尿及血尿的严重程度
 - D. 有无高血压及心脏病并发症
 - E. 水肿的严重程度
- 54. 蛋白尿为成人尿蛋白超过
 - A. 150mg/d
 - B. 350mg/d
 - C. 180mg/d
 - D. 300mg/d
 - E. 250mg/d
- 55. 有关泌尿系梗阻，下列哪一项是错误的
 - A. 膀胱以上梗阻肾积水进展快
 - B. 膀胱以上梗阻一般仅累及一侧肾脏
 - C. 膀胱以下梗阻对肾影响更快
 - D. 膀胱以下梗阻可累及双侧肾
 - E. 泌尿系任何部位都可发生梗阻，梗阻持续加重，均可导致肾功能损害
- 56. 急进性肾炎持续少尿伴高钾血症时的首选治疗措施是
 - A. 肾移植
 - B. 大剂量维生素静脉滴注
 - C. 绝对卧床
 - D. 血液透析
 - E. 预防感染
- 57. 先兆流产与难免流产的主要鉴别点是
 - A. 宫口开大与否
 - B. 早孕反应是否存在
 - C. 出血时间长短
 - D. 妊娠试验是否阳性
 - E. 下腹痛的程度

58. 早产临产后应慎用的药物是
- A. 利托君
 - B. 地塞米松
 - C. 沙丁胺醇
 - D. 硫酸镁
 - E. 哌替啶
59. 重度子痫前期孕妇血液生化改变不包括
- A. 尿素氮增高
 - B. 血浆蛋白降低
 - C. 尿酸增高
 - D. 二氧化碳结合力升高
 - E. 血小板计数降低
60. 下列可反映胎儿肺成熟度的是
- A. 卵磷脂 / 鞘磷脂比值
 - B. 淀粉酶值
 - C. 胆红素类物质
 - D. 含脂肪细胞出现率
 - E. 肌酐值
61. 重型胎盘早剥与先兆子宫破裂共有的临床表现是
- A. 跨耻征阳性
 - B. 剧烈腹痛
 - C. 休克
 - D. 子宫柔软
 - E. 出现病理缩复环
62. 卵巢排出卵子后未受精，黄体开始萎缩是在排卵后的
- A. 5~6 天
 - B. 9~10 天
 - C. 11~12 天
 - D. 13~14 天
 - E. 15~19 天
63. 关于女性外生殖器解剖，正确的
- A. 双侧小阴唇前端为腹股沟韧带终点
 - B. 女性阴毛分布呈菱形
 - C. 前庭大腺开口于阴道内
 - D. 女性外生殖器即外阴
 - E. 阴道前庭为双侧大阴唇之间的菱形区
64. 目前，人们没有普遍接受的人类辅助生殖技术是
- A. 人工授精
 - B. 体外授精-胚胎移植
 - C. 单精子卵胞浆内注射
 - D. 供精人工授精
 - E. 无性生殖
65. 关于胎膜早破，下列哪项是不正确的
- A. 破膜后予灌肠促进产程

- B. 头高浮及臀先露需防脐带脱垂
- C. 破膜 12 小时开始给抗生素
- D. 胎膜破裂，发生于产程开始之前
- E. 胎膜早破可能是由于头盆不称引起

66. 微小浸润癌是指肿瘤浸润间质深度不超过

- A. 1mm
- B. 2mm
- C. 3mm
- D. 4mm
- E. 5mm

67. 输卵管结扎术最适宜的时间是

- A. 月经来潮前 3~4 天
- B. 人工流产后 3 天
- C. 足月产后 14 天
- D. 月经后 14 天
- E. 非孕妇女月经干净后 3~4 天

二、A2型选择题

68. 男，58 岁。一位内科医生观察到该患者胸部 X 线片上在肺门区有一直径约 4cm，密度较高，边缘不整的团块状阴影，于是判断其患有中心型肺癌。这是医生思维特征的

- A. 客观性
- B. 间接性
- C. 理解性
- D. 综合性
- E. 抽象性

69. 一位患病住院治疗的士兵，在病情没有完全康复的时候就偷偷跑出医院回到部队，结果因劳累使病情加重，属于

- A. 角色行为冲突
- B. 角色行为减退
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为缺如
- E. 角色行为抑制

70. 某心理咨询师，在某市场遇见一位他的患者也正与其熟人在一起购物，这位治疗师故意未理睬他的患者，他遵循的是心理治疗的哪项原则

- A. 真诚原则
- B. 保密原则
- C. 回避原则
- D. 中立原则
- E. 灵活原则

71. 3 岁小儿患急性菌痢住院，经治疗已好转即将出院。其父母觉得小儿身体虚弱，要求输血。医生为增收，并考虑没有什么危险性就同意了。可护士为了快点交班，提议给予静脉推注输血。当时病儿哭闹，医护齐动手给他输血过程中，病儿突发心跳骤停死亡。此案例中医护人员的伦理过错是

- A. 无知无原则，违背了有利病人的原则
- B. 无知无原则，违背了人道主义原则

- C. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了有利病人的原则
- D. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了不伤害病人的原则
- E. 曲解家属自主权，违反操作规程，违背了人道主义原则
72. 一对农村夫妇抱着白喉患儿来院求治，患儿因呼吸困难，医生决定马上做气管切开，但患儿父母不与表态。这时患儿呼吸困难，面部发绀，生命垂危。下列做法更符合伦理的是
- A. 家属态度不明时，顺其自然
- B. 在家属同意治疗但拒绝手术时，告知后果家属自负
- C. 在家属同意但不签字的情况下，立即手术
- D. 在家属同意但不签字的情况下，等待签字后手术
- E. 在家属不同意且又不签字的情况下，不实施手术
73. 女性患者，28岁，因不规则发热2月余，巩膜发黄，40多天入院。患者提及7~13岁时有反复发作的上腹部绞痛史，并再三询问是否癌症。入院初步诊断：胆道感染并发细菌性脓肿。住院后作十二指肠引流，并进行多项检查，超声波示：肝区有较密的密集微波。SGPT210。AFP(+) 剖腹检查：为晚期肝癌，已有腹腔转移。手术前患者要求如实了解病情，以作好准备。诊断结果告知家属和单位领导后，他们都要求积极抢救，对患者进行保密。面对此案例，医务人员从伦理学角度分析，应如何选择行为
- A. 满足家属和单位领导要求，对患者绝对保密，积极抢救治疗
- B. 考虑医学道德的要求，不惜一切代价地积极治疗
- C. 尊重患者权利，如实告诉病情
- D. 为避免使患者精神崩溃，做好保密工作
- E. 尊重患者权利，在治疗同时可适当告诉病情
74. 某男性，某矿场采矿工，年龄25岁，工龄约2年。主诉咳嗽、气短、胸痛就诊。检查发现，X线胸片呈肺纹理增加，伴有块状阴影和典型结节。患者自述，他工作场所条件很差无防尘设施，此工人最可能患何种类型矽肺
- A. 晚发性矽肺
- B. 弥漫性矽肺
- C. 间质性矽肺
- D. 重型矽肺
- E. 速发性矽肺
75. 男性，50岁，某公司销售部门总裁，平时生活规律，但脾气暴躁，易怒；工作中竞争意识强，特别看重工作效率，说话、办事雷厉风行；针对他的性格特点，最应注意预防下列哪些疾病
- A. 冠心病
- B. 甲亢
- C. 糖尿病
- D. 风心病
- E. 以上都不是
76. 某研究机构，研制出一种可预防某种传染病的新疫苗，为观察该疫苗的流行病学预防效果，应观察下列何种人群
- A. 出现感染表现的人群
- B. 隐性感染的人群
- C. 免疫水平高的人群
- D. 预期发病率高的人群
- E. 病原携带者

77. 为探讨儿童白血病的病因，选择 200 例确诊白血病的儿童。同时选择 200 例同期同医院无白血病的儿童，然后调查其母亲孕期 X 线照射情况。此研究方法为
- A. 现况研究
 - B. 病例对照研究
 - C. 队列研究
 - D. 回顾性前瞻研究
 - E. 临床实验研究
78. 某地区进行学龄儿童流脑疫苗接种率调查。首先将该地区各县分为好、中、差三类，然后在每类中随机抽 1/100 的学龄儿童进行调查，这种抽样方法属于
- A. 多级抽样
 - B. 系统抽样
 - C. 分层抽样
 - D. 整群抽样
 - E. 单纯随机抽样
79. 某医师因重大医疗事故收到吊销医师执业证书的行政处罚。半年后重新申请执业注册，卫生行政部门未予批准。理由是该医师自处罚决定之日起至申请注册之日止不满法定期限。该法定期限是
- A. 3 年
 - B. 5 年
 - C. 2 年
 - D. 4 年
 - E. 1 年
80. A 县张某系高致病性禽流感患者，在 B 市传染病医院隔离治疗期间，擅自逃出医院回到 A 县，脱离隔离治疗。为防止疾病传播，可以协助传染病医院追回张某采取强制隔离治疗措施的是
- A. 司法部门
 - B. 公安部门
 - C. 疾病控制中心
 - D. 民政部门
 - E. 卫生行政部门
81. 李某为甲医院颌面外科主任医师，应邀到乙医院为一颌面创伤的患者会诊手术。在术中由于疏忽大意违反诊疗规范，致使患者面部畸形愈合。对于该医疗行为应当承担民事责任的主体是
- A. 甲医院和李某
 - B. 乙医院和李某
 - C. 乙医院
 - D. 李某
 - E. 甲医院
82. 黄某是医科大学临床医学专业本科生，2000 年 7 月大学毕业，2000 年 9 月即擅自开设诊所独立行医。依据《中华人民共和国执业医师法》，其行为属于
- A. 未办理手续非法行医
 - B. 未取得医师资格非法行医
 - C. 执业医师行医
 - D. 执业助理医师行医

E. 个体行医

83. 男, 21 岁。发作性喘息 4 年, 再发一天急诊入院, 查体: 端坐呼吸, 口唇发绀, 双肺广泛哮鸣音, 心率 120 次 / 分。该患者最可能的诊断是

- A. 自发性气胸
- B. 肺血栓栓塞
- C. 急性左心衰竭
- D. 慢性支气管炎急性发作
- E. 支气管哮喘

84. 男, 43 岁。反复咳嗽。咳脓痰 10 年, 加重 5 天入院。吸烟史 15 年, 已戒 10 年。查体: 右下肺可闻及较多湿啰音及少量哮鸣音。可见杵状指。胸部 X 线片示右下肺纹理增粗紊乱。该患者应首先考虑的诊断是

- A. 支气管结核
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 支气管肺癌
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张

85. 男。60 岁, 因咳嗽, 活动后气短, 发现胸腔积液, 胸水化验为渗出液, 经抗结核治疗两个月, 胸水不减少反而增多, 为明确诊断, 进一步应采取的措施是

- A. 加强抗结核治疗
- B. 胸水的酶学检查
- C. 胸水的结核杆菌培养
- D. 胸部 B 超检查
- E. 胸水的病理细胞检查和胸膜活检

86. 女, 65 岁, 咳嗽、痰中带血, 胸痛两个月, 无明显发热。胸片发现。右下肺周边有一直径 6cm 的结节状阴影。首先应考虑为

- A. 肺脓肿
- B. 结核瘤
- C. 周围型肺癌
- D. 团块状矽结节
- E. 转移性肺癌

87. 男, 62 岁, 糖尿病患者, 突发高热、寒战、右胸痛, 次日咳痰, 为黄脓性带血丝, 量多, X 线显示右下肺叶实变, 其中有多个液气囊腔, 最可能的诊断是

- A. 干酪样肺炎
- B. 绿脓杆菌性肺炎
- C. 克雷伯杆菌性肺炎
- D. 葡萄球菌性肺炎
- E. 军团菌性肺炎

88. 女, 60 岁, 慢性哮喘 18 年, 加重 1 周, 血气分析结果如下: pH7.35, PaO₂55mmHg, PaCO₂ 74mmHg, AB 42mmol/L, 血钾 2.2 mmol/L, 血氯 70mmol/L, 考虑诊断为

- A. 代谢性酸中毒失代偿
- B. 呼吸性酸中毒失代偿
- C. 呼吸性酸中毒伴代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒伴代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒代偿期

89. 女, 38 岁, 呼吸困难伴声嘶 2 月余, 活动后明显, 无慢性咳嗽、咳痰和关节疼痛病史。查体: 口唇发绀, 颈静脉充盈, 肝颈回流征阳性, P₂ 亢进, 三尖瓣区可闻及 3/6 级收缩期杂音, 双下肢水肿, 其最可能的诊断是
- A. 特发性肺动脉高压
 - B. 风湿性心脏瓣膜病
 - C. 房间隔缺损
 - D. 室间隔缺损
 - E. 扩张型心肌病
90. 男, 72 岁。排便时突然跌倒, 意识丧失, 呼吸断续。有陈旧心肌梗死和糖尿病病史, 无高血压病史, 诊断为心脏骤停。该患者既往超声心动图检查未发现异常, 其心脏骤停最可能的原因是
- A. 冠心病
 - B. 预激综合征
 - C. 主动脉瓣狭窄
 - D. 梗阻性肥厚型心肌病
 - E. 主动脉夹层
91. 男, 55 岁, 下肢静脉曲张, 请问手术前应做的深静脉通畅试验, 又称
- A. Trendelenburg 试验
 - B. Perthes 试验
 - C. Pratt 试验
 - D. Buerger 试验
 - E. Finkelstein 试验
92. 患者, 女, 60 岁, 近 1 年来感食欲不振, 记忆力减退, 双下肢水肿。因肾结石行肾实质切开取石术, 手术进展顺利, 术后出现嗜睡, 体温 35℃, 血压 70/50mmHg, 呼吸 15 次/分, 心率 60 次/分, 反射减弱。抢救该患者, 下列措施正确的是
- A. 50%GS 静脉滴注
 - B. 保温
 - C. 纠正休克
 - D. 静脉注射 T3 或 L-T3
 - E. 氢化可的松静脉滴注
93. 老王, 女, 55 岁, 被诊断为感染性心内膜炎, 请问感染性心内膜炎最常见的症状是
- A. 发热
 - B. 胸痛
 - C. 心脏杂音
 - D. 瘀点、Roth 斑
 - E. 脾大
94. 女性, 76 岁。1 年来日常活动时即感胸闷, 4 天前突发夜间阵发性呼吸困难, 伴咳粉红色泡沫痰。查体: 血压 100 / 70mmHg, 心尖搏动呈抬举样, 胸骨右缘第 2 肋间可闻及 4 / 6 级收缩期喷射样杂音, 向颈部传导, 双肺可闻及散在细湿啰音, 对明确诊断最有帮助的检查是
- A. ECG
 - B. 超声心动图
 - C. 胸部 X 线检查
 - D. 血浆钠尿肽水平
 - E. 血浆肌钙蛋白水平

95. 患者，女，23岁。查体BP：110/80mmHg，P：72次/分，心尖部听到一个舒张中期出现的先递减后递增型的隆隆样杂音，伴有第一心音增强；心率89次/分，律不齐。第一心音强弱不一致。提示该患者的疾病是
- A. 主动脉瓣狭窄并心房颤动
 - B. 主动脉瓣关闭不全并二尖瓣狭窄
 - C. 二尖瓣狭窄并关闭不全
 - D. 二尖瓣狭窄并心房颤动
 - E. 二尖瓣关闭不全并心房颤动
96. 女，60岁，心力衰竭6年，近几个月心力衰竭症状加重，请问最常见诱因是
- A. 过度劳累
 - B. 摄入液体过多
 - C. 心肌缺血
 - D. 室性期前收缩
 - E. 呼吸道感染
97. 男性，32岁。近5个月来出现尿频、尿不尽、尿道“滴白”及肛周隐痛不适，多次检查尿常规WBC1~3/HP。前列腺液常规：前列腺液常规：WBC>10个/HP，卵磷脂小体(+++)/HP，前列腺液培养阴性，血常规无异常。诊断首先考虑为
- A. 慢性膀胱炎
 - B. 泌尿系结核
 - C. 非淋菌性尿道炎
 - D. 慢性前列腺炎
 - E. 膀胱结石
98. 48岁女性患者，因慢性肾小球肾炎慢肾衰作血液透析已2年，近来感走路不便，下肢骨头酸痛，疑并发肾性骨营养不良症。治疗首选措施
- A. 口服氢氧化铝凝胶
 - B. 口服钙剂
 - C. 口服骨化三醇
 - D. 应用必需氨基酸
 - E. 以上都可
99. 女性，25岁，近一年来时有右下腹疼痛伴膀胱刺激症状。体检：腹软。右下腹深压痛，右腰部轻叩痛。尿常规红细胞++/HP，白细胞+/HP。肾图检查：右侧呈梗阻型曲线，应考虑为
- A. 慢性膀胱炎
 - B. 急性阑尾炎
 - C. 急性附件炎
 - D. 急性肾盂肾炎
 - E. 右输尿管下段结石
100. 患者男性，30岁，尿路结石患者，尿路结石对泌尿系统造成的损害不包括
- A. 泌尿系梗阻
 - B. 恶性肿瘤
 - C. 泌尿系感染
 - D. 诱发肾囊肿
 - E. 出血
101. 患者男性，25岁，高处坠落致肾损伤，最严重的肾损伤类型是
- A. 肾挫伤

- B. 肾全层裂伤
 - C. 肾蒂断裂
 - D. 肾部分损伤
 - E. 肾皮质裂伤
102. 患者男性, 30 岁, 考虑肾病综合征, 诊断肾病综合征的必备条件是
- A. 明显水肿, 大量蛋白尿
 - B. 明显水肿, 高脂血症
 - C. 低白蛋白血症, 高脂血症
 - D. 低白蛋白血症, 大量蛋白尿
 - E. 大量蛋白尿, 氮质血症
103. 女, 32 岁。阴道分泌物增多 1 个月。查体: 阴道内稀薄白带。阴道 pH 值为 5, 阴道分泌物线索细胞阳性。该患者首选的治疗药物为
- A. 链霉素
 - B. 甲硝唑
 - C. 红霉素
 - D. 氧氟沙星
 - E. 青霉素
104. 女, 32 岁, 药物流产后 3 天, 右下腹痛伴发热 2 天, 妇科检查阴道脓性分泌物, 宫颈举痛, 子宫饱满, 压痛 (+), 右附件区压痛明显, 最可能的诊断是
- A. 卵巢巧克力囊肿破裂
 - B. 急性阑尾炎
 - C. 卵巢黄体破裂
 - D. 异位妊娠破裂
 - E. 急性盆腔炎
105. 女, 56 岁。阴道脱出肿物 2 年。妇科检查: 阴道前壁膨出, 宫颈光滑, 用力时宫颈及部分宫体脱出阴道口外。该患者应诊断为阴道前壁膨出和子宫脱垂
- A. II 度轻型
 - B. I 度重型
 - C. I 度轻型
 - D. II 度重型
 - E. III 度
106. 女, 15 岁, 12 岁月经初潮。月经周期紊乱, 经期长短不一已有 1 年。肛门检查: 子宫发育正常, 双侧附件 (-), 最可能的诊断是
- A. 黄体功能不全
 - B. 黄体萎缩不全
 - C. 无排卵性功能失调性子宫出血
 - D. 子宫黏膜下肌瘤
 - E. 子宫内膜息肉
107. 女, 33 岁。停经 2 个月, 阴道不规则流血 4 天, 妇科检查子宫如 3 个月妊娠大小, B 超显示宫腔内落雪征。首先考虑
- A. 绒癌
 - B. 双胎妊娠
 - C. 自然流产
 - D. 葡萄胎

E. 羊水过多

108. 女患者, 48 岁, 无生育需求; 4 年来月经量多, 血红蛋白在 60g/L。妇检: 子宫增大如孕 12 周大小, 质软硬不均, 表面不平, 部分有囊性感。B 超示: 子宫肌瘤。此时治疗应选

- A. 子宫切除
- B. 手术剔除子宫肌瘤
- C. 激光治疗
- D. 雌激素治疗
- E. 孕激素治疗

109. 女, 31 岁, 妊娠 5 个月。发现尿糖 (+), OGTT 试验结果: 空腹血糖 6.6mmol / L, 2 小时血糖 10.6mmol / L, 既往无糖尿病史。最可能的诊断是

- A. 肾性糖尿
- B. 糖尿病合并妊娠
- C. 妊娠期糖尿病
- D. 继发性糖尿病
- E. 糖耐量异常

110. 女性, 57 岁, 外阴灼热不适、瘙痒 2 周, 妇科检查: 白带增多, 淡黄色, 阴道上皮皱壁消失, 粘膜有散在出血点, 初步考虑是

- A. 老年性阴道炎
- B. 细菌性阴道病
- C. 宫颈炎
- D. 滴虫性阴道炎
- E. 念珠菌阴道炎

111. 经产妇, 27 岁。足月顺产后第 2 天, 出现轻微下腹部阵痛。脐下 3 指可触及宫底, 无压痛, 阴道流血不多, 无恶心、呕吐。本例恰当处理措施应为

- A. 排除肠梗阻
- B. 按摩子宫
- C. 一般不需处理
- D. 给予止血药物
- E. 抗生素预防感染

112. 女, 26 岁, 妊娠 11 周。阵发性下腹痛 3 日, 阴道少量流血 1 日就诊。为确定是否能够继续妊娠, 此时应进行的辅助检查是

- A. 尿妊娠试验
- B. B 型超声检查
- C. 检测血清雌三醇值
- D. 检测血清雌二醇值
- E. 检测血清甲胎蛋白值

三、A3/A4型题

(113~114 题共用题干)

男, 66 岁。活动后突发左侧胸痛伴呼吸困难 1 天。既往慢性阻塞性疾病史 10 余年。查体: R26 次/分, BP 95/60mmHg。口唇发绀, 左肺呼吸音明显减弱, 心率 102 次/分, 律齐。

113. 该患者最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 自发性气胸
- C. 阻塞性肺不张

D. 胸腔积液

E. 肺栓塞

114. 为明确诊断，应先采取的检查措施是

A. CT 肺动脉造影

B. 胸腔穿刺

C. 支气管镜

D. 胸部 X 线片

E. 心电图

(115~116 题共用题干)

女性，65 岁有刺激性咳嗽，偶有胸闷，午后低热，37.5℃左右，伴盗汗，乏力等，查体：无明显异常，胸片示纵隔明显增宽，血常规检查正常。血沉 60mm/h，结核菌素试验弱阳性。

115. 可能的诊断是

A. 肺结核

B. 支气管淋巴结结核

C. 淋巴瘤

D. 胸腺瘤

E. 畸胎瘤

116. 最直接确诊的检查是

A. 胸部 CT

B. 骨髓穿刺

C. MRI

D. 纵隔镜

E. 气管镜

(117~119 题共用题干)

男性，45 岁。突发头痛伴恶心、呕吐 1 天来诊，有高血压病史 10 年，平日血压控制在 120~140 / 80~90mmHg，查体：血压 230 / 120mmHg（右上肢），220/110mmHg（左上肢），肌力 5 级，双侧病理反射未引出，尿蛋白（-）。

117. 最可能的诊断是

A. 脑出血

B. 脑血栓形成

C. 高血压脑病

D. 恶性高血压

E. 主动脉夹层

118. 如诊断已经成立，出现上述症状的主要发病机制是

A. 血液渗入主动脉壁中层

B. 脑微小动脉瘤破裂

C. 脑动脉硬化并发血栓形成

D. 脑组织血流灌注过多引起脑水肿

E. 周围小动脉痉挛

119. 该患者下一步的处理措施不正确的是

A. 行 CT 或 MRI 检查

B. 地西泮（安定）10~20mg 缓慢静脉注射

C. 甘露醇与速尿联合使用

D. 头部放置冰袋

E. 静脉滴注硝普钠

(120~122 题共用题干)

男性, 60 岁, 冠心病病史 20 年, 今晨突然晕厥, 持续约 1 分钟。查体: BP 120/70mmHg, 心率 100 次/分, 心音强弱不等, 节律绝对不整, 脉搏短绌。

120. 该患者最可能的诊断是

- A. 室早
- B. 房颤
- C. 心肌缺血
- D. 急性心肌梗死
- E. 房室传导阻滞

121. 导致该患者晕厥的是

- A. 血管疾病
- B. 脑源性疾病
- C. 血管舒张障碍
- D. 血液成分异常
- E. 心脏疾病

122. 下列药物中该患者慎用的是

- A. 肝素
- B. 普罗帕酮
- C. 胺碘酮
- D. 比索洛尔
- E. 维拉帕米

(123~125 题共用题干)

男性 50 岁, 患慢性肾炎已 5 年, 急性加重 1 月, 无力, 食欲缺乏, 有贫血貌。BP180/100mmHg, 肌酐清除率 30ml/min, 尿素氮 10.3mmol/L

123. 本例患者临床分期是

- A. 肾功能不全代偿期
- B. 肾功能不全失代偿期
- C. 肾衰竭期
- D. 尿毒症期
- E. 肾间歇期

124. 入院后血肌酐, 持续增高, 以下不是肾衰竭期指标的是

- A. 血肌酐升到 442~707 μ mol/L (5~ 8mg/dl)
- B. 肌酐清除率降低到 20~10ml/min
- C. 血尿素氮上升达 30.0mmol/L (80mg/dl)
- D. 进一步出现贫血、水电解质酸碱平衡紊乱
- E. $GFR < 15ml / (min \cdot 1.73m^2)$

125. 如果检查的结果如下, 哪一项是最高危的结果

- A. 尿素氮 312mmol/L
- B. 血肌酐 153 μ mol/L
- C. 血钾 6.9mmol/L
- D. 血钙 1.8mmol/L
- E. 二氧化碳结合力 18mmol/L

(126~127 题共用题干)

男，67岁，进行性排尿困难，尿线变细，饮酒后症状加重。

126. 要明确病因，首选的影像学检查是

- A. CT
- B. MRI
- C. B超
- D. KUB
- E. 膀胱造影检查

127. 该患者最可能的病因是

- A. 前列腺增生
- B. 尿道狭窄
- C. 膀胱肿瘤
- D. 尿道结石
- E. 神经性膀胱

(128~129题共用题干)

女，28岁。产后8个月，哺乳。厌食1周，B超下见宫腔内有一孕囊，妇科检查子宫软，如妊娠40天大小，人工流产术中，探针探宫腔深度：14cm，患者无明显腹痛，无阴道流血。

128. 应该考虑

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫肥大
- C. 子宫后位
- D. 子宫畸形
- E. 子宫穿孔

129. 应采取的处理是

- A. 继续操作吸宫
- B. 请上级大夫再次探宫腔深度
- C. 立即剖腹探查
- D. 后穹隆穿刺确定有无内出血
- E. 严密观察1周后再吸宫

(130~132题共用题干)

女，29岁，停经42天，突感下腹坠痛及肛门坠胀感，少量阴道流血及头晕呕吐半天。体格检查：面色苍白，BP80/40mmHg，腹肌略紧张，下腹压痛。妇科检查：阴道少量血性物，宫颈举痛(+)穹窿饱满，子宫稍大，附件区触诊不满意。

130. 首选检查项目应是

- A. B型超声检查
- B. 后穹隆穿刺
- C. 盆腔CT检查
- D. 诊断性刮宫
- E. 尿妊娠试验

131. 本例最恰当的处理是

- A. 中医治疗
- B. 输血治疗
- C. 同时手术探查纠正休克
- D. 应用抗生素
- E. 静脉输液

132. 本例最可能的诊断是

- A. 急性盆腔炎
- B. 先兆流产
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 异位妊娠
- E. 黄体破裂

四、B型选择题

(133~134 题共用备选答案)

- A. 等于零
- B. 等于肾小球滤过率
- C. 等于每分钟肾脏的血浆流量
- D. 大于 125ml / min
- E. 小于 125ml / min

133. 某种物质经滤过后既不被重吸收, 又不被分泌, 其血浆清除率

134. 某物质经滤过后, 又全部被肾小管重吸收, 其血浆清除率

(135~136 题共用备选答案)

- A. 胃液酸度升高
- B. 胃液酸度正常或减少
- C. 胃液酸度常减少
- D. 胃液酸度明显升高
- E. 胃液酸度明显减少

135. 重度胃体萎缩型胃炎

136. 胃泌素瘤

(137~138 题共用备选答案)

- A. 肝细胞肝癌
- B. 胃癌
- C. 燕麦细胞癌
- D. 前列腺癌
- E. 膀胱癌

137. 与 Hp 感染有关的癌是

138. 与黄曲霉菌毒素和乙型肝炎病毒感染有关的癌是

(139~140 题共用备选答案)

- A. 组织转化
- B. 增生
- C. 再生
- D. 变质
- E. 萎缩

139. 炎症后期, 病灶内组织由同种细胞修复, 称为

140. 炎症灶内组织和细胞的变性坏死, 称为

(141~144 题共用备选答案)

- A. 尼莫地平
- B. 硝苯地平
- C. 维拉帕米
- D. 利多卡因

E. 奎尼丁

141. 治疗急性心肌梗死引起的室性心动过速首选药物是

142. 治疗阵发性室上性心动过速的首选药是

143. 主要用于治疗脑血管病的药物是

144. 治疗肥厚性心肌病主要选用

(145~146 题共用备选答案)

A. 高压氧疗

B. 持续低流量给氧

C. 无控制性给氧

D. 鼻导管持续高浓度给氧

E. 呼气末正压给氧

145. 对急性呼吸窘迫综合征的治疗采用

146. 肺炎病人所致缺氧的治疗采用

(147~150 题共用备选答案)

A. 硫酸镁静脉滴注

B. 剖宫产

C. 肼苯达嗪静脉滴注

D. 甘露醇快速静滴

E. 低位产钳术

147. 孕 35 周，子痫，抽搐控制 6 小时。此时应采取的措施是

148. 轻度子痫前期初产妇，孕 39 周，临产，宫口开全 1 小时，LOA，S+4，胎心 100 次/分。

此时应采取的措施

149. 重度子痫前期高血压疾病孕妇血压 180 / 116mmHg 时首选处理是

150. 重度子痫前期孕妇头痛剧烈伴呕吐时首选治疗是

第二单元

一、A1型选择题

1. 铁剂治疗缺铁性贫血有效的最早期指标是

A. 血清铁蛋白增高

B. 血红蛋白升高

C. 骨髓细胞外铁增多

D. 红细胞总数升高

E. 网织红细胞升高

2. 缺铁性贫血不可见到的实验室检查是

A. 总铁结合力增加

B. 核老浆幼现象

C. 血清铁蛋白降低

D. 运铁蛋白饱和度降低

E. 游离卟啉原减少

3. 诊断成年女性贫血的标准为血红蛋白浓度低于

A. 140g/L

- B. 130g/L
- C. 120g/L
- D. 110g/L
- E. 100g/L

4. 下列哪项是慢性特发性血小板减少性紫癜合并贫血最适宜的检查:

- A. 血清铁蛋白测定
- B. 血常规
- C. 血红蛋白电泳
- D. 酸溶血试验
- E. 血沉

5. 关于中性粒减少和粒细胞缺乏症治疗不正确的是

- A. 对可疑致病因素, 应立即停止接触
- B. 要注意防止感染, 去除感染病灶
- C. 可用重组人粒细胞集落刺激因子治疗
- D. 自身免疫性粒细胞减少就可用糖皮质激素
- E. 碳酸锂有抑制骨髓, 不能用于治疗

6. 哪种贫血是由于造血原料不足或利用障碍引起的

- A. ITP (特发性血小板减少性紫癜)
- B. 缺铁性贫血
- C. PNH (阵发性睡眠性血红蛋白尿)
- D. 炎症性贫血
- E. 遗传性球形红细胞增多症

7. 下列哪项不符合痛风的特点

- A. 急性反复发作性单关节炎
- B. 高血酸血症
- C. 尿酸性肾结石
- D. 痛风石形成
- E. 游走性关节炎

8. 补钾速度一般不宜超过

- A. 10mmol/h
- B. 20mmol/h
- C. 30mmol/h
- D. 40mmol/h
- E. 50mmol/h

9. 关于糖尿病临床表现说法不正确的是

- A. 常常有皮肤瘙痒
- B. 可造成大血管病变, 形成动脉粥样硬化, 发生冠心病、脑血管意外和下肢坏疽等
- C. 可造成患者视力下降, 肾功能不全
- D. 常出现肢端感觉异常, 以右侧为甚
- E. 可造成白内障、青光眼、屈光改变等

10. 地方性单纯性甲状腺肿最主要的发病原因是

- A. 妊娠、授乳等因素对甲状腺激素需要量增加
- B. 食物和饮水中含碘量多而长期摄碘量过多
- C. 土壤、食物和饮水中含碘量低而长期摄碘量不足

- D. 长期服用抗甲状腺作用的硫脲类药物
- E. 先天性酶缺乏使甲状腺激素合成障碍
11. 分泌降钙素的部位是
- A. 甲状旁腺
- B. 甲状腺
- C. 肾脏
- D. 胰岛
- E. 垂体
12. 下列有关精神分裂症的治疗正确的是
- A. 精神分裂症目前倡导全病程治疗
- B. 抗精神病药物治疗应作为首选且唯一的治疗措施，
- C. 健康教育、工疗娱疗、心理社会干预等措施可不用贯穿治疗的全过程
- D. 对部分药物治疗效果不佳和（或）有木僵违拗、频繁自杀、攻击冲动的患者仅仅单用电抽搐治疗即可
- E. 对部分药物治疗效果不佳和（或）有木僵违拗、频繁自杀、攻击冲动的患者仅仅合用电抽搐治疗即可
13. 有关精神分裂症的临床分型正确的是
- A. 单纯型多以青少年起病，病情进展迅速，以阴性症状为主。
- B. 青春型，青年急性或亚急性起病，以思维、情感和行为的失调或解体（阳性症状）为主要临床表现。
- C. 紧张型主要以紧张综合征为主要临床表现，紧张性木僵和紧张性兴奋交替出现，不会单独出现
- D. 偏执型不常见，以相对稳定、系统的妄想为主要临床表现，往往伴有幻觉
- E. 未分化型主要表现为以阴性症状为主，又不符合偏执型、青春型和紧张型的患者。
14. 对于蛛网膜下腔出血病人哪项处置是错误的
- A. 绝对卧床休息
- B. 给镇静药物
- C. 给予止血药物
- D. 尽早病因治疗
- E. 便秘者给予肥皂水灌肠
15. 下列有关脑血栓形成的临床表现正确的是
- A. 多见于 80 岁以上患有动脉粥样硬化的老年人
- B. 多于静态发病，约 25% 患者病前有 TIA 史
- C. 多数病例的症状在 7~8 天内达高峰
- D. 通常意识障碍但是生命体征平稳
- E. 当大脑大面积梗死或基底动脉闭塞病情严重时，意识不清，但不会危及生命
16. 下列有关硬脑膜外血肿形成机制正确的是
- A. 与颅骨损伤直接受力有密切关系
- B. 与颅骨损伤直接受力无密切关系
- C. 血液积聚于颅骨与硬脑膜之外
- D. 在硬脑膜与颅骨分离过程中，不会再撕破一些小血管
- E. 硬脑膜外血肿一般多见于枕骨部
17. 下列关于急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病的临床表现正确的是
- A. 多数患者，起病前 2~4 周有上呼吸道或消化道感染症状，少数有免疫接种史。

B. 运动障碍，本病首发症状常为四肢对称性无力，可自远端向近端发展或相反方向发展，或远近端同时受累，瘫痪为弛缓性，腱反射减弱或消失，病理反射阴性

C. 感觉障碍一般比运动障碍轻，表现为肢体近端感觉异常和（或）手套、袜筒型感觉减退。有的病例疼痛明显，不少病例可无感觉障碍

D. 脑神经损害以双侧面神经麻痹常见，尤其在儿童

E. 自主神经功能障碍，可有出汗减少、皮肤潮红、手足肿胀及营养障碍

18. 下列有关头皮撕脱伤正确的是

A. 多因发辫受机械力牵扯，使大块头皮自帽状腱膜下层被撕脱所致，但不会连同颅骨骨膜

B. 不会导致失血性或神经性休克

C. 条件允许时，应采用显微外科技术行小血管吻合、头皮原位缝合，如获成活，毛发也不可能生长。

D. 治疗上应在压迫止血、防治休克、清创、抗感染的前提下，行中厚皮片植皮术，对骨膜已撕脱者，需在颅骨外板上多处钻孔至板障，然后植皮。

E. 治疗上直接行中厚皮片植皮术，对骨膜已撕脱者，需在颅骨外板上多处钻孔至板障，然后植皮。

19. 幻觉的定义是

A. 人脑的一种丰富想象的思维过程

B. 在梦幻中的一种知觉体验

C. 人脑对客观事物的一种错误的猜想

D. 对客观事物的歪曲知觉

E. 缺乏客观刺激作用于感官时的知觉体验

20. 关于惊恐障碍的定义，下列说法正确的是

A. 又称急性焦虑发作，是一种以反复发作的焦虑发作为主要原发症状的焦虑障碍

B. 惊恐发作并不局限于任何特定的情境，具有不可预测性

C. 一般急性发作，症状在发病后约 1 分钟达到高峰，大部分病人体验到很明显的躯体症状，往往首次就诊于急诊室

D. 由于 PD 患者躯体症状不突出，多寻就诊于一般科室

E. 对病人的过多检查和恰当地治疗会减轻患者的焦虑，增加患者的疾病负担

21. 下列关于脑震荡正确的是

A. 脑震荡表现为一过性的脑功能障碍，主要症状是受伤当时立即出现短暂的意识障碍，可为神志不清或半昏迷，常为数秒或数分钟。

B. 脑震荡表现为一过性的脑功能障碍，主要症状是受伤当时立即出现短暂的意识障碍，可为神志不清或完全昏迷，常为数小时。

C. 脑震荡表现为一过性的脑功能障碍，受伤当时不会立即出现意识障碍。

D. 脑震荡表现为一过性的脑功能障碍，立即出现短暂的意识障碍，不会神志不清或完全昏迷。

E. 脑震荡表现为一过性的脑功能障碍，主要症状是受伤当时立即出现短暂的意识障碍，可为神志不清或完全昏迷，常为数秒或数分钟。

22. 确定恶性骨肿瘤的唯一可靠检查是

A. X 线

B. CT

C. ECT

D. MRI

E. 病理组织学检查

23. 股骨头坏死早期诊断主要依靠的是

- A. X线
 - B. CT
 - C. MRI
 - D. B超
 - E. 动脉造影
24. 下列哪种颈椎病类型不适于牵引治疗
- A. 神经根型
 - B. 椎动脉型
 - C. 脊髓型
 - D. 交感神经型
 - E. 混合型
25. 髋关节复位的黄金时期
- A. 12~24 小时
 - B. 24~36 小时
 - C. 36~48 小时
 - D. 24~48 小时
 - E. 48~72 小时
26. 颈干角平均角度为
- A. 110°
 - B. 140°
 - C. 130°
 - D. 125°
 - E. 127°
27. 2 个月以上小儿首次接种卡介苗以下哪点最重要
- A. 皮内注射
 - B. 接种前应做结核菌素试验
 - C. 接种剂量应减半
 - D. 接种剂量避免感染
 - E. 接种浓度应减低
28. 我国颁发的母婴保健法进行筛查遗传代谢疾病是
- A. 21-三体综合征
 - B. 半乳糖血症
 - C. 先天性甲状腺功能低下
 - D. 乙肝
 - E. 肺结核
29. 复杂性热性惊厥主要特征是不包括
- A. 一次惊厥持续时间 15 分钟以上
 - B. 24 小时内反复 ≥ 2 次
 - C. 局灶性发作
 - D. 频繁发作, 累及 5 次以上
 - E. 一次惊厥持续时间 10 分钟以上
30. 下列哪个不是手足口病的住院指征
- A. 手、足、口出现皮疹
 - B. 肢体抖动或无力、瘫痪

- C. 面色苍白、心率增快、末梢循环不良
 - D. 精神差、嗜睡、易惊、烦躁不安
 - E. 双肺满布湿啰音
31. 婴幼儿哮喘最基本的治疗方法是应用
- A. 色甘酸钠
 - B. 全身糖皮质激素
 - C. β_2 肾上腺素能受体激动剂
 - D. 茶碱类药物
 - E. 酮替芬
32. 碳水化合物、脂肪和蛋白质三大营养素在人体内实际产能为多少 kcal/g
- A. 4, 4, 9 (kcal/g)
 - B. 9, 4, 4 (kcal/g)
 - C. 4, 9, 4 (kcal/g)
 - D. 4, 9, 9 (kcal/g)
 - E. 9, 9, 4 (kcal/g)
33. 小儿下呼吸道的解剖特点是
- A. 气管腔较宽
 - B. 黏膜血管少, 血运不丰富
 - C. 纤毛运动好
 - D. 左侧支气管较直
 - E. 肺弹力纤维发育差
34. 新生儿窒息复苏时最根本的是
- A. 尽量吸尽呼吸道黏液
 - B. 触觉刺激
 - C. 复苏器加压给氧
 - D. 胸外按压心脏
 - E. 喉镜下经口气管插管
35. 幼儿期年龄的划分应是
- A. 从出生到一周岁
 - B. 从出生到两周岁
 - C. 从一周岁到三周岁
 - D. 从一周岁到四周岁
 - E. 从两周岁到四周岁
36. 针对尖锐湿疣不合适的处理措施是
- A. 局部用药为主
 - B. 孕妇无需用药, 选择剖宫产终止妊娠即可
 - C. 大的尖锐湿疣可行手术切除
 - D. 治疗期间禁止性生活
 - E. 可用冷冻治疗, CO_2 激光治疗
37. 下列属于性传播疾病的是:
- A. 淋病
 - B. 生殖器疱疹
 - C. 梅毒
 - D. 艾滋病

E. 以上均属于

38. 乙型脑炎（简称乙脑）的主要传染源是：

- A. 猪
- B. 乙脑病毒携带者
- C. 鱼
- D. 蚊虫
- E. 蟋蟀

39. 急性血吸虫病的治疗首选

- A. 吡喹酮
- B. 噻苯咪唑
- C. 乙胺嗪
- D. 阿苯咪唑
- E. 左旋咪唑

40. 疟疾典型临床发作的机制是由于以下哪种原因：

- A. 疟原虫在肝细胞内增殖
- B. 疟原虫在红细胞内增殖
- C. 小滋养体释放入血
- D. 裂殖子及其代谢产物释放入血
- E. 细菌感染释放毒素

41. 目前认为乳腺癌最有效的检出方法是

- A. 防癌普查体检
- B. 红外线
- C. B超
- D. 核磁共振
- E. 钼靶摄片

42. 脓液恶臭，普通细菌培养阴性的是

- A. 大肠杆菌
- B. 拟杆菌
- C. 绿脓杆菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 金黄色葡萄球菌

43. 女性，39岁，身高160cm，体重65kg，若需要计算其每天所需基本热量应为

- A. 789kcal
- B. 1345kcal
- C. 1625kcal
- D. 1835kcal
- E. 2345kcal

44. 手术前不需要预防性使用抗生素的是下列哪项

- A. 先天性心脏病手术
- B. 乳腺癌根治术
- C. 主动脉弓置换
- D. 甲状腺腺瘤切除术
- E. 无张力疝修补术

45. 重度萎缩性胃体胃炎患者表现为

- A. 胃酸明显减少
 - B. 胃酸明显增高
 - C. 胃酸轻度增高
 - D. 胃酸轻度减少
 - E. 胃酸正常或减少
46. 下列哪种病因不是急性胃炎的病因
- A. 甾体类消炎药
 - B. 大面积烧伤
 - C. 急性感染
 - D. 颅内病变
 - E. 吸烟
47. 下列哪项不是早期食管癌的临床表现
- A. 食管内异物感
 - B. 食物停滞感
 - C. 进行性吞咽困难
 - D. 进食时胸骨后不适或疼痛
 - E. 进食时胸骨后烧灼感
48. 下列关于脾破裂的叙述，正确的是
- A. 有慢性病理改变的脾更容易破裂
 - B. 通常采用止血缝合处理
 - C. 通常不伴有脾包膜及脾实质破裂
 - D. 儿童脾切除术后，暴发性感染发病率低
 - E. 成人脾切除术后，暴发性感染发病率高
49. 关于肝破裂的描述，下列哪项是正确的
- A. 由于肝组织的缓冲作用不易引起胆汁性腹膜炎
 - B. 因左叶张力紧，破裂较右叶多见
 - C. 肝破裂如肝静脉主干有损伤，有并发空气栓塞的可能
 - D. 肝破裂应行肝叶切除术
 - E. 肝破裂胆道出血较少见
50. 腹部损伤的特点符合下列哪项叙述
- A. 有腹膜破损者为穿透伤（多伴内脏损伤）
 - B. 伤口大小与伤情严重程度成正比
 - C. 穿透伤的入、出口与伤道呈一条直线
 - D. 涉及内脏的开放性损伤，诊断常较困难
 - E. 因多数腹部损伤涉及内脏而伤情严重，死亡率一般在 30% 以上
51. 下列哪项属于股疝的常见特点
- A. 多见于中老年男性
 - B. 疝块较大
 - C. 疝块呈锥形隆起
 - D. 咳嗽冲击感明显
 - E. 容易嵌顿、容易绞窄
52. 构成腹股沟管前壁的组织结构有
- A. 腹横肌
 - B. 腹外斜肌腱膜

- C. 腹膜
- D. 腔隙韧带
- E. 腹横筋膜

53. 下列关于上消化道出血错误的是

- A. 出血量 $<600\text{ml}$ 不引起血压降低
- B. 活动性出血者，禁食
- C. 出血后血尿素氮升高
- D. 可以在胃内灌注去甲肾上腺素来治疗非静脉曲张破裂出血
- E. 静脉曲张破裂出血可采用垂体后叶素、生长抑素等

54. 内痔的主要表现为

- A. 肛门不适、瘙痒
- B. 肛门剧痛
- C. 出血和脱出
- D. 便秘和疼痛
- E. 肛门脓肿

55. 胰腺癌常见的首发症状是

- A. 上腹疼痛、不适
- B. 黄疸
- C. 消瘦、乏力
- D. 消化道症状
- E. 低热

56. 下列不属于肝脓肿时细菌入肝途径的是

- A. 胆道
- B. 肝动脉
- C. 门静脉
- D. 淋巴系统
- E. 腹腔种植

57. 门静脉高压症的主要原因是

- A. 门静脉炎
- B. 肝静脉阻塞
- C. 肝硬化
- D. 门静脉干血栓
- E. 多囊肝

58. 类风湿关节炎不常累及的关节是

- A. 肘关节
- B. 近端指间关节
- C. 远端指间关节
- D. 腕关节
- E. 掌指关节

二、A2型选择题

59. 男性，56岁。患消化性溃疡2年，近2周来感乏力、头晕、易疲劳；查：血红蛋白 60g/L ，白细胞 $5.5\times 10^9/\text{L}$ ，血小板 $280\times 10^9/\text{L}$ 。骨髓象提示“核老浆幼”现象，可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血

- B. 巨幼细胞性贫血
 - C. 地中海贫血
 - D. 再生障碍性贫血
 - E. 溶血性贫血
60. 女，43岁。乙肝肝硬化10年，近1周来高热伴乏力，出现鼻出血和皮肤多处瘀斑。为确定患者是否并发DIC，最有价值的实验室检查指标是
- A. 血浆凝血酶原下降
 - B. APTT 延长
 - C. 血浆凝血酶原增高
 - D. 血浆纤维蛋白原下降
 - E. PT 延长
61. 患者女，39岁。腹胀、呕吐已半年，多于午后发作，吐出隔夜食物，吐量较大，吐后舒服。由于长期呕吐，除脱水外，还会造成
- A. 低氯、高钾性碱中毒
 - B. 低氯、低钾性碱中毒
 - C. 低氯、高钾性酸中毒
 - D. 低氯、低钾性酸中毒
 - E. 低氯、低钾血症
62. 男，55岁，矿工，被困于井下7日，获救后严重口渴之后意识丧失，经过医生诊断是重度脱水合并休克，请问首选治疗措施为
- A. 静脉补液
 - B. 药物治疗
 - C. 口服补液
 - D. 饮食治疗
 - E. 胰岛素治疗
63. 患者男，23岁。神志不清3小时入院，既往患1型糖尿病1年，长期皮下注射胰岛素，关于糖尿病胰岛素治疗说法错误的是
- A. 1型、2型糖尿病患者都可以使用胰岛素治疗
 - B. 速效胰岛素对降低餐后血糖优于常规人胰岛素
 - C. 长效胰岛素类似物能更好的模拟生理基础胰岛素分泌
 - D. 胰岛素治疗容易出现空腹高血糖
 - E. 胰岛素最常见的副作用为过敏反应
64. 男性，67岁，身高170cm，体重80kg，因肺部肿瘤准备近日手术切除。术前检查空腹血糖10.2~11.8mmol/L，既往无糖尿病史，针对血糖最合适的处理是
- A. 饮食控制
 - B. 服用双胍类降血糖药物
 - C. 服用磺脲类降血糖药物
 - D. 胰岛素治疗
 - E. 葡萄糖苷酶抑制剂
65. 女，33岁，近2个月来食欲增加，出汗增加，怕热，体重下降并易激惹，活动增加，独处时偶尔听到有人议论她，或觉得一些行人对她吐痰等。实验室检查：血T₃、T₄增加，空腹血糖5.5mmol/L，该患者最可能的诊断是
- A. 精神分裂症
 - B. 躁狂发作

- C. 神经性贪食症
 - D. 甲状腺功能亢进症所致精神障碍
 - E. 糖尿病所致精神障碍
66. 男, 30 岁。两年来无原因地认为同事指桑骂槐地议论她, 街上行人的举动及电视内容都针对她。为之心情烦躁, 不敢上班。该患者的精神症状最可能是
- A. 影响妄想
 - B. 情感脆弱
 - C. 恐惧症
 - D. 关系妄想
 - E. 焦虑症
67. 何某, 女性, 31 岁, 初步考虑为脑器质性疾病所致的精神障碍, 对于该类患者的诊疗特点, 下述哪项不正确
- A. 前提是有脑病疾病
 - B. 治疗原则是祛除病因
 - C. 选择适量的抗精神病药物
 - D. 精神障碍不随脑部病变好转而好转
 - E. 常有人格改变
68. 某精神科医师检查一患者, 发现其言语缓慢, 语量减少, 语声甚低, 应优先考虑下述哪种疾病
- A. 强迫性思维
 - B. 思维奔逸
 - C. 联想散漫
 - D. 思维中断
 - E. 思维迟缓
69. 女性, 30 岁, 2 天来进行性双下肢瘫痪, 大小便障碍, 体温正常。胸水平以下深浅感觉丧失和截瘫。脑脊液检查压力正常, 白细胞 $80 \times 10^9/L$ (80 个/ mm^3), 淋巴细胞占 80%, 蛋白轻度增高, 最可能的诊断为
- A. 脊髓出血
 - B. 急性脊髓炎
 - C. 脊髓肿瘤
 - D. 多发性硬化症
 - E. 急性硬膜外脓肿
70. 患者, 女性, 27 岁, 1 周前曾有上感病史, 近 1 天来出现双下肢进行性瘫痪, 同时合并有肌张力减低、腱反射消失, 病理反射阴性, 此时应考虑患者可能是
- A. 多发性硬化
 - B. 急性脊髓炎
 - C. 脊髓肿瘤
 - D. 急性硬膜外血肿
 - E. 脊髓出血
71. 小王无眩晕、无听力障碍且肌力完好, 但却出现左上肢指鼻试验不正确和轮替动作差、左下肢跟膝胫试验差。病损部位在
- A. 小脑蚓部
 - B. 右侧小脑半球
 - C. 左侧小脑半球

- D. 左侧脑桥前庭神经核
- E. 右侧脑桥前庭神经核
72. 男性，28岁，外伤致桡骨远端骨折，X线示：骨折远端向桡背侧移位，近端向掌侧移位，此骨折分型为
- A. Colles 骨折
- B. Barton 骨折
- C. Smith 骨折
- D. Aviator 骨折
- E. Boxer 骨折
73. 男性，37岁，打球撞伤后出现腰部疼痛，同时向臀部、大腿后方，小腿外侧放射，用力憋气时疼痛可加剧。其诊断最大可能是
- A. 腰椎骨折
- B. 腰椎滑脱
- C. 腰部肌筋膜炎
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 腰扭伤
74. 男性，30岁，患有髋关节结核，有明显的髋关节屈曲、内收畸形，拟行髋关节结核手术治疗，应选择下述哪种治疗方法
- A. 髋关节滑膜切除术
- B. 病灶清除术
- C. 髋关节融合术
- D. 转子下矫正清除术
- E. 人工全髋关节置换术
75. 患者女性，19岁。右腕部被刀割伤3小时。查体：右手小指掌背侧及环指侧感觉障碍。损伤的神经是
- A. 桡神经
- B. 正中神经
- C. 尺神经
- D. 腋神经
- E. 肌皮神经
76. 女，30岁，由于侧身倒地右掌支撑，只右肩部肿胀，疼痛剧烈，检查：右肩轻度外展，弹性固定，方肩畸形，Dugas征（搭肩试验）阳性。临床诊断是
- A. 肱骨外科颈骨折
- B. 臂丛损伤
- C. 锁骨骨折
- D. 肩关节挫伤
- E. 肩关节脱位
77. 男性，52岁，骑车时不慎摔伤，致骨盆骨折，术后尿潴留烦躁不安，最佳处理方法是
- A. 肌内注射地西洋
- B. 下腹部热敷
- C. 口服止痛药
- D. 静脉注射氯贝胆碱
- E. 留置导尿管

78. 女性 20 岁。因外伤致第 4、5 颈椎骨折并发颈髓损伤，四肢呈弛缓性瘫痪，高热 40℃，持续数日不降，应采取何种降温方法
- A. 口服 APC
 - B. 冬眠疗法
 - C. 使用抗生素
 - D. 物理降温
 - E. 以上都不是
79. 女孩，1 岁半。平日偏食，不喜肉食，近 1 个月来面色蜡黄，逗之不笑，肢体有轻微颤抖。血象：血红蛋白 89g/L，红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $4 \times 10^9/L$ 。MCV>100fl，MCH>34pg，本例最可能的诊断是
- A. 缺铁性贫血
 - B. 低钙血症
 - C. 缺铁性贫血伴低钙血症
 - D. 巨幼细胞贫血
 - E. 营养不良伴低钙血症
80. 女性患儿，1 岁。低热 10 余日，喜哭易怒，嗜睡，有时便秘，体检：前囟膨隆，心肺正常，肝肋下 1.5cm，颈软，克氏征阴性，腹壁反射减弱，脑脊液外观毛玻璃样，蛋白 3.0g/L，细胞数 $200 \times 10^6/L$ ，糖 2.4mmol/L，氯化物 107mmol/L，诊断为
- A. 结核性脑膜炎
 - B. 化脓性脑膜炎
 - C. 中毒性脑病
 - D. 新型隐球菌脑膜炎
 - E. 病毒性脑膜炎
81. 一足月顺产男婴，生后一直母乳喂养。近 2 日来反应差，嗜睡，不吃奶，黄疸加深。体检：体温不升，皮肤呈大理石样花纹，脐部有脓性分泌物。血清总胆红素 $221 \mu\text{mol} / L$ (13mg / dl)，直接胆红素 $17 \mu\text{mol} / L$ (1mg / dl)，子血型"O"，母血型"A"。引起黄疸的原因是
- A. 新生儿 ABO 溶血病
 - B. 新生儿 Rh 溶血病
 - C. 先天性胆道闭锁
 - D. 核黄疸
 - E. 新生儿败血症
82. 3 个月男婴，冬季出生，足月顺产，生后一直母乳喂养，未添加辅食，体检：体重 6kg，枕秃明显，患儿易激惹、烦闹、夜间哭闹不安，多汗。首先考虑的原因为
- A. 人乳中酪蛋白含量较少
 - B. 人乳中乙型乳糖含量较少
 - C. 人乳中饱和脂肪酸含量较少
 - D. 人乳中维生素 D 含量较低
 - E. 人乳中维生素 K 含量较低
83. 男，2 岁，出生时正常。3 个月后皮肤和头发色泽逐渐变浅，目前无法独站，不能说话。偶尔有抽搐情形发生，身上有怪臭味。有助于诊断的检查是
- A. 脑电图
 - B. 血钙测定
 - C. 尿三氯化铁试验
 - D. 氨基酸分析

E. 血镁测定

84. 患儿, 13 个月, 因“面色苍白 1 月余”收住入院。体检时心尖区闻及 III/6 级收缩期杂音。

血常规: Hb50g/L, RBC 2.5×10^{12} /L。该患儿的贫血程度属于

- A. 正常血象
- B. 轻度贫血
- C. 中度贫血
- D. 重度贫血
- E. 极重度贫血

85. 6 岁, 发热 39.5 度、腹泻 1 日, 腹泻 7~8 次 / 天。黏液脓血便。腹痛伴里急后重。此前吃过未洗西红柿。诊断为细菌性痢疾, 其类型属于

- A. 轻型
- B. 普通型
- C. 中毒型
- D. 重型
- E. 慢性型

86. 某患者于 1 月 3 日起发病, 3 天来发热、恶心、呕吐、食欲减退、头痛、四肢酸痛、腰痛。

体检: 重病容, 球结膜充血, 无水肿, 咽充血, 腋下可见点状抓痕样出血点, 肝脾未及。血常规检查: WBC 12×10^9 / L, N72%, L28%, 可见异型淋巴细胞。尿常规: 尿蛋白(+++), RBC2~5 个 / HP, 该患者首先考虑的诊断

- A. 钩端螺旋体病
- B. 急性肠胃炎
- C. 流行性出血热
- D. 菌痢
- E. 肺部感染

87. 男, 25 岁, 体检时发现 HBsAg、抗-HBc、抗-HBe 阳性, 怀疑自己有传染性, 还应作的检查是

- A. 肝功能
- B. HBVDNA
- C. HBcAg
- D. 肝脏 B 超
- E. 肝脏穿刺

88. 某女性, 患慢性乙型肝炎 9 年, 血化验: HBsAg (+)、HBeAg (+)、抗 HBcAg (+)。其 3 岁女儿体检时血清抗 HBs (+), 追问病史, 无任何临床症状, 未注射乙肝疫苗, 其女儿属于

- A. 隐性感染
- B. 潜伏性感染
- C. 显性感染
- D. 病毒携带状态
- E. 混合感染

89. 患者男 20 岁精索静脉曲张术后, 恢复良好, 拆线时间应为术后

- A. 4~5 天
- B. 6~7 天
- C. 7~9 天
- D. 10~12 天
- E. 14 天

90. 女性, 27 岁, 体重 60kg, 其上肢及足部 II 度烧伤, 第一个 24 小时补充电解质的量约为
- A. 1650ml
 - B. 1500ml
 - C. 1450ml
 - D. 720ml
 - E. 750ml
91. 患者, 男性, 39 岁, 一周前务农时不慎割伤手指, 当时未做特殊处理, 近 2 天来感全身乏力, 头痛; 午饭时将碗不慎摔落, 立即出现头后仰, 口角下缩, 咧嘴等表现, 每天可发作数次, 每次发作持续数秒数分钟不等, 考虑初步诊断为
- A. 破伤风
 - B. 癫痫
 - C. 癔症
 - D. 共济失调
 - E. 舞蹈症
92. 女, 40 岁, 大便次数增多, 带血 2 个月, 伴便意频繁, 大便变形, 变细, 大便隐血(++), 直肠指诊: 距肛门 8cm 触到一肿物约 3cm×3cm 大小, 尚可活动, 指套上有血迹, 病理诊断直肠腺癌, 对其最主要的治疗方法为
- A. 放疗
 - B. 化疗
 - C. 根治性手术
 - D. 中药治疗
 - E. 激光烧灼
93. 男, 70 岁, 腹部疼痛 6 天, 以右下腹为重, 伴呕吐。检查: 急性病容, 右下腹饱满压痛, 肌紧张, 血白细胞 $14.5 \times 10^9/L$, 腹部透视可见少量气液平面。最可能的诊断为
- A. 阑尾周围脓肿
 - B. 急性肠梗阻
 - C. 急性胰腺炎
 - D. 急性胆囊炎
 - E. 急性化脓性胆管炎
94. 男, 68 岁。阵发性腹痛 1 年, 自觉有“气块”在腹中窜动, 起初大便次数增加, 近 3 个月腹胀、便秘, 近 3 天无肛门排气、排便, 呕吐物有粪便臭味, 一直感乏力和低热。根据病史考虑肠梗阻应为
- A. 高位完全梗阻
 - B. 低位不完全梗阻
 - C. 血运性肠梗阻
 - D. 高位不完全梗阻
 - E. 低位完全梗阻
95. 女, 45 岁。1 天前进多脂餐后出现右上腹剧烈绞痛, 阵发性加剧, 并向右肩背部放射, 伴恶心、呕吐、发热, 体温 38℃。该患者最可能的诊断是
- A. 肝脓肿
 - B. 胃溃疡穿孔
 - C. 急性肺栓塞
 - D. 急性胆囊炎
 - E. 急性胰腺炎

96. 男性, 58 岁, 因原发性肝癌行左半肝切除术后, 定期随访时下列哪项检查可预测肿瘤复发
- A. 肝脏 B 超
 - B. 肝脏 CT
 - C. 定期复查 AFP
 - D. 选择性肝动脉造影
 - E. MRI
97. 男, 54 岁。呕血、黑便 2 天, 嗜睡、行为改变 1 天。实验室检查: ALT 35U/L, AST 72U/L, ALB 27.3g/L。腹部 B 超示脾大。最可能的诊断是
- A. 胃癌
 - B. 肝硬化失代偿期
 - C. 急性胃黏膜病变
 - D. 消化性溃疡
 - E. 食管贲门黏膜撕裂综合征
98. 患者男性, 43 岁。间断上腹部胀满感 5 年, 进食后明显, 伴有上腹部疼痛和反酸。胃镜检查提示胃窦部黏膜红白相间, 黏膜胆汁黄染, 粘液池内有胆汁混合, 幽门呈开放状态, 可见胆汁反流, 治疗药物最适宜使用
- A. 斯达舒
 - B. 山莨菪碱
 - C. 庆大霉素
 - D. 吗丁啉+法莫替丁
 - E. 甲氧咪胍
99. 患者, 男性, 27 岁, 3 小时前因交通事故出现剧烈腹痛、腹胀急诊入院, 若在查体过程中发现下述哪一项, 属剖腹探查指征
- A. 腹痛、腹膜刺激征阳性逐渐缓解
 - B. 肠蠕动每分钟 4 次
 - C. 血压下降
 - D. 腹痛
 - E. 红细胞计数进行性下降
100. 男, 30 岁, 由 5m 高处跌下 2 小时, 腹痛, 腹肌紧张, 有压痛和反跳痛, 肠鸣音弱; BP104/70mmHg, P120 次/分, Hb80g/L; X 线检查: 右侧第 9、10 肋骨骨折, 右侧膈肌升高。最可能的诊断是
- A. 肝破裂
 - B. 胃破裂
 - C. 脾破裂
 - D. 横结肠破裂
 - E. 胰腺破裂
101. 男性, 32 岁, 阑尾切除术后 1 天出现烦躁、剧烈腹痛, 心率 108 次/分, 血压 90/60mmHg, 腹胀, 全腹压痛, 肠鸣音弱, 为除外腹腔内出血最准确的检查是
- A. B 超
 - B. CT
 - C. MRI
 - D. 直肠指诊
 - E. 腹腔穿刺

102. 男, 70 岁。右腹股沟区肿块 3 年, 平卧消失。查体: 右耻骨结节外上方有一半球形肿块, 未进入阴囊, 可用手回纳, 压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是
- A. 股疝
 - B. 腹股沟斜疝
 - C. 腹股沟直疝
 - D. 精索鞘膜积液
 - E. 交通性鞘膜积液
103. 女, 18 岁。低热、腹痛、腹部轻微压痛, 腹泻伴腹胀 2 个月。有游离腹水, 考虑为结核性腹膜炎, 具有确诊价值的检查为
- A. 血培养
 - B. 结核菌素试验
 - C. 腹膜活检
 - D. 腹水细菌培养
 - E. 血沉
104. 男, 65 岁, 上腹部无规律性隐痛 2 个月, 因饮酒后呕咖啡样物 150ml, 柏油便 300ml 来诊, 无肝病史。查体: 血压 90/60mmHg, 脉搏 100 次/分, 血红蛋白 90g/L, 上腹部轻度压痛, 肝脾肋下未触及, 其止血措施最好选择
- A. 维生素 K1 静脉滴注
 - B. 奥美拉唑静脉注射
 - C. 氨基己酸静脉滴注
 - D. 三腔二囊管压迫
 - E. 垂体后叶素静脉滴注
105. 男性, 40 岁, 最近半年来肛门剧痛不适、瘙痒, 肛门检查见肛周暗紫色长条圆形肿物, 表面皮肤水肿、质硬、压痛明显, 直肠指检未见明显异常。该患者最可能的诊断是
- A. 内痔
 - B. 外痔
 - C. 混合痔
 - D. 环状痔
 - E. 直肠癌
106. 女, 37 岁, 慢性腹泻 2 年, 大便每天 2~3 次, 常带少量黏液, 反复粪便致病菌培养阴性, 结肠镜检查见为直肠、降结肠和横结肠充血、水肿, 有少数散在浅溃疡。拟诊为溃疡性结肠炎。首选的治疗方案是
- A. 泼尼松口服
 - B. 诺氟沙星口服
 - C. 甲硝唑保留灌肠
 - D. 氢化可的松保留灌肠
 - E. 美沙拉嗪 (5-氨基水杨酸) 口服
107. 女性, 60 岁, 近 3 个月出现便意频繁, 排便不尽感, 偶有便中带血。直肠指检触及包块。该患者最可能的诊断是
- A. 肛裂
 - B. 肛痿
 - C. 直肠肛管周围脓肿
 - D. 直肠癌

E. 痔

108. 男, 60 岁。阑尾切除术后第 6 天起上腹压痛, 伴发热、寒战, 体温高达 39.5°C , 无腹泻。右下胸叩痛, 呼吸音减弱, 腹稍胀, 右上腹压痛, 腹肌软, 未及肿块, 肠鸣音不亢进。最可能的诊断是

- A. 右侧肺炎
- B. 右侧肺不张
- C. 膈下脓肿
- D. 盆腔脓肿
- E. 小肠梗阻

109. 男性, 50 岁, 急性胰腺炎行胆囊造瘘、胰腺引流术后, 仍输液、禁食、减压及抗感染治疗, 并吸入高浓度氧, 动脉血气分析为 $\text{pH}7.46$ 、 $\text{PaO}_2 55\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 32\text{mmHg}$, X 线胸片示两肺有较广泛的点、片状阴影, 心电图示窦性心动过速, 此时提示病人可能存在

- A. 急性心力衰竭
- B. 阻塞性肺部病变
- C. 术后肺不张
- D. 肺部感染
- E. ARDS

110. 男, 37 岁。确诊为急性胰腺炎, 内科正规治疗 2 周后体温仍在 $38\sim 39^{\circ}\text{C}$, 左上腹压痛明显。尿淀粉酶 256U (Winslow 法), 血 $\text{WBC} 12 \times 10^9/\text{L}$, 可能性最大的是

- A. 病情迁延未愈
- B. 并发胰腺脓肿
- C. 并发胰腺假性囊肿
- D. 败血症
- E. 合并急性胆囊炎

111. 女, 29 岁, 上腹痛半天, 呕吐, 腹胀, 血淀粉酶 750U/L , $\text{BP} 80/50\text{mmHg}$, 脉搏 120 次/分, 最可能的诊断为

- A. 急性肾衰竭
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性心肌梗死
- D. 急性胃炎
- E. 急性肝炎

112. 男性, 60 岁, 患有肝硬化及肝性脑病, 其脑电图改变最可能为

- A. 节律变快
- B. 节律变慢
- C. 节律紊乱
- D. 无节律
- E. 节律骤变

113. 女性, 50 岁, 怀疑有肝硬化, 下列检查不宜做的是

- A. 腹部超声
- B. CT 检查
- C. 内镜检查
- D. 肝穿刺活组织检查
- E. PET

114. 患者，男性，49岁，乙肝肝硬化病史5年，近日来性格改变，主要表现为夜间兴奋，白天嗜睡，行为变的异常，在墙上乱写标语，胡乱作画，此时应注意下述哪种并发症

- A. 思维奔逸
- B. 肝性脑病
- C. 癫痫
- D. 应激障碍
- E. 功能性消化不良

115. 男，46岁。5年前开始发生间断上腹疼痛，疼痛发作与情绪、饮食有关。查体：上腹部轻压痛。胃镜：胃窦皱襞平坦，黏膜粗糙无光泽，黏膜下血管透见。此病例考虑诊断为

- A. 消化性溃疡
- B. 胃黏膜脱垂
- C. 慢性浅表性胃炎
- D. 慢性萎缩性胃炎
- E. 胃癌

三、A3/A4型选择题

(116~118题共用题干)

男，26岁，6天前发热、咽疼，应用抗生素治疗无效。颈部浅表淋巴结肿大，咽部充血，扁桃体Ⅱ度肿大，下肢少许瘀斑。白细胞 $16.6 \times 10^9 / L$ ，原始细胞 0.60，血红蛋白 $80g / L$ ，血小板 $34 \times 10^9 / L$ 。

116. 最可能的诊断是

- A. 特发性血小板减少性紫癜
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. DIC
- E. 急性白血病

117. 体检中应特别注意的体征是

- A. 睑结膜苍白
- B. 胸骨压痛
- C. 浅表淋巴结肿大
- D. 蜘蛛痣
- E. 皮肤淤斑

118. 为明确诊断应做的检查是

- A. 血常规
- B. 血清铁蛋白
- C. 血沉
- D. 淋巴结活检
- E. 骨髓涂片细胞学检查

(119~120题共用题干)

女，17岁。疲乏无力、心悸、怕热、多食半年。大便3次/日，不成形。体重下降约11kg。查体：BP 140/70mmHg，身高168cm，体重46kg。皮肤潮，手有细颤，轻微眼突，甲状腺Ⅰ度弥漫性肿大，质软，无触痛，心率108次/分。抗甲状腺药物治疗2个月后症状明显缓解。

119. 此例抗甲状腺药物的作用机制是

- A. 破坏甲状腺滤泡细胞
- B. 阻断甲状腺激素的作用

- C. 抑制甲状腺激素的合成
 - D. 加速甲状腺激素的消除作用
 - E. 减少甲状腺组织
120. 治疗中可能发生的最严重不良反应是
- A. 粒细胞减少
 - B. 转氨酶轻度增高
 - C. 药疹
 - D. 永久性甲状腺功能低下
 - E. 甲状腺肿大

(121~123 题共用题干)

30 岁男患者，病程 4 个月，头痛发病，入院前出现左侧肢体无力和呕吐，入院检查，意识清，眼底视乳头水肿，左上肢肌力 IV 级，腱反射活跃，病理征 (+)

121. 诊断是
- A. 脑梗死
 - B. 脑出血
 - C. 蛛网膜下腔出血
 - D. 脑水肿
 - E. 颅内压增高
122. 应采用的检查是
- A. X 线颅片
 - B. 脑电图
 - C. 脑血管造影
 - D. CT
 - E. ECT
123. 根本治疗原则是
- A. 脱水治疗
 - B. 给予镇痛剂
 - C. 冬眠物理降温
 - D. 去病因治疗
 - E. 去骨开颅减压

(124~126 题共用题干)

男孩，13 岁，1 小时前骑车摔倒，右肘部着地，右肘肿胀压痛，半屈位畸形，前臂明显肿胀，x 线检查提示骨骺上骨折。

124. 应给予的紧急处理为
- A. 手法复位外固定
 - B. 下肢管型石膏固定
 - C. 口服利尿剂
 - D. 夹板固定
 - E. 尽快手术
125. 若小儿出现手部皮肤苍白，发凉，麻木，桡动脉搏动微弱，测前臂组织压力 65mmHg 时考虑
- A. 血管损伤
 - B. 神经损伤
 - C. 静脉血栓形成

- D. 缺血性骨坏死
- E. 骨筋膜室综合征

126. 出现上述情况后, 若治疗不及时可发生

- A. 休克
- B. 运动功能障碍
- C. 股白肿
- D. 间歇性跛行
- E. 坏疽

(127~129 题共用题干)

男性, 42 岁, 自幼期咳嗽、咳痰、喘息, 多于受凉后发作, 静滴“青霉素”可缓解, 10~20 岁无发作, 20 岁后又有一次大发作, 发作时大汗淋漓、全身发紫、端坐不能平卧, 肺部可闻及哮鸣音, 静脉推注“氨茶碱”、“地塞米松”可完全缓解。自后反复出现夜间轻微喘息, 每周发作 3 次以上, 不能入睡, PEF 变异率为 35%。查体: 双肺听诊未闻及干湿啰音, 心率 89 次/分。

127. 最可能的诊断是

- A. 支气管哮喘急性发作
- B. 支气管哮喘非急性发作
- C. 先天性心脏病急性左心衰竭
- D. 肺源性心脏病心功能不全
- E. 喘息型慢性支气管炎急性发作

128. 病情程度选择药物治疗最佳方案是

- A. 每日吸入氨茶碱+静滴 β_2 受体激动剂
- B. 每日雾化吸入 β_2 受体激动剂+静滴氨茶碱
- C. 每日雾化吸入抗胆碱药+口服 β_2 受体激动剂
- D. 每日吸入糖皮质激素+吸入 β_2 受体激动剂
- E. 每日定量吸入糖皮质激素+静滴 β_2 受体激动剂

129. 为了提高疗效, 减少复发, 教育患者需掌握

- A. 正确使用气雾剂的方法
- B. 哮喘患者不发作可不用药
- C. 抗感染药物治疗不根治哮喘
- D. 哮喘患者不发作不能使用激素
- E. 哮喘者需长期使用 β_2 受体激动剂

(130~132 题共用题干)

男, 7 个月。因腹泻 1 天, 发热 39°C 于 9 月 13 日入院。查体: 咽红, 精神差, 皮肤弹性差, 前囟、眼窝明显凹陷, 四肢厥冷, 脉弱, 尿少, 呼吸深长, 大便呈蛋花汤样, 无腥臭味, 偶见白细胞

130. 首先考虑的诊断是

- A. 生理性腹泻
- B. 轮状病毒肠炎
- C. 进食过量或喂养不当
- D. 出血性大肠杆菌
- E. 致病性大肠埃希菌肠炎

131. 根据上述症状患儿脱水类型

- A. 重度脱水+酸中毒
- B. 中度脱水

- C. 轻度脱水
- D. 中度脱水+酸中毒
- E. 轻度脱水+酸中毒

132. 根据其脱水程度, 其失水量占体重的比例是

- A. 2%~5%
- B. 5%~10%
- C. >10%
- D. >15%
- E. >20%

(133~134 题共用题干)

女孩, 13 岁, 发热 2 周余, 胸腹部间断的出现环形红斑, 化验: 血红蛋白 100g/L, WBC $13.6 \times 10^9/L$, N0.82, L0.17, ESR50mm/h, CRP (+), ASO500 μ/ml , 心电图正常, 诊断风湿热

133. 应首选的治疗为

- A. 阿司匹林
- B. 阿司匹林+强的松
- C. 青霉素+强的松
- D. 青霉素
- E. 青霉素+阿司匹林

134. 下列哪项不是本病的主要表现

- A. 心脏炎
- B. 舞蹈病
- C. 关节酸痛
- D. 皮下结节
- E. 环形红斑

(135~137 题共用题干)

男, 25 岁, 4 小时前口服敌百虫, 查体: 躁动, 瞳孔缩小, 肺部湿啰音。

135. 下列哪项是错误的处置

- A. 应用阿托品
- B. 应用解磷定
- C. 吸氧
- D. 2%碳酸氢钠洗胃
- E. 地西洋肌肉注射

136. 解除有机磷中毒时毒蕈碱中毒性作用, 首选的药物

- A. 静注阿托品
- B. 静注解磷定
- C. 糖皮质激素
- D. 静注甘露醇
- E. 静注乙酰胆碱

137. 有机磷杀虫药中毒的表现中, 用阿托品治疗有效的是下列哪种

- A. 呼吸困难
- B. 流涎
- C. 多汗
- D. 腹痛
- E. 以上都是

(138~139 题共用题干)

女, 55 岁, 皮肤黄染进行性加重 1 个月, 10 天前发现小便呈浓茶样, 近几天来大便呈灰白色, 查体: T36.8℃, 皮肤、巩膜黄染, 腹软, 右上腹可触及肿大的胆囊, 无压痛, 无反跳痛。

138. 最可能的诊断是

- A. 胆总管结石
- B. 肝细胞性肝癌
- C. 肝门部胆管癌
- D. 胆囊结石
- E. 胰头癌

139. 该患者手术治疗后第 4 天发生上腹部剧烈疼痛, 腹腔引流明显增加, 引流液淀粉酶 15000U/L, 患者最优可能发生的并发症是

- A. 胰漏
- B. 急性胰腺炎
- C. 肠系膜血栓形成
- D. 肠漏
- E. 胆漏

(140~141 题共用题干)

男, 56 岁。反复上腹胀痛 1 年, 进食后呕吐 1 个月, 呕吐物含有宿食。查体: 贫血貌, 消瘦, 上腹可见胃型, 可闻及振水音

140. 最有价值的辅助检查是

- A. B 超
- B. 腹部 CT
- C. 纤维胃镜
- D. 腹部 X 线平片
- E. 全消化道钡餐

141. 患者最早出现的酸碱失衡和水、电解质紊乱的类型是

- A. 低钾血症、代谢性碱中毒
- B. 高钾血症、代谢性酸中毒
- C. 高钾血症、代谢性碱中毒
- D. 低钾血症、代谢性酸中毒
- E. 低氯血症、代谢性酸中毒

(142~143 题共用题干)

女性, 40 岁, 胃溃疡史 4 年, 2 月来上腹无规律疼痛, 进食后加重。钡餐透视: 胃粘膜增粗, 紊乱, 胃窦见 1.0cm×1.5cm 龛影。

142. 若患者血压为 70/50mmHg, 心率 120 次 / 分, 并出现面色苍白、烦躁、出汗, 则首选的治疗措施是

- A. 输血
- B. 口服去甲肾上腺素
- C. 肌注止血敏
- D. 输白蛋白
- E. 输生理盐水

143. 该患者的诊断为

- A. 胃溃疡癌变
- B. 复合性溃疡

- C. 胃溃疡并幽门梗阻
- D. 胃溃疡并慢性胃炎
- E. 胃溃疡并胃粘膜脱垂

(144~145 题共用题干)

男性, 42 岁, 高血压病史, 长期服用硝苯地平, 最近出现烧心、反流、胸痛, 食用高脂肪、巧克力等症状明显加重。

144. 该患者最可能的诊断是

- A. 胃溃疡
- B. 十二指肠溃疡
- C. 胃食管反流病
- D. 冠心病
- E. 肋间神经炎

145. 该患者首选的检查是

- A. 胃镜
- B. 肠镜
- C. 食管 X 线
- D. 心电图
- E. 肌电图

(146~147 题共用题干)

男, 60 岁。反复双手近端指间关节、膝关节痛伴晨僵 3 年, 肘部伸侧可触及皮下结节, 质硬、无触痛。

146. 诊断首先考虑

- A. 脊柱关节病
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 强直性脊柱炎
- D. 骨关节炎
- E. 类风湿关节炎

147. 最有助于确定诊断的辅助检查是

- A. 脑脊液检查
- B. 血沉
- C. 血常规
- D. 影像学
- E. 血抗链球菌溶血“O”测定

四、B型选择题

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 动脉导管未闭
- E. 法洛四联症

148. 靴型心

149. 胸骨左缘上方有已连续“机器”样杂音

150. 出现差异性发绀