

经典必做500考题-西药二

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

1. 下列哪项不属于镇痛药的使用原则

- A. 口服给药，尤其是强阿片类
- B. 应按时给药，而非按需给药
- C. 按阶梯给药
- D. 应剂量个体化，给药剂量受药典极量限制
- E. 哌替啶不宜广泛用于癌症晚期疼痛

2. 以下关于祛痰药乙酰半胱氨酸的说法，错误的是

- A. 乙酰半胱氨酸能解除对乙酰氨基酚中毒
- C. 可导致青霉素、头孢菌素等活性下降，若需联合使用，应间隔 4 小时
- D. 乙酰半胱氨酸通过降解黏痰中的多糖纤维素，促使痰液变稀薄
- E. 乙酰半胱氨酸在酸性条件下，作用减弱，联用碳酸氢钠，作用增强

3. 抗痛风药秋水仙碱的作用机制为

- A. 抑制尿酸生成
- B. 促使尿酸排泄
- C. 促进尿酸分解
- D. 抑制黄嘌呤氧化酶
- E. 缓解痛风炎症作用

4. 属于黏痰溶解剂，适用于痰液黏稠引起的呼吸困难的祛痰药物是

- A. 碘化钾
- B. 愈创甘油醚
- C. 乙酰半胱氨酸
- D. 氯化铵
- E. 羧甲司坦

5. 关于白三烯受体阻断剂的作用特点，说法错误的是

- A. 尤其适用于阿司匹林哮喘、运动性哮喘和同时伴有过敏性鼻炎的哮喘
- B. 可用于预防高剂量吸入性糖皮质激素减量时哮喘的恶化
- C. 效果不及吸入性糖皮质激素，不能取代糖皮质激素
- D. 普通饮食对口服生物利用度无影响，清晨和夜间服药时药动学有较大差异
- E. 起效慢，作用弱，不宜单独应用

6. 患者，男，80 岁。因慢性心功能不全、同时伴有双下肢水肿住院。能充分控制心衰患者液体潴留的药物是

- A. 血管紧张素转换酶抑制剂
- B. 利尿剂
- C. 肾素抑制剂
- D. β 受体阻断剂
- E. 强心苷

7. 下列关于胺碘酮的描述，错误的是

- A. 是广谱抗心律失常药
- B. 能明显抑制复极过程
- C. 主要以原形经肾脏排泄
- D. 主要经肝代谢

- E. 可用于肾功能不全者且无需调整剂量
8. 与氯吡格雷合用，竞争 CYP2C19，使氯吡格雷血小板抑制作用降低的药物是
- A. 西咪替丁
B. 泮托拉唑
C. 奥美拉唑
D. 雷贝拉唑
E. 法莫替丁
9. 地西泮的适应证不包括
- A. 焦虑症
B. 破伤风惊厥
C. 抑郁症
D. 癫痫持续状态
E. 紧张性头痛
10. 可阻滞 T 型钙通道，对失神发作有效的抗癫痫药是
- A. 加巴喷丁
B. 唑尼沙胺
C. 氨己烯酸
D. 卡马西平
E. 丙戊酸钠
11. 下述不属于抗血小板类药物的是
- A. 血栓素 A_2 (TXA₂) 抑制剂
B. 磷酸二酯酶抑制剂
C. 二磷酸腺苷 P2Y₁₂ 受体激动剂
D. 非特异性纤溶酶原激活剂
E. 血小板糖蛋白(GP) IIb/IIIa 受体阻断剂
12. 关于双嘧达莫的描述，正确的是
- A. 治疗血栓病每日剂量需要 40 mg
B. 不能与阿司匹林合用
C. 严重冠脉病变患者可发生冠脉窃血
D. 用药后不会引起低血压
E. 静脉注射给药时不得与葡萄糖混合注射
13. 下列哪项不是胰岛素的正确使用方法
- A. 每次注射需要更换不同部位
B. 药物过量须及时给予葡萄糖或口服糖类
C. 混悬型胰岛素可以静脉注射
D. 未使用的胰岛素应在 2~10°C 冷藏保存
E. 已开始使用的胰岛素应在 25°C 保存 4 周
14. 可用于肝昏迷、血氨升高所致的精神症状，也适用于忌钠的患者，该药物是
- A. 精氨酸
B. 色氨酸
C. 亮氨酸
D. 赖氨酸
E. 苏氨酸
15. 下列不属于降低眼内压药物的是

- A. β 受体阻断剂
B. 拟 M 胆碱药
C. 前列腺素类似物
D. 肾上腺素受体激动剂
E. α 受体阻断剂
16. 适用于呼吸道合胞病毒引起的病毒性肺炎与支气管炎的药物是
A. 维帕他韦
B. 恩替卡韦
C. 阿德福韦酯
D. 利巴韦林
E. 拉米夫定
17. 下列关于塞来昔布的描述，错误的是
A. 选择性抑制环氧酶-2 的活性
B. 主要经肝药酶 CYP2C9 代谢
C. 具有磺胺样结构，有类磺胺过敏反应
D. 可预防心脑血管事件
E. 用于缓解手术前、后的急性疼痛
18. 下列哪项不属于痛风治疗的方法是
A. 别嘌醇不能控制痛风性关节炎的急性炎症症状，不能作为抗炎药使用
B. 苯溴马隆适用于原发性和继发性高尿酸血症
C. 痛风急性期应给予秋水仙碱
D. 慢性痛风发作主要用丙磺舒和别嘌醇
E. 服用丙磺舒应多喝水，避免引起尿道刺激
19. 下列有关 H_2 受体阻断剂的相互作用及特点不正确的是
A. 西咪替丁是上市最早的 H_2 受体阻断剂
B. 西咪替丁具有轻度抗雄激素样作用
C. 雷尼替丁可能干扰磺酰脲类口服降糖药的药效
D. 雷尼替丁对肝药酶的抑制强于西咪替丁
E. 西咪替丁分子中含有咪唑环结构，通过咪唑环与 P450 结合而降低肝药酶活性
20. 阻止疟原虫在蚊体内增殖，控制传播的药物是
A. 氯奎
B. 青蒿素
C. 伯氨喹
D. 乙胺嘧啶
E. 奎宁
21. 下列哪项不是提高质子泵抑制剂稳定性的有效措施
A. 需制备成肠溶制剂
B. 整片吞服，不得嚼碎或压碎
C. 注射液只能用氯化钠注射液或专用溶剂溶解
D. 合用抗酸药会降低自身的生物利用度，因此与抗酸剂合用应间隔至少 30min
E. 应用酸性较强的溶剂，并在溶后 4 h 用完
22. 与伊立替康联用治疗表达表皮生长因子受体，经伊立替康治疗失败的转移性结直肠癌的药物是
A. 利妥昔单抗

- B. 吉非替尼
C. 西妥昔单抗
D. 甲氨蝶呤
E. 顺铂
23. 下列关于微生态制剂的描述，错误的是
- A. 地衣芽孢杆菌制剂、双歧三联活菌制剂都属于微生态制剂
B. 可用于菌群失调所致的腹泻或便秘
C. 活菌制剂不宜与抗菌药物同服
D. 婴幼儿服用可将药粉加入少量的牛奶
E. 安全性高，不易发生过敏反应
24. 阿糖胞苷属于
- A. 胸苷酸合成酶抑制剂
B. DNA 多聚酶抑制剂
C. 核苷酸还原酶抑制剂
D. 二氢叶酸还原酶抑制剂
E. 嘌呤核苷酸互变抑制剂
25. 抑制细胞膜上的 Na^+ , K^+ -ATP 酶，导致细胞内 Ca^{2+} 浓度增加，增强心肌收缩力的药物是
- A. β 受体阻断剂
B. 呋塞米
C. 多巴胺
D. 米力农
E. 毒毛花苷 K
26. 关于生长抑素的描述中，错误的是
- A. 可抑制胃泌素、胃酸及胃蛋白酶的分泌
B. 治疗食管静脉曲张出血方面有一定的临床价值
C. 用于预防和治疗胰腺外科手术并发症
D. 用葡萄糖溶液稀释，静脉滴注给药
E. 有效地治疗糖尿病酮症酸中毒
27. 下列药物中具有肺毒性和显著光过敏的抗心律失常药是
- A. 普罗帕酮
B. 美西律
C. 地尔硫草
D. 胺碘酮
E. 维拉帕米
28. 下列药物中不属于治疗疥疮的药物是
- A. 林旦霜
B. 硫黄软膏
C. 克罗米通
D. 过氧苯甲酰
E. 苯甲酸苄酯
29. 防止硝酸酯类产生耐受现象的措施是
- A. 首剂减半
B. 选择偏心给药方法
C. 口服应保证 4 h 以上的间歇期

- D. 产生耐受的患者应避免联合用药
- E. 硝酸酯类加大剂量
30. 尤其适用于胰岛素抵抗的糖尿病患者，常见不良反应是体重增加和水肿的降糖药物是
- A. 阿卡波糖
- B. 格列本脲
- C. 罗格列酮
- D. 二甲双胍
- E. 瑞格列奈
31. 可用于防治泌尿系统结石的药物是
- A. 枸橼酸钾
- B. 氯化钠
- C. 氯化钾
- D. 氯化钙
- E. 门冬氨酸钾镁
32. 用于治疗侵袭性念珠菌病的首选药是
- A. 伊曲康唑
- B. 氟康唑
- C. 灰黄霉素
- D. 特比萘芬
- E. 氟胞嘧啶
33. 患者，男性，45岁。有支气管哮喘病史20余年。因阵发性室上性心动过速急诊入院，首选的治疗药物是
- A. 腺苷
- B. 维拉帕米
- C. 美西律
- D. 普萘洛尔
- E. 苯妥英钠
34. 以下降压药会对男性患者产生明显不良反应的是
- A. 福辛普利
- B. 替米沙坦
- C. 普萘洛尔
- D. 甲基多巴
- E. 吲达帕胺
35. 可纠正贫血症状，不能改善神经症状，若仍用大剂量可导致神经损害向不可逆方向发展的药物是
- A. 维生素 B₁₂
- B. 维生素 K
- C. 华法林
- D. 叶酸
- E. 硫酸亚铁
36. 下列哪项不是碳青霉烯类抗生素药物作用特点
- A. 需氧菌、厌氧菌均具有很强的抗菌活性
- B. 适用于耐药菌感染和多种细菌感染
- C. 适用于脑膜炎的治疗

- D. 长期应用可出现维生素 K、维生素 B 族缺乏症
E. 可引起中枢神经系统严重不良反应
37. 属于丙烯胺类抗真菌药，临床作为皮肤癣病首选的药物是
- A. 特比萘芬
B. 灰黄霉素
C. 卡泊芬净
D. 制霉菌素
E. 阿莫罗芬
38. 抗乙肝病毒药物十分常见的不良反应是
- A. 急性肾衰
B. 骨髓抑制
C. 精神异常
D. 肝炎恶化
E. 胰腺炎
39. 抗瘤谱较广，对恶性淋巴瘤效果显著，还能用于治疗自身免疫性疾病的药物是
- A. 多柔比星
B. 环磷酰胺
C. 长春新碱
D. 博来霉素
E. 奥沙利铂
40. 能减弱华法林抗凝作用的药物是
- A. 阿司匹林
B. 广谱抗生素
C. 口服避孕药
D. 西咪替丁
E. 胺碘酮

二、配伍选择题（共 60 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，也可不选用。每题只有 1 个选项最符合题意）

【41~42】

- A. 吡拉西坦
B. 多奈哌齐
C. 哌拉西坦
D. 舍曲林
E. 吗氯贝胺
41. 通过抑制胆碱酯酶活性，提高脑内乙酰胆碱含量的药物是
42. 具有锥体外系反应，亨廷顿病患者禁用的药物是

【43~45】

- A. 水钠潴留
B. 抑制蛋白质合成
C. 促进胃酸分泌及胃蛋白酶分解
D. 抑制免疫功能，只抗炎不抗菌
E. 兴奋中枢神经系统
43. 糖皮质激素禁用于严重高血压患者是因为
44. 糖皮质激素禁用于精神病患者是因为

45. 糖皮质激素禁用于胃溃疡患者是因为

【46~48】

- A. 依那普利
- B. 尼莫地平
- C. 硝普钠
- D. 哌唑嗪
- E. 氢氯噻嗪

46. 对磺胺类过敏的患者慎用的降压药是

47. 主要用于扩张脑血管的药物是

48. 直接扩张动静脉的药物是

【49~51】

- A. 乙酰唑胺
- B. 奥布卡因
- C. 阿托品
- D. 拉坦前列素
- E. 去氧肾上腺素

49. 属于 M 受体阻断剂的药物是

50. 属于 α 受体激动剂的药物是

51. 属于碳酸酐酶抑制剂的药物是

【52~53】

- A. 劳拉西泮
- B. 苯巴比妥
- C. 唑吡坦
- D. 佐匹克隆
- E. 氯美扎酮

52. 仅用于偶发性失眠和暂时性失眠的药物是

53. 血药浓度不受西咪替丁影响的药物是

【54~56】

- A. 多潘立酮
- B. 莫沙必利
- C. 奥美拉唑
- D. 雷尼替丁
- E. 乳酶生

54. 提高阴道内酸度，可用于菌群失调导致的细菌性阴道炎的药物是

55. 会引起男乳女化，并有心脏毒性的药物是

56. 8 岁以下禁用的药物是

【57~59】

- A. 呋塞米
- B. 螺内酯
- C. 氢氯噻嗪
- D. 乙酰唑胺
- E. 氨苯蝶啶

57. 有耳毒性的药物是

58. 影响血脂和血糖的药物是

59. 作用较慢，首日剂量可增加至常规剂量 2~3 倍的利尿药是

【60~61】

- A. 25%~50%葡萄糖注射液
- B. 维生素 B₁
- C. 复方氨基酸（3AA）
- D. 二磷酸果糖
- E. 叶酸

60. 可保持红细胞韧性，改善心肌缺血的药物是

61. 用于治疗脑水肿、颅内压增高的药物是

【62~64】

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸

62. 对细胞内、外的结核杆菌均有作用，属于全效杀菌剂的是

63. 可进入含结核杆菌的巨噬细胞内，与其他抗结核药无交叉耐药性的是

64. 广谱抗菌药，对细胞内外的结核分枝杆菌、麻风杆菌均有抑制作用的是

【65~67】

- A. 多索茶碱
- B. 氨溴索
- C. 沙丁胺醇
- D. 噻托溴铵
- E. 沙美特罗

65. 有镇咳作用的祛痰药是

66. 属于长效 β_2 受体激动剂的药物是

67. 可与吸入型糖皮质激素合用的长效 M 胆碱受体阻断剂是

【68~69】

- A. 非那雄胺
- B. 坦洛新
- C. 他达拉非
- D. 丙酸睾酮
- E. 西地那非

68. 属于 5 α 还原酶抑制剂的是

69. 没有视觉方面不良影响的 5 型磷酸二酯酶抑制剂是

【70~71】

- A. 华法林
- B. 肝素
- C. 达比加群酯
- D. 依达肝素
- E. 利伐沙班

70. 属于凝血因子 X 抑制剂，治疗窗宽，无需监测 INR 的抗凝血药物是

71. 用药期间不能口服奎尼丁的抗凝血药物是

【72~73】

- A. 叶酸
- B. 重组人促红素
- C. 肌苷
- D. 非格司亭
- E. 维生素 B₁₂

72. 可用于肾性、非肾性贫血的药物是

73. 为人的正常成分，可用于白细胞、血小板减少症的是

【74~75】

- A. 奥硝唑
- B. 甲苯咪唑
- C. 吡喹酮
- D. 哌嗪
- E. 噻嘧啶

74. 起效慢，给药数日后才能将虫体排出的抗寄生虫药是

75. 阿米巴病、滴虫病的优选药是

【76~77】

- A. 乙酰唑胺
- B. 氨苯蝶啶
- C. 甘露醇
- D. 螺内酯
- E. 氢氯噻嗪

76. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

77. 主要作用于远曲小管和集合管、直接阻止 Na⁺通道而抑制 Na⁺-K⁺交换，伴有血钾升高的药物是

【78~80】

- A. 卡托普利
- B. 可乐定
- C. 普萘洛尔
- D. 硝普钠
- E. 氢氯噻嗪

78. 因掩盖低血糖症状，合并糖尿病的高血压患者不宜选用的药物是

79. 合并支气管哮喘的高血压患者慎用的药物是

80. 因有中枢镇静作用，驾驶员工作前禁用的降压药是

【81~83】

- A. 低精蛋白锌胰岛素
- B. 正规胰岛素
- C. 预混胰岛素
- D. 地特胰岛素
- E. 赖脯胰岛素

81. 属于速效胰岛素的是

82. 对鱼过敏的患者慎用的药物是

83. 属于短效胰岛素的是

【84~85】

- A. 食管溃疡

- B. 骨关节病变
 - C. 双硫仑样反应
 - D. 肾损害
 - E. 周围神经病和视神经病
84. 利奈唑胺的不良反应是
85. 米诺环素的不良反应是

【86~87】

- A. 长春新碱
 - B. 紫杉醇
 - C. 柔红霉素
 - D. 羟喜树碱
 - E. 伊立替康
86. 因助溶剂聚乙烯醇蓖麻油而导致严重超敏反应的药物是
87. 会引起剂量依赖性迟发型腹泻的药物是

【88~90】

- A. 庆大霉素
 - B. 替加环素
 - C. 多黏菌素
 - D. 环丙沙星
 - E. 利福平
88. 可与核糖体 30S 亚单位结合、而抑制细菌蛋白质合成的药物是
89. 可抑制蛋白质合成全过程，具繁殖期和静止期杀菌作用的药物是
90. 可于扰细菌 DNA 回旋酶或拓扑异构酶 IV，影响细菌 DNA 合成的药物是

【91~93】

- A. 艾塞那肽
 - B. 瑞格列奈
 - C. 利拉鲁肽
 - D. 格列齐特
 - E. 胰岛素
91. 一日 2 次，正餐前 60 min 内给药，餐后不能给药，每次给药剂量固定，不需要根据血糖调节用量的药物是
92. 被称为餐时血糖调节剂，常在餐前 10~15 min 给药是
93. 应激状态如发热、昏迷、手术等必须使用，可于餐前 15~30 min 给药的是

【94~95】

- A. 奥司他韦
 - B. 制霉菌素
 - C. 两性霉素 B
 - D. 滕甲酸钠
 - E. 依立替康
94. 对念珠菌属作用较高，且不易产生耐药性，因毒性大，不易用于注射的药物是
95. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

【96~97】

- A. 头孢他定
- B. 头孢唑啉

- C. 氨曲南
- D. 亚胺培南
- E. 阿奇霉素

96. I 类清洁切口适合选用的药物是

97. 抗菌谱窄，主要针对 G 杆菌的药物是

【98~100】

- A. 麻黄碱
- B. 克罗米通
- C. 阿莫罗芬
- D. 过氧化氢
- E. 阿达帕林

98. 属于 α 受体激动剂的药物是

99. 属于吗啉类抗真菌药物的是

100. 作用于核受体，减少白三烯生成的，不得用于十分严重痤疮治疗的药物是

三、综合分析选择题（共 10 题，每题 1 分。题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或案例背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

【101~104】

血脂异常是动脉粥样硬化和心血管病发病的高危险因素，降低血浆胆固醇、三酰甘油，可降低冠心病、脑卒中事件发生的危险性。

101. TG 在什么范围要积极改变生活方式来调整

- A. ≥ 1.30 mmol/L
- B. ≥ 1.50 mmol/L
- C. ≥ 1.70 mmol/L
- D. ≥ 1.90 mmol/L
- E. ≥ 2.26 mmol/L

102. TG 在什么范围以上应启动药物治疗

- A. 1.30 mmol/L
- B. 1.50 mmol/L
- C. 1.70 mmol/L
- D. 1.90 mmol/L
- E. 2.26 mmol/L

103. 以降 TG 为主要治疗目标的首选药是

- A. 洛伐他汀
- B. 烟酸
- C. 依折麦布
- D. 苯扎贝特
- E. 考来烯胺

104. 具有剂量增加 1 倍疗效增加 6%（“6”规则）特点的药物是

- A. 他汀类
- B. 烟酸类
- C. 贝丁酸类
- D. 多烯不饱和脂肪酸类
- E. 胆固醇吸收抑制剂

【105~107】

高先生，48岁。1型糖尿病患者，应使用胰岛素治疗。

105. 下列可做静脉静注的胰岛素是

- A. 精蛋白锌胰岛素
- B. 地特胰岛素
- C. 低精蛋白锌胰岛素
- D. 普通胰岛素
- E. 甘精胰岛素

106. 不属于胰岛素适应证的是

- A. 重症糖尿病（2型）
- B. 糖尿病合并严重感染
- C. 糖尿病合并酮症酸中毒
- D. 胰岛素抵抗
- E. 口服降血糖药无效的非胰岛素依赖性糖尿病

107. 胰岛素的不良反应有

- A. 低血糖
- B. 酮症酸中毒
- C. 高血糖昏迷
- D. 骨髓抑制
- E. 乳酸血症

【108~110】

患者，男，43岁。体重85 kg，以“多饮，多尿10年”之主诉入院，临床诊断为2型糖尿病伴高血压。

108. 下列药物中用于2型糖尿病一线治疗的首选药物是

- A. 二甲双胍
- B. 瑞格列奈
- C. 格列齐特
- D. 阿卡波糖
- E. 罗格列酮

109. 下列关于降糖药物的作用机制描述错误的是

- A. 促进胰岛β细胞分泌胰岛素
- B. 抑制α-葡萄糖苷酶的活性，减少单糖的吸收
- C. 增加组织对胰岛素的敏感性
- D. 抑制胰高糖素样肽-1受体
- E. 抑制二肽基肽酶-4，促使胰岛素分泌增加，胰高糖素分泌减少

110. 下列描述中，错误的是

- A. 瑞格列奈与二甲双胍有协同作用
- B. 二甲双胍和胰岛素合用于1型糖尿病
- C. 二甲双胍要避免与含碘造影剂合用
- D. 阿卡波糖缓解餐后高血糖作用优于瑞格列奈
- E. 阿卡波糖与其他降糖药合用引起的低血糖可用葡萄糖或蔗糖来纠正

四、多项选择题（共10题，每题1分。每题的备选项中，有2个或3个以上的正确答案，错选或少选均不得分）

111. 关于非甾体抗炎药的说法，正确的是

- A. 儿童禁用阿司匹林退烧，以防发生瑞夷综合征

- B. 心功能不全患者禁用布洛芬
C. 12 岁以下儿童禁用尼美舒利
D. 对磺胺类过敏的患者禁用塞来昔布
E. 有消化性溃疡的患者禁用 COX-2 抑制剂
112. 螺内酯的作用特点有
A. 作用弱，起效缓慢而持久
B. 利尿作用与醛固酮的浓度有关
C. 用于治疗顽固性水肿
D. 与 ACEI 合用可致高血钾
E. 长期服用可致男性乳房发育
113. 以下属于调血脂药的有
A. 烟酸
B. 钙拮抗剂
C. 洛伐他汀
D. 依折麦布
E. 非诺贝特
114. 具有耳毒性的药物有
A. 链霉素
B. 庆大霉素
C. 呋塞米
D. 万古霉素
E. 氯霉素
115. 促凝血药的作用特点包括
A. 维生素 K 能促进 II、VII、IX、X 凝血因子合成，可用于香豆素、水杨酸过量的出血
B. 矛头蝮蛇血凝酶促进血管破损部位的血小板聚集，用药方式多样
C. 氨基己酸用作链激酶、尿激酶过量的止血，对癌症出血、创伤出血、非纤维蛋白溶解出血无效
D. 鱼精蛋白用于肝素过量引起的出血，口服无效，仅限于静脉注射
E. 卡巴克洛作用于毛细血管，增加血管通透性，使受损毛细血管端回缩而促进凝血
116. 顺铂所致肾毒性的应对措施是
A. 用药后及时给予利尿剂
B. 定期监测电解质、肾功能
C. 鼓励患者多饮水，必要时给予碳酸氢钠
D. 加服别嘌醇，抑制尿酸生成
E. 可用于肾功能不全者
117. 下列属于硫脲类引起白细胞减少症监护特点的是
A. 一般发生在用药初始的几个月，应定期监测血象
B. 可同服促白细胞生成药利可君，必要时可合用糖皮质激素
C. 粒细胞减少症一旦发生，应立即停用抗甲状腺药
D. 治愈后的患者不能再用抗甲状腺药治疗甲亢
E. 老人尤其是肾功能减退者，用药量应减少
118. 下列有关皮肤真菌感染治疗药物的描述中正确的是
A. 抗真菌药与糖皮质激素联用时，感染症状消失后即可停用

- B. 中、强效激素不能用于皮肤薄嫩处
- C. 若同时患有手、足癣，必须同进治疗
- D. 保持足、体、股、大腿部的皮肤干燥
- E. 对于有免疫功能缺陷的患者，可选用系统抗真菌药治疗

119. 氟西汀的适应证包括

- A. 强迫症
- B. 癫痫
- C. 神经性贪食症
- D. 抑郁症
- E. 精神分裂症

120. 可用于绝经后乳腺癌的药物有

- A. 托瑞米芬
- B. 氟他胺
- C. 地塞米松
- D. 阿那曲唑
- E. 他莫昔芬

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

【参考答案】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	D	E	C	D	B	C	C	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	C	A	E	D	D	E	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	E	B	E	D	D	D	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	B	D	D	C	A	D	B	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	A	E	C	E	B	C	C	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	C	A	E	A	D	A	C	B	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	A	C	B	B	E	D	A	C	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	B	C	B	A	D	B	C	C	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	A	B	E	A	B	E	B	A	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	B	E	B	C	B	C	A	C	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	E	D	A	D	D	A	A	D	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ABCD	ABCDE	ACDE	ABCD	ABCD	ABCD	ABCDE	BCDE	ACD	ADE

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 老年人对苯二氮草类药物较为敏感，用药后可致平衡功能失调，觉醒后可发生步履蹒跚、思维迟钝等症状，在临床上被称为

- A. 震颤麻痹综合征
- B. 老年期痴呆
- C. “宿醉”现象
- D. 戒断综合征
- E. 锥体外系反应

2. 能引起老年患者共济失调、精神紊乱，但无抗焦虑、抗惊厥作用的镇静催眠药是

- A. 佐匹克隆
- B. 劳拉西洋
- C. 异戊巴比妥
- D. 唑吡坦
- E. 阿普唑仑

3. 选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂中口服吸收较慢的是

- A. 西酞普兰
- B. 帕罗西汀
- C. 舍曲林
- D. 氟西汀
- E. 阿米替林

4. 李女士来到药房咨询，主诉最近服用下列药品后体重有所增加，请药师确认可能增加体重的药品是

- A. 二甲双胍
- B. 辛伐他汀
- C. 米氮平
- D. 阿司匹林
- E. 硝酸甘油

5. NSAID 镇痛抗炎的作用机制是

- A. 减少前列腺素的释放
- B. 抑制环氧酶
- C. 对抗前列腺素的作用
- D. 抑制 MAO
- E. 抑制 AchE

6. 患者，男，30 岁。因上感 3 天，发热 2 小时、肌肉酸痛就诊，查体：T 38.7℃。患者自述对阿司匹林过敏，应选择以下哪种解热镇痛药物

- A. 布洛芬
- B. 萘普生
- C. 塞来昔布
- D. 对乙酰氨基酚
- E. 吲哚美辛

7. NSAID 与下列哪种降压药合用不会降低其降压效果

- A. 卡托普利
- B. 美托洛尔

- C. 缬沙坦
D. 依那普利
E. 硝苯地平
8. 可以降低血尿酸水平，但升高尿酸水平而易导致肾结石的抗痛风药是
A. 秋水仙碱
B. 别嘌醇
C. 丙磺舒
D. 呋塞米
E. 布洛芬
9. 以下关于中枢性镇咳药说法错误的是
A. 妊娠期妇女禁用
B. 可待因的使用必须遵守麻醉药品相关规定
C. 喷托维林禁用于 2 岁以下儿童
D. 胺碘酮可提高右美沙芬的血药浓度
E. 镇咳强弱比较：苯丙哌林 > 喷托维林 > 福尔可定
10. 对伴有大量痰液并阻塞呼吸道的病毒性感冒患者，在服用镇咳药的同时，应及时联合应用的药品是
A. 左氧氟沙星
B. 羧甲司坦
C. 泼尼松龙
D. 多索茶碱
E. 右美沙芬
11. 控制哮喘急性发作的首选药是
A. 白三烯受体阻断剂
B. M 胆碱受体阻断剂
C. β 受体激动剂
D. 磷酸二酯酶抑制剂
E. 抗生素
12. 适合中、重度持续哮喘者的长期的治疗方案是
A. 吸入型糖皮质激素+长效 M 受体阻断剂
B. 长效 β_2 受体激动剂+长效 M 受体阻断剂
C. 长效 β_2 受体激动剂+短效 β_2 受体激动剂
D. 吸入型糖皮质激素+短效 β_2 受体激动剂
E. 吸入型糖皮质激素+白三烯受体阻断剂
13. 当茶碱高于 $20 \mu\text{g/ml}$ ，低于 $40 \mu\text{g/ml}$ 时，可能出现的不良反应是
A. 呼吸停止
B. 高热惊厥
C. 心动过速
D. 心跳骤停
E. 急性心衰
14. 强心苷类药的作用靶点是
A. Na^+ ， K^+ -ATP 酶
B. Na^+ - K^+ - 2Cl^- 同向转运子
C. Na^+ - Cl^- 共转运子

- D. H^+ , K^+ -ATP 酶
E. Na^+ - Ca^{2+} 转运子
15. 以下药物属于抗酸剂的是
A. 铝碳酸镁
B. 西咪替丁
C. 法莫替丁
D. 昂丹司琼
E. 硫酸镁
16. 闪光现象（光幻视）是下列哪种药物常见的不良反应
A. 美托洛尔
B. 福辛普利
C. 伊伐布雷定
D. 达格列净
E. 沙库巴曲缬沙坦
17. 下列哪种药物减少地高辛经肾或肾外的清除率，导致地高辛血药浓度升高的是
A. 胺碘酮
B. 红霉素
C. 螺内酯
D. 维拉帕米
E. 奎尼丁
18. 沙库巴曲缬沙坦最严重的不良反应是
A. 干咳
B. 血管神经性水肿
C. 高血钾
D. 低血压
E. 头晕
19. 降钙素最常见的不良反应是
A. 胸部压迫感
B. 面部潮红
C. 低钠血症
D. 哮喘发作
E. 过敏性休克症
20. 华法林用药期间需通过监测国际标准化比值（INR）来调整用药剂量，用于人造瓣膜患者预防血栓栓塞并发症时，INR 的目标范围是
A. 0.8~1.5
B. 1.8~2.5
C. 2.5~3.5
D. 3.0~4.0
E. 3.8~4.5
21. 目前常用于肾病综合征的抗凝治疗，也可用于心肌缺血诊断试验的药物是
A. 双嘧达莫
B. 西洛他唑
C. 氯吡格雷
D. 阿司匹林

E. 替格瑞洛

22. 完全禁食患者患者的脂肪乳剂应当不低于

- A. 0.1 g/ (kg · d)
- B. 0.2 g/ (kg · d)
- C. 0.3 g/ (kg · d)
- D. 0.4 g/ (kg · d)
- E. 0.5 g/ (kg · d)

23. 以下关于强心苷类药物说法错误的是

- A. 用于心力衰竭的主要治疗获益是减轻症状和改善心功能
- B. 强心苷可透过胎盘屏障进入胎儿体内，因此不可用于妊娠期妇女
- C. 地高辛是唯一被美国 FDA 确认能有效治疗慢性心力衰竭的正性肌力药
- D. 地高辛降低心力衰竭住院率，减少心力衰竭致残率
- E. 急性心力衰竭并非地高辛的应用指征

24. β 受体阻断剂不适用于

- A. 窦性心动过速
- B. 室上性快速心律失常
- C. 转复房颤
- D. 交感神经兴奋相关的室性心律失常
- E. 转复房扑

25. 心绞痛急性发作的首选治疗药物是舌下含化

- A. 美托洛尔
- B. 硝酸异山梨酯
- C. 单硝酸异山梨酯
- D. 戊四醇酯
- E. 硝酸甘油

26. 抗心绞痛的首选治疗方案是 CCB 联合

- A. 洋地黄+长效硝酸酯类
- B. ACEI+地高辛
- C. ACEI+ β 受体阻断剂
- D. ACEI+长效硝酸酯类
- E. β 受体阻断剂+长效硝酸酯类

27. 适用于高血压危象、高血压脑病、恶性高血压等高血压急症的是

- A. 利血平
- B. 甲基多巴
- C. 肼屈嗪
- D. 硝普钠
- E. 哌唑嗪

28. 对于 LDL-ch 未达标的高脂血症患者，首选的治疗药物是

- A. 阿托伐他汀
- B. 非诺贝特
- C. 烟酸
- D. 依折麦布
- E. 考来烯胺

29. 对蛛网膜下隙出血和颅内动脉瘤出血效果较好的抗纤溶药是

- A. 氨基己酸
 - B. 酚磺乙胺
 - C. 维生素 K₁
 - D. 蛇毒血凝酶
 - E. 氨甲环酸
30. 属于糖皮质激素禁忌证的是
- A. 严重高血压
 - B. 过敏性皮炎
 - C. 再生障碍性贫血
 - D. 类风湿关节炎
 - E. 血管神经性水肿
31. 以下不属于雌激素的不良反映的是
- A. 水钠潴留
 - B. 低钙血症
 - C. 体重增加
 - D. 三酰甘油升高
 - E. 糖耐量下降
32. 胆汁酸缺乏患者较易缺乏的维生素是
- A. 维生素 B₆
 - B. 维生素 C
 - C. 烟酸
 - D. 叶酸
 - E. 维生素 K
33. 以下药物中，抗铜绿假单胞菌活性较强的是
- A. 青霉素 V
 - B. 甲氧西林
 - C. 双氯西林
 - D. 阿莫西林
 - E. 哌拉西林
34. 治疗肠道和肠外阿米巴病、阴道滴虫病的首选药物是
- A. 氨基糖苷类抗菌药物
 - B. 大环内酯类抗菌药物
 - C. 硝基呋喃类抗菌药物
 - D. 硝基咪唑类抗菌药物
 - E. 林可霉素类抗菌药物
35. 以下抗结核药是前药的是
- A. 异烟肼
 - B. 利福平
 - C. 对氨基水杨酸钠
 - D. 乙胺丁醇
 - E. 链霉素
36. 在唑类抗真菌药物中，对肝药酶的抑制作用最小，治疗指数最大的是
- A. 咪康唑
 - B. 氟康唑

- C. 酮康唑
D. 伊曲康唑
E. 伏立康唑
37. 以下药品中，属于广谱抗病毒药的是
- A. 利巴韦林
B. 奥司他韦
C. 阿昔洛韦
D. 拉米夫定
E. 齐多夫定
38. 以下抗疟药中，属于二氢叶酸还原酶抑制剂的是
- A. 青蒿素
B. 氯喹
C. 伯氨喹
D. 奎宁
E. 乙胺嘧啶
39. 烷化剂最为常见的不良反应是
- A. 骨髓功能抑制
B. 肝损伤
C. 肾损伤
D. 心脏损伤
E. 皮疹
40. 眼科细菌感染疾病首选的治疗方法是
- A. 口服抗菌药物
B. 局部应用抗菌药物
C. 手术治疗
D. 静脉应用抗菌药物
E. 肌内注射抗菌药物

二、配伍选择题（共 60 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，每题只有一个备选项最符合题意）

【41~44】

- A. β 受体阻断剂
B. 甲氨蝶呤
C. 利福平
D. 阿糖胞苷
E. 肝素

与多柔比星合用或配伍

41. 可增加心脏毒性的药物是
42. 可增加肝毒性的药物是
43. 可导致坏死性结肠炎的是
44. 同用易产生沉淀的是

【45~47】

- A. 伏立康唑
B. 氟胞嘧啶
C. 氟康唑

- D. 灰黄霉素
- E. 特比萘芬
- 45. 治疗侵袭性念珠病首选
- 46. 治疗侵袭性曲霉菌病首选
- 47. 治疗皮肤浅表性癣菌病首选

【48~51】

- A. 羟喜树碱
- B. 来曲唑
- C. 培美曲塞
- D. 卡莫氟
- E. 依托泊苷
- 48. 作用于 DNA 拓扑异构酶 I 的生物碱是
- 49. 属于芳香化酶抑制剂，用于治疗乳腺癌
- 50. 用于治疗小细胞肺癌的首选药物之一
- 51. 属于二氢叶酸还原酶抑制剂的抗肿瘤药是

【52~54】

- A. 瑞格列奈
- B. 格列本脲
- C. 阿卡波糖
- D. 二甲双胍
- E. 格列喹酮
- 52. 降糖作用迅速，被称为“餐时血糖调节剂”的降糖药是
- 53. 2 型糖尿病伴轻、中度肾功能不全者适宜选用的降糖药是
- 54. 单纯饮食控制及体育锻炼无效的 2 型糖尿病肥胖患者首先的降糖药是

【55~56】

- A. 嗜睡乏力
- B. 胰岛素抵抗
- C. 视物模糊
- D. 出血
- E. 骨质疏松
- 55. 西地那非引起的不良反应
- 56. 氢氯噻嗪引起的不良反应

【57~58】

- A. 氢氯噻嗪
- B. 呋塞米
- C. 氨苯喋啶
- D. 甘露醇
- E. 螺内酯
- 57. 可与醛固酮竞争醛固酮受体的药物
- 58. 可直接抑制钠离子选择性通道的药物

【59~60】

- A. 酚磺乙胺
- B. 氨基己酸
- C. 维生素 K₁

D. 血凝酶

E. 卡巴克络

59. 属于促凝血因子合成药的是

60. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

【61~64】

A. 二丙酸倍氯米松

B. 沙丁胺醇

C. 色甘酸钠

D. 可待因

E. 氨茶碱

61. 抑制延脑咳嗽中枢而产生镇咳作用的药物是

62. 用于各种哮喘及急性心功能不全的药物是

63. 兴奋 β_2 受体，解除支气管痉挛的药物是

64. 具有强大的抗炎及免疫抑制作用的，用于哮喘发作的药物是

【65~68】

A. 剧烈疼痛

B. 痛风

C. 癫痫小发作

D. 精神分裂症

E. 风湿性关节炎

65. 丙戊酸钠的临床应用是

66. 芬太尼的临床应用是

67. 吲哚美辛的临床应用是

68. 别嘌醇的临床应用

【69~71】

A. 咪达唑仑

B. 氯美扎酮

C. 夸西泮

D. 氟西泮

E. 水合氯醛

69. 可用于外科手术或诊断检查时诱导睡眠的是

70. 可用于小儿高热、破伤风及子痫引起的惊厥的是

71. 焦虑型、夜间醒来次数较多者适用

【72~73】

A. 乙琥胺

B. 硫酸镁

C. 卡马西平

D. 苯妥英钠

E. 加巴喷丁

72. 长期用药可引起牙龈增生的药物是

73. 治疗伴有精神症状的癫痫的药物是

【74~76】

A. 两性霉素 B

B. 卡泊芬净

- C. 氟胞嘧啶
- D. 阿糖胞苷
- E. 酮康唑

74. 肝毒性大, 对肝药酶影响大, 药物相互作用多的抗真菌药是

75. 制成脂质体以降药物肾毒性的抗真菌药是

76. 与其他抗真菌药无交叉耐药性的棘白霉素类抗真菌药是

【77~79】

- A. 四环素可的松
- B. 利福平
- C. 氯霉素
- D. 曲伏前列素
- E. 碘苷

77. 长期使用可引起青光眼、白内障

78. 可致齿龈出血和感染, 泪液呈橘红色或红棕色

79. 长期使用可出现角膜染色小点或浑浊, 不易消失

【80~81】

- A. 依那普利
- B. 雷米普利
- C. 福辛普利
- D. 卡托普利
- E. 培哚普利

80. 不属于酯类前药的是

81. 经肝肾双通道清除的药物是

【82~85】

- A. 氯喹
- B. 氯喹+伯氨喹
- C. 青蒿素
- D. 乙胺嘧啶
- E. 奎宁

82. 抑制 DNA 的复制和转录, 使 DNA 断裂的抗疟药是

83. 作用于红细胞内期和继发性红细胞外期的药物是

84. 通过产生自由基, 破坏疟原虫的生物膜、蛋白质的抗疟药是

85. 与磺胺类或砒类药物合用可增强疗效、减少耐药性的抗疟药是

【86~89】

- A. 奥司他韦
- B. 阿糖腺苷
- C. 干扰素
- D. 阿昔洛韦
- E. 阿德福韦酯

86. 对 I 型和 II 型单纯疱疹病毒作用最强

87. 静脉注射可以治疗单纯疱疹病毒脑炎, 局部可以用于疱疹病毒性角膜炎

88. 代谢产物为选择性的甲型和乙型流感病毒神经氨酸酶抑制剂

89. 一类强力的细胞因子的蛋白质, 具有抗病毒、调节免疫和抗增生作用的是

【90~92】

- A. 糖皮质激素
- B. 胰岛素
- C. 甲状腺素
- D. 雌激素
- E. 螺内酯

90. 长期使用可引起骨质疏松的是

91. 用于治疗呆小病的是

92. 用量过大可引起低血糖反应的是

【93~94】

- A. 泼尼松龙
- B. 氢化可的松
- C. 地塞米松
- D. 曲安西龙
- E. 米托坦

93. 属于长效糖皮质激素类的药物是

94. 属于短效糖皮质激素类的药物是

【95~97】

- A. 呋塞米
- B. 乙酰唑胺
- C. 氢氯噻嗪
- D. 螺内酯
- E. 氨苯蝶啶

95. 预防急性肾功能衰竭可选用

96. 治疗轻度尿崩症可选用

97. 减少房水生成，治疗青光眼可选用

【98~100】

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 维生素 B₁₂
- C. 肌苷
- D. 阿司匹林
- E. 氯吡格雷

98. 可促进白细胞生长、提高白细胞计数的药物是

99. 被称为心血管事件一、二级预防的“基石”的药物是

100. 与阿司匹林长期大量合用可引起肾脏病变的药物是

三、综合分析选择题（共 10 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

【101~103】

患者，女，48 岁。5 年前患右上肺结核，痰菌阳性，经异烟肼、链霉素和乙胺丁醇治疗 6 个月，痰菌转阴，病灶明显吸收，自行停药，未再随访。近 1 个月来感乏力，2 天前起咳嗽、痰中带血就诊。X 线胸片示右上肺大片致密影，边缘不清，密度不均，高密度病灶部分隐约见有钙化。侧位病变位于肺上叶尖后段，呈团块状，约 4cmx4.5cm 大小，边界毛糙。家庭中近期有人患肺结核，考虑为肺结核复发，给予抗结核药物治疗。

101. 该患者系慢乙酰化者，需要减量的抗结核药是

- A. 异烟肼

- B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 链霉素

102. 患者服药后便尿、唾液、汗液、痰液、泪液等排泄物呈橘红色，这是因为服用哪种抗结核药导致的

- A. 异烟肼
- B. 利福平
- C. 吡嗪酰胺
- D. 乙胺丁醇
- E. 对氨基水杨酸钠

103. 患者入院后诊断为结核性脑膜炎，治疗结核性脑膜炎不宜选用的抗结核药是

- A. 异烟肼
- B. 链霉素
- C. 吡嗪酰胺
- D. 丙硫异烟胺
- E. 环丝氨酸

【104~107】

患者，男性，55岁。以“胡言乱语，精神亢奋，突发肢体抽搐1天”之主诉入院。查体：神智清，双侧瞳孔等大。四肢肌力、肌张力可。病理征阴性。辅助检查：MRI示：左侧颞叶占位性病变。入院第二天（6月12日）于全麻下行开颅肿物切除术。术后生命体征平稳。6月18日停用静脉抗癫痫药，改用口服丙戊酸钠片，于当日晚8时出现癫痫持续状态。医嘱：

治疗用药	用药方法
苯巴比妥注射液 100 mg	肌内注射，每6 h一次
0.9%氯化钠 100 ml +注射用丙戊酸钠 800 mg	静脉滴注，24 h持续泵入
利培酮片 1 mg	口服，2次/日
丙戊酸钠片 200 mg	口服，2次/日
地西洋注射液 10 mg	静脉推注，立即使用
螺内酯胶囊 40 mg	口服，2次/日

104. 患者使用丙戊酸钠需定期监测下列哪项指标

- A. 肾功能
- B. 肌酶
- C. 电解质
- D. 微量元素
- E. 肝功能

105. 患者用药后出现嗜睡现象，可能与下列哪种药物有关

- A. 苯巴比妥
- B. 丙戊酸钠
- C. 利培酮
- D. 螺内酯
- E. 呋塞米

106. 大量使用可导致电解质紊乱的药物是

- A. 利培酮

- B. 螺内酯
- C. 苯巴比妥
- D. 丙戊酸钠
- E. 地西洋

107. 原则上不应作连续静脉滴注，但在癫痫持续状态时例外的药物是

- A. 地西洋
- B. 呋塞米
- C. 苯巴比妥
- D. 螺内酯
- E. 丙戊酸钠

【108~110】

患者，男，56岁，有高血压病史4年。体检：血压156/96 mmHg，无主动脉狭窄。医师处方依那普利控制血压。

108. 该患者若长期服用依那普利片，除应监测血压、心、肾功能外，还应监测的指标是

- A. 血钾
- B. 血钠
- C. 血钙
- D. 血氯
- E. 血镁

109. 该患者用药过程中可能发生的典型不良反应是

- A. 低血糖
- B. 光过敏
- C. 干咳
- D. 水肿
- E. 口干

110. 根据患者病情，合并使用能够减少上述不良反应发生的是

- A. 美托洛尔
- B. 阿司匹林
- C. 氧氟沙星
- D. 甲氧氯普胺
- E. 肝素

四、多项选择题（共10题，每题1分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111. 下列描述中符合质子泵特点及作用的包括

- A. 是一种特殊的酶
- B. 激活后可促进 Na^+ ， K^+ 交换
- C. H^+ 逸出与 Cl^- 结合，形成胃酸
- D. 激活后刺激胃酸分泌
- E. 可激活胃蛋白酶

112. 以下属于钾离子竞争性酸抑制剂特点的有

- A. 可逆性抑制质子泵作用
- B. 口服后起效迅速
- C. 体内代谢慢，具有比PPI持久的胃酸分泌抑制作用
- D. 沃诺拉赞主要由CYP2C19代谢

- E. 沃诺拉赞对质子泵的抑制作用无需酸的激活
113. 硫酸镁具有下列哪些药理作用
- A. 抗消化性溃疡
 - B. 导泻作用
 - C. 利胆作用
 - D. 扩张血管
 - E. 抗惊厥作用
114. 患者，男，59岁。诊断为急性心绞痛，医生处方硝酸甘油片，舌下含服，药师应交代的注意事项包括
- A. 服药时尽量采取坐、卧位
 - B. 口腔粘膜干燥者先用水润湿口腔后再含服
 - C. 服药后可能出现头痛、面部潮红
 - D. 咳嗽是典型的不良反应
 - E. 15分钟内重复给药3次，症状仍不能缓解，应及时就医
115. 卡托普利的的作用机制与下述哪些有关
- A. 减少血管紧张素 II 的形成
 - B. 减少缓激肽失活
 - C. 减少血管紧张素 I 的形成
 - D. 阻断血管紧张素 II 受体
 - E. 抑制肾素活性
116. 下列哪些是氟喹诺酮类的不良反应
- A. 兴奋中枢，诱发癫痫
 - B. Q-T 间期延长
 - C. 加剧重症肌无力风险
 - D. 视网膜脱离
 - E. 永久性周围神经损伤
117. 使用阿达帕林的注意事项包括
- A. 产生严重的刺激反应立即停药
 - B. 避免接触眼、鼻黏膜等
 - C. 有致畸作用，需慎用
 - D. 可与其他维生素 A 类药联合使用
 - E. 可用于湿疹
118. 下列药物中，对厌氧菌有效的包括
- A. 左氧氟沙星
 - B. 替硝唑
 - C. 阿莫西林
 - D. 克拉霉素
 - E. 亚胺培南+西司他丁
119. 在电解质紊乱（低血钾、低血镁）下服用，易引发尖端扭转型室性心律失常的药品有
- A. 阿司咪唑
 - B. 利培酮
 - C. 西沙必利
 - D. 奎尼丁
 - E. 双嘧达莫

120. 与避孕药同时服用容易导致避孕失败的药物是

- A. 利福平
- B. 四环素
- C. 氯霉素
- D. 苯巴比妥
- E. 苯妥英钠

【参考答案】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	C	C	B	D	E	C	E	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	C	A	A	C	C	B	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	B	E	E	E	D	A	E	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	E	E	D	A	B	A	E	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	D	E	C	A	E	A	B	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	A	E	D	C	B	E	C	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	E	B	A	C	A	E	B	A	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	D	C	E	A	B	A	B	E	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	B	C	D	D	B	A	C	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	B	C	B	A	C	B	C	D	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A	B	B	E	A	B	A	A	C	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ABCDE	ABCE	BCDE	ABCE	AB	ABCDE	AB	ABE	ABCD	ABCDE

经典必做500考题-西药二

一、最佳选择题（共 40 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1. 5-羟色胺再摄取抑制剂与单胺氧化酶制剂合用, 出现不安、肌阵挛、多汗、震颤、腹泻、高热、抽搐和精神错乱等不良反应, 严重者可导致死亡的现象称为

- A. “宿醉” 现象
- B. 5-HT 综合征
- C. 锥体外系反应
- D. 戒断反应
- E. 器质性脑综合征

2. 可用于良性抗记忆障碍, 有促进记忆再现和增强记忆保持作用的药物是

- A. 喷他佐辛
- B. 氯米帕明
- C. 吲哚美辛
- D. 尼莫地平
- E. 石杉碱甲

3. 偏头痛、三叉神经痛可用下列哪个镇痛药治疗

- A. 吗啡
- B. 布桂嗪
- C. 哌替啶
- D. 美沙酮
- E. 曲马多

4. 因有发生瑞夷综合征的风险, 儿童感冒发热不宜选用的药物是

- A. 对乙酰氨基酚
- B. 阿司匹林
- C. 布洛芬
- D. 吲哚美辛
- E. 尼美舒利

5. 可能会降低醋酸去氨加压素作用的药物是

- A. 氯丙嗪
- B. 卡马西平
- C. 吲哚美辛
- D. 二甲硅油
- E. 阿米替林

6. 用药期间应配合碳酸氢钠碱化尿液, 多喝水, 促进尿酸排泄的药物是

- A. 阿司匹林
- B. 秋水仙碱
- C. 苯溴马隆
- D. 别嘌醇
- E. 聚乙二醇尿酸酶

7. 可用于减轻季节性过敏性鼻炎相关症状的药物是

- A. M 受体阻断剂
- B. 白三烯受体阻断剂
- C. β_2 受体阻断剂
- D. 磷酸二酯酶抑制剂

- E. β_1 受体激动剂
8. 以下关于镇咳药的说法，错误的是
- A. 苯丙哌林既有中枢性镇咳作用又有外周性镇咳作用
 - B. 喷托维林属于外周性镇咳药
 - C. 右美沙芬与可待因镇咳作用相当
 - D. 可待因首选用于胸膜炎干咳伴胸痛的患者
 - E. 驾驶员工作前禁用镇咳药
9. 关于地芬诺酯的叙述，不正确的是
- A. 用于急慢性功能性腹泻
 - B. 可吸附肠内细菌及有毒气体
 - C. 可提高肠张力，减少肠蠕动
 - D. 长期应用可产生依赖性
 - E. 大剂量镇静作用
10. 下列保肝药在静脉滴注时必须用不含电解质的溶液稀释的是
- A. 门冬氨酸钾镁
 - B. 还原型谷胱甘肽
 - C. 多烯磷脂酰胆碱
 - D. 复方甘草酸苷
 - E. 联苯双酯
11. 可用于长期卧床的老年患者以及妊娠期妇女的泻药是
- A. 甘油
 - B. 硫酸钠
 - C. 乳果糖
 - D. 酚酞
 - E. 比沙可啶
12. 以下降压药会对男性患者产生明显不良反应的是
- A. 福辛普利
 - B. 替米沙坦
 - C. 普萘洛尔
 - D. 甲基多巴
 - E. 吲达帕胺
13. 不耐受他汀类药物的高胆固醇血症患者最适合使用
- A. 吉非贝齐
 - B. 依折麦布
 - C. 阿昔莫司
 - D. 考来烯胺
 - E. 烟酸
14. 溶栓药的使用禁忌证不包括
- A. 活动性内脏出血
 - B. 月经期间
 - C. 主动脉夹层
 - D. 1年内有缺血性脑卒中或脑血管事件
 - E. 颅内肿瘤
15. 能减弱华法林抗凝作用的药物是

- A. 阿司匹林
B. 广谱抗生素
C. 口服避孕药
D. 西咪替丁
E. 胺碘酮
16. 可用于抗流感病毒，吸入给药的是
A. 金刚烷胺
B. 金刚乙胺
C. 奥司他韦
D. 扎那米韦
E. 干扰素
17. 下列关于塞来昔布的描述，错误的是
A. 选择性抑制环氧酶-2 的活性
B. 主要经肝药酶 CYP2C9 代谢
C. 具有磺胺样结构，有类磺胺过敏反应
D. 可预防心脑血管事件
E. 用于缓解手术前、后的急性疼痛
18. 他汀类所引起的肌肉毒性特点不包括
A. 各种他汀类药物都可能引起肌病
B. 脂溶性他汀引起 CK 升高的可能性明显低于水溶性他汀
C. 肌肉毒性可表现为肌肉无力、肌肉疼痛
D. 升高他汀类药物血药浓度的药物相互作用会增加横纹肌溶解的危险性
E. 辛伐他汀、洛伐他汀、阿托伐他汀横纹肌溶解发生率相对较高
19. 华法林的抗凝作用主要受下列哪种肝药酶影响较大
A. CYP1A2
B. CYP2C9
C. CYP2C19
D. CYP2D6
E. CYP3A4
20. 阻止疟原虫在蚊体内增殖，控制传播的药物是
A. 氯喹
B. 青蒿素
C. 伯氨喹
D. 乙胺嘧啶
E. 奎宁
21. 治疗耐药金黄色葡萄球菌所致的感染或 β -内酰胺类过敏患者的 G⁺菌严重感染，首选药物是
A. 替硝唑
B. 万古霉素
C. 克林霉素
D. 红霉素
E. 多黏菌素
22. 长期应用会干扰人体糖原代谢的抗肠蠕虫药是
A. 哌嗪

- B.噻嘧啶
- C.阿苯达唑
- D.吡喹酮
- E.左旋咪唑

23.关于下列抗酸剂的描述，不正确的是

- A.不推荐用抗酸剂缓解非甾体抗炎药相关症状，预防溃疡发生
- B.抗酸药直接中和胃酸
- C.碳酸氢钠属于吸收性抗酸剂
- D.最佳服药时间是餐前
- E.铝碳酸镁可快速、持久发挥抗酸作用，既不腹泻又不便秘

24.眼科手术后引起的细菌性眼内炎应眼内注入

- A.多黏菌素 B
- B.夫西地酸
- C.氧氟沙星
- D.利福平
- E.头孢他啶

25.奥利司他是抑制胃肠道的

- A.淀粉酶
- B.蛋白酶
- C.脂肪酶
- D.纤维素酶
- E.肽酶

26.对超广谱 β -内酰胺酶（ESBLs）稳定的药物是

- A.青霉素 G
- B.阿莫西林
- C.头孢菌素类
- D.氨基糖苷
- E.碳青霉烯类

27.常用于痤疮的治疗，因易引起前庭神经毒性，已不作为脑膜炎治疗药的是

- A.米诺环素
- B.青霉素
- C.氯霉素
- D.多西环素
- E.四环素

28.患者，女，68岁。服用抗菌药物后检查发现跟腱断裂，可能导致跟腱断裂的药物是

- A.克林霉素
- B.美罗培南
- C.环丙沙星
- D.头孢哌酮
- E.阿米卡星

29.深部真菌感染首选，但几乎所有患者均出现不同程度的肾损害，肝肾功能不全者慎用的药物是

- A.特比萘芬
- B.两性霉素 B

- C.灰黄霉素
- D.克念菌素
- E.曲古霉素

30.淋巴瘤患者化疗发生严重的细胞因子释放综合征或肿瘤溶解综合征风险较高的抗肿瘤药是

- A.长春新碱
- B.甲氨蝶呤
- C.环磷酰胺
- D.吉非替尼
- E.利妥昔单抗

31.支气管痉挛性哮喘、症状性低血压禁用的抗心律失常药物是

- A.维拉帕米
- B.普鲁帕酮
- C.米力农
- D.普萘洛尔
- E.毒毛花苷 K

32.防止硝酸酯类产生耐药现象的措施是

- A.首剂减半
- B.选择偏离心脏给药方法
- C.口服应保证 4 h 以上的间歇期
- D.产生耐药的患者应避免联合用药
- E.硝酸酯类加大剂量

33.治疗急性肺水肿或脑水肿宜选用的药物是

- A.氢氯噻嗪
- B.氯噻酮类
- C.呋塞米
- D.氨苯蝶啶
- E.螺内酯

34.属于 5α 还原酶抑制剂，起效慢，不适用于想尽快解决急性症状的药物是

- A.西地那非
- B.普适泰
- C.坦洛新
- D.呋达帕胺
- E.非那雄胺

35.下列药物中，可口服或直肠给药，引起近似生理性睡眠的是

- A.水合氯醛
- B.地西洋
- C.雷美替胺
- D.唑吡坦
- E.扎来普隆

36.替尼泊苷作为常见抗恶性肿瘤药，首选用于治疗

- A.慢性淋巴细胞性白血病
- B.脑瘤
- C.纤维瘤

D.恶性淋巴瘤

E.脂肪瘤

37.直接作用于阿片受体，适用于无痰干咳，尤其是伴有胸痛剧烈干咳的镇咳药物是

A.可待因

B.右美沙芬

C.苯丙哌林

D.喷托维林

E.羧甲司坦

38.能使痰液中糖蛋白多肽链中的二硫键断裂，从而降低痰液的黏滞性，被称为黏痰溶解剂的祛痰药物是

A.溴己新

B.氨溴索

C.厄多司坦

D.羧甲司坦

E.乙酰半胱氨酸

39.应用利妥昔单抗前，应对患者进行基因筛查，筛查的项目是

A.表皮生长因子受体

B.血管内皮生长因子

C.B 淋巴细胞表面的 CD20 抗原

D.雌激素受体

E.人表皮生长因子受体-2

40.对老年人收缩压和舒张压均较高或脉压差较大者，应选用

A.氨氯地平

B.卡托普利

C.坎地沙坦

D.硝普钠

E.美托洛尔

二、配伍选择题（共 60 题，每题 1 分，题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复选用，每题只有一个备选项最符合题意）

【41~43】

A.文拉法辛

B.西酞普兰

C.帕罗西汀

D.多塞平

E.米氮平

41.可用于忧郁型失眠患者的是

42.没有首关消除 SSRI 是

43.可以促进 5-HT 和 NA 释放的抗抑郁药是

【44~45】

A.劳拉西洋

B.苯巴比妥

C.唑吡坦

D.佐匹克隆

E.氯美扎酮

44. 只有镇静催眠作用，用于偶发性失眠的药物是

45. 血药浓度不受西咪替丁影响的药物是

【46~48】

- A. 维生素 D
- B. 25-羟基维生素 D
- C. 1, 25-二羟维生素 D
- D. 骨化三醇
- E. 阿法骨化醇

46. 维生素 D 在血液循环中的主要形式是

47. 维生素 D 在肾脏中被催化成的活性形式是

48. 阿法骨化醇口服经小肠吸收后，在肝内经 25-羟化酶作用转化为

【49~51】

- A. 氢氧化铝
- B. 碳酸氢钠
- C. 碳酸钙
- D. 奥美拉唑
- E. 西咪替丁

49. 与氨基糖苷类合用和会引起呼吸抑制的药物是

50. 长期使用会引起老年患者骨折的药物是

51. 可引起胃内压力增加和便秘的药物是

【52~54】

- A. 福辛普利
- B. 依那普利
- C. 卡托普利
- D. 贝那普利
- E. 赖诺普利

52. 因半衰期较短，需一日给药 2~3 次的是

53. 经肝和肾排泄，肾功能不全时无需调整剂量的是

54. 肝功能损害无需调整剂量的是

【55~57】

- A. 索他洛尔
- B. 利多卡因
- C. 普罗帕酮
- D. 维拉帕米
- E. 普萘洛尔

55. 仅用于室性心律失常的药物是

56. 唯一可降低心脏性猝死而降低总死亡率的药物是

57. 属于 III 类抗心律失常药的是

【58~60】

- A. 依那普利
- B. 尼莫地平
- C. 硝普钠
- D. 哌唑嗪
- E. 氢氯噻嗪

58. 对磺胺类过敏的患者慎用的降压药是

59. 主要用于扩张脑血管的药物是

60. 直接扩张动静脉的药物是

【61~62】

A. 大于 $172 \mu\text{mol/L}$

B. 大于 $265 \mu\text{mol/L}$

C. 大于 6mmol/L

D. 大于 $7 \mu\text{mol/L}$

E. 大于 8mmol/L

需停用 ACEI 的指标

61. 血钾升高至

62. 血肌酐升至

【63~65】

A. 阿替普酶

B. 达比加群酯

C. 氨基己酸

D. 氨己烯酸

E. 奥扎格雷

63. 属于直接凝血酶抑制剂的是

64. 属于抗纤维蛋白溶解药的是

65. 属于溶栓药的是

【66~67】

A. 氯吡格雷

B. 阿司匹林

C. 替罗非班

D. 西洛他唑

E. 肌苷

66. 可使 cAMP 增加, 发挥抗血小板作用的是

67. 有哮喘病史的患者慎用的抗血小板药物是

【68~69】

A. 复方氨基酸注射液 (18AA)

B. 复方氨基酸注射液 (9AA)

C. 复方氨基酸注射液 (6AA)

D. 赖氨酸注射液

E. 丙氨酰谷氨酰胺注射液

68. 属于平衡型氨基酸制剂的是

69. 用于颅脑损伤的氨基酸制剂的是

【70~71】

A. 华法林

B. 肝素

C. 达比加群酯

D. 依达肝素

E. 利伐沙班

70. 属于凝血因子 X 抑制剂, 治疗窗宽, 无需监测 INR 的抗凝血药物是

71. 用药期间不能口服奎尼丁的抗凝血药物是

【72~73】

- A. 达格列净
- B. 罗格列酮
- C. 瑞格列奈
- D. 格列美脲
- E. 二甲双胍

72. 成人最高日剂量为 2.55 g 的口服降糖药是

73. 可促进肾脏对葡萄糖排泄的药物是

【74~75】

- A. 奥硝唑
- B. 甲苯咪唑
- C. 吡喹酮
- D. 哌嗪
- E. 噻嘧啶

74. 蛔虫病、鞭虫病、蛲虫病的首选药物是

75. 阿米巴病、滴虫病的优选药是

【76~77】

- A. 乙酰唑胺
- B. 氨苯蝶啶
- C. 甘露醇
- D. 螺内酯
- E. 氢氯噻嗪

76. 与醛固酮受体竞争性结合，拮抗醛固酮作用的保钾排钠药物是

77. 主要作用于远曲小管和集合管、直接阻止 Na^+ 通道而抑制 Na^+-K^+ 交换，伴有血钾升高的药物是

【78~80】

- A. 卡托普利
- B. 可乐定
- C. 普萘洛尔
- D. 硝普钠
- E. 氢氯噻嗪

78. 因掩盖低血糖症状，合并糖尿病的高血压患者不宜选用的药物是

79. 合并支气管哮喘的高血压患者慎用的药物是

80. 因有中枢镇静作用，驾驶员工作前禁用的降压药是

【81~83】

- A. 甲氧沙林
- B. 地蒾酚
- C. 卡泊三醇
- D. 氯己定
- E. 硼酸

81. 属于呋喃香豆素类增色素药是

82. 用于银屑病，会引起血钙升高的是

83. 属于消毒防腐药，会导致牙齿着色的是

【84~85】

- A. 食管溃疡
 - B. 骨关节病变
 - C. 双硫仑样反应
 - D. 肾损害
 - E. 周围神经病和视神经病
84. 利奈唑胺的不良反应是
85. 米诺环素的不良反应是

【86~87】

- A. 长春新碱
 - B. 紫杉醇
 - C. 柔红霉素
 - D. 羟喜树碱
 - E. 伊立替康
86. 因助溶剂聚乙烯醇蓖麻油而导致严重超敏反应的药物是
87. 会引起剂量依赖性迟发性腹泻的药物是

【88~90】

- A. 洛伐他汀
 - B. 阿替洛尔
 - C. 依折麦布
 - D. 普罗布考
 - E. 考来烯胺
88. 属于胆固醇吸收抑制剂的是
89. 属于抗氧化剂降胆固醇药的是
90. 属于胆汁酸结合树脂的是

【91~93】

- A. 短效口服避孕药
 - B. 长效避孕药
 - C. 事后避孕药
 - D. 阴道杀精药
 - E. 其他妇科用药
91. 去氧孕烯属于
92. 米非司酮属于
93. 壬苯醇醚属于

【94~95】

- A. 奥司他韦
 - B. 制霉菌素
 - C. 两性霉素 B
 - D. 膦甲酸钠
 - E. 依立替康
94. 对念珠菌属作用较高，且不易产生耐药性，因毒性大，不易用于注射的药物是
95. 深部真菌感染首选药，静脉滴注用于真菌性肺炎、心内膜炎的药物是

【96~97】

- A. 凝胶剂可黏附在角膜表面，滞留液体，凝胶被泪液中盐分破坏，释放出水分

- B.具有亲水性和成膜性，起到人工泪液作用
- C.促进细胞能量代谢，改善组织营养，刺激细胞再生，促进组织修复
- D.促进角膜上皮细胞再生，缩短受损角膜愈合时间
- E.抑制血管内皮生长因子（VEGF）与受体的结合

96.卡波姆用于干眼症的作用机制是

97.小牛血去蛋白提取物用于干眼症的作用机制是

【98~100】

- A.麻黄碱
- B.克罗米通
- C.制霉菌素
- D.过氧化氢
- E.吡哌菁绿

98.属于 α 受体激动剂的药物是

99.属于多烯类抗真菌药物的是

100.眼科独有的诊断用药的药物是

三、综合分析选择题（共10题，每题1分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开，每题的备选项中，只有一个最符合题意）

【101~103】

患儿，女，8岁。体重30kg，以“双下肢皮疹3天”之主诉入院，临床诊断“过敏性紫癜”。入院查体：双下肢可见散在皮疹，主要分布于双侧脚踝、足背、小腿及膝盖部位皮肤，皮疹大小不一，高出皮面，伴有疼痛。人白介素-8 187.0 pg/ml，嗜酸性粒细胞百分比7.6%。1个月前曾患“扁桃体炎”。医嘱：

注射用氢化可的松琥珀酸钠 75 mg 静脉滴注，2次/日；

注射用头孢曲松钠 1 g 静脉滴注，1次/日；

维生素D钙咀嚼片 2片口服，1次/日；

注射用磷酸肌酸钠 1000 mg 静脉滴注，1次/日。

101.该患儿同时服用维生素D是因为

- A.预防长期使用糖皮质激素导致的血钠升高
- B.预防长期使用糖皮质激素导致的血脂升高
- C.预防长期使用糖皮质激素导致的钙流失
- D.预防长期使用糖皮质激素导致的消化道溃疡
- E.预防长期使用糖皮质激素导致的诱发二重感染

102.糖皮质激素的禁忌证不包括

- A.严重精神病史
- B.活动性消化道溃疡
- C.骨折
- D.创伤修复期
- E.高钾血症

103.氢化可的松的使用注意事项不包括

- A.妊娠及哺乳期妇女慎用
- B.频繁使用可引起继发感染
- C.肝功能不全者禁用
- D.长期使用可发生低血钙
- E.儿童宜尽量选择小剂量

【104~106】

患者，男，32岁。近2月咳嗽、咳痰，午后低热。伴面颊潮红，疲乏无力，盗汗，诊断为肺结核。

104.最适合该患者的首选治疗药物是

- A.对氨基水杨酸
- B.吡嗪酰胺
- C.利福平
- D.异烟肼
- E.乙胺丁醇

105.异烟肼的作用机制为

- A.抑制微生物的DNA依赖性RNA多聚酶
- B.抑制分枝杆菌酸的合成
- C.与 Mg^{2+} 结合，干扰细菌RNA合成
- D.抑制二氢叶酸合成酶
- E.进入含有结核杆菌的巨噬细胞内杀菌

106.使用异烟肼的注意事项是

- A.慢乙酰化者较易产生不良反应
- B.肾功能减退者慎用
- C.大剂量使用可使维生素 B_2 大量流失
- D.不易通过胎盘，妊娠期妇女可以正常使用
- E.服药后便尿、唾液可显橘红色

(三)

患者，女，19岁，淋雨后受凉出现咳嗽、咳脓性痰，并伴有胸痛，发热 $39^{\circ}C$ ；双肺可闻及湿罗音；WBC $13 \times 10^9/L$ 。该患者对青霉素过敏。医生诊断为社区获得性肺炎。

107.根据诊断结果，优先选择的治疗药物为

- A.青霉素G
- B.链霉素
- C.左氧氟沙星
- D.头孢呋辛
- E.布地奈德

108.以上所选药物禁用于

- A.高血压患者
- B.痛风患者
- C.贫血患者
- D.65岁以上老年人
- E.18岁以下青少年

109.该药物若用于老年人，最有可能发生的不良反应

- A.肌腱炎
- B.癫痫
- C.血糖紊乱
- D.光敏性皮炎
- E.胃肠道反应

110.患者所用药物，属于

- A. β -内酰胺类-青霉素类

- B. 氨基糖苷类
- C. 氟喹诺酮类
- D. β -内酰胺类-头孢菌素类
- E. 糖皮质激素

四、多项选择题（共 10 题，每题 1 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，错选、少选均不得分）

111. 下列关于非甾体抗炎药的用药监护，说法正确的是

- A. 服药期间应禁酒
- B. 尽量选择最小剂量和疗程
- C. 对磺胺类药物过敏的患者可选用昔布类药物
- D. 有胃肠道病史者倾向选用选择性 COX-2 抑制剂
- E. 避免同时使用两种及以上 NSAIDs

112. 为预防由紫杉醇所致的超敏反应，常规使用

- A. 糖皮质激素
- B. 抗组胺药
- C. 组胺 H_2 受体阻断剂
- D. 维生素 C
- E. 复合维生素 B

113. 洛伐他汀与下列哪些药物合用，会使其代谢减慢，以致出现肌肉疼痛等严重不良反应

- A. 克拉霉素
- B. 异烟肼
- C. 利福平
- D. 西咪替丁
- E. 胺碘酮

114. 下列药物中，用于心衰患者，可改善心血管重构，延缓心衰进展的是

- A. 地高辛
- B. 依那普利
- C. 呋塞米
- D. 卡维地洛
- E. 普萘洛尔

115. 长期过量应用可导致出血的药物是

- A. 华法林
- B. 阿司匹林
- C. 链激酶
- D. 利伐沙班
- E. 氨甲环酸

116. 关于双嘧达莫，说法正确的是

- A. 有导致低血压的风险
- B. 属于直接凝血酶抑制剂
- C. 目前常用于心肌缺血的诊断实验
- D. 有冠脉窃血的不良反应
- E. 静脉滴注需避光

117. 下列属于口服避孕药不良反应的是

- A. 血钙降低

- B. 类早孕反应
- C. 月经失调
- D. 血栓
- E. 妊娠斑

118. 关于雷洛昔芬，说法正确的是

- A. 属于雌激素受体调节剂
- B. 与依普利酮属于同一类药物
- C. 用于绝经期超过 2 年以上的女性患者
- D. 有静脉血栓风险
- E. 有子宫内膜增生风险

119. 关于肺结核的药物治疗，下列说法正确的是

- A. 异烟肼是各类型结核病的首选药
- B. 化学治疗的第二阶段为强化期，一般为 2 个月
- C. 利福平治疗过程中会引起橘红染
- D. 足量、足疗程
- E. 异烟肼、利福平应早餐前空腹顿服

120. 容易发生“双硫仑样反应”的药物是

- A. 头孢他定
- B. 头孢曲松
- C. 呋喃唑酮
- D. 甲硝唑
- E. 氯霉素

参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	B	B	D	C	B	B	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	B	B	C	D	D	B	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	D	E	C	E	A	C	B	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	C	E	A	B	A	E	C	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	B	E	C	A	B	C	D	E	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	C	A	E	B	E	A	E	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	B	B	C	A	D	B	A	D	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	E	A	B	A	D	B	C	C	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	C	D	E	A	B	E	C	D	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	C	D	B	C	A	C	A	C	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	E	C	D	B	A	C	E	A	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
ABDE	ABC	ABDE	BD	ABCD	ACDE	BCDE	ACD	ACE	BCDE