

2019 年口腔实践技能考试密押卷

第五站 案例分析

试题编号:001

【病例摘要 1】

患者，男，27 岁，右上前牙有黑点 3 个月余，现到我院就诊。3 个月

前刷牙时发现上前牙两牙间有黑点，但无任何不适。口内见右上 2 近中面有褐色斑块，探针探查探到粗糙面，但无龋洞。X 线牙片显示：牙面表浅处有透射影像。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 2】

患者，男，47 岁，下唇有白色斑块 3 个月余。3 个月前患者发现下唇右侧有白色斑块，擦不掉，无疼痛，无明显隆起，未发生过溃疡。有大量吸烟史，全身其他系统无异常。下唇右侧唇红中外 1/3 处有 1 个 2 mm 直径的白色斑块，无法擦去，无触痛，不隆起，基底软，无硬结，周边不红。口内其他检查无异常。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 3】

患者，男，18 岁，右下后牙肿痛、张口困难 2 天。右下后牙近 2d 疼痛明显，张口困难，右下颌肿胀，口腔异味，头痛，发热。半年来右下后牙反复肿痛，影响进食。右下 8 萌出不全，前倾阻生，有盲袋，远中龈瓣明显红肿，盲袋内有脓性分泌物及食物残渣，张口受限（张口度 1cm），右侧下颌角区明显肿胀，右下颌下淋巴结肿大，触诊疼痛。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 4】

患者，男，19 岁，左上前牙因跌倒受伤 2 天。2 天前因打球时不慎跌倒，上前牙受伤，疼痛明显，牙齿部分缺损，影响进食。左上 1 牙折断达冠长的 2/3，松动（-），叩诊（+），牙髓外露。张闭口及咬合关系正常。上前牙牙槽骨无异常松动。X 线片示无根折。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 5】

患者，男性，54 岁，干部，右上后牙咬合刺激痛 1 个月余。1 个月以来，右上后牙咬合时刺激痛明显，冷热食物加剧，尚未感觉自发痛及夜间痛。右上 67 牙重度磨耗，牙本质暴露，咬合面探痛明显，未见龋坏及牙体隐裂。牙髓活力测试正常，X 线示牙周及根尖周未见明显异常。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 6】

患者，男，44 岁，左侧上颌牙剧烈疼痛 4 天。4 天前自觉左侧上颌牙

自发性、阵发性剧烈疼痛，并放射到左侧颞部，遇冷热刺激疼痛加剧，夜间尤甚。昨天开始出现跳痛，不能睡眠。口服索米痛片（去痛片）

0.5 g，痛时服，效果不明显。2 个月前左侧上颌牙遇冷热刺激疼痛，无自发痛。颌面部无肿胀，张口无受限。左上 7 远中邻舌面龋坏，探

探

诊有深龋洞，探痛明显，有穿髓点。叩诊微痛，牙龈不红肿，牙齿不松动，无牙周炎，热刺激疼痛加剧，且刺激去除后疼痛持续较长时间。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 7】

- 1.患者，男，27 岁。
- 2.主诉：右上前牙有黑点 3 个月余。
- 3.现病史：3 个月前刷牙时发现上前牙两牙间有黑点，但无任何不适。
- 4.口腔检查：视诊见 2 近中面有褐色斑块，探针探查探到粗糙面，
但无龋洞。
- 5.X 线片：牙面表浅处有透射影像。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 8】

患者，女，36 岁。1 个月前发现上前牙有黑点，无任何不适。检查 1 远中邻面有一黑点，表面粗糙，叩诊 (-)，探诊 (-)，冷，未探及明显龋洞。全口牙龈红肿，有刷牙出血史，探诊出血，无附着丧失。X 线片显示 1 邻面有透射区。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 9】

- 1.患者，女，30 岁。
- 2.主诉：右上后牙进食后酸痛 1 个月余。
- 3.现病史：1 个月前进食甜、酸、过冷或过热饮食时，右上后牙出现酸痛，停止进食酸痛即刻消失，无自发痛。
- 4.口腔检查：6 牙合面中央窝可见一龋洞，探针探查洞底有酸痛感，停止探诊酸痛即刻消失，未探及穿髓孔。
- 5.X 线片：龋洞透射影像底部距牙髓腔较远。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 10】

患者，男，25 岁。主诉：右上后牙冷热不适 1 周余。检查：7 窝沟深染，可探入，稍敏感，质软，深达牙本质浅层。冷热测同对照牙，冷水入洞敏感，叩痛 (-)，松 (-)。牙龈红肿，探诊出血，无附着丧失，无牙松动。X 线片显示透射区离髓腔较远。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 11】

- 1.患者，女，43 岁。
- 2.主诉：右上后牙进食时疼痛明显 1 周。
- 3.现病史：近 1 周来右上后牙疼痛，进食时更明显，无自发痛。
- 4.既往史：近 2 个月来右上后牙刷牙、进食、饮冷热水时酸痛，其他无异常。
- 5.口腔检查：7 近中邻面牙体变色，探诊有深龋洞，探诊洞底酸痛明显，刺激消除疼痛消失，未探及穿髓孔。
- 6.X 线片：龋洞透射影像未达髓腔。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 12】

患者，女，56 岁。近 2 周来右下后牙疼痛，进食更明显，无自发痛。检查见 7 邻面龋洞，深达牙本质深层，探诊敏感，去净腐质未见穿髓孔，冷测同对照牙，入洞后疼痛，去除刺激立即消失，叩痛 (-)。656 缺失。X 线片显示 7 邻面透射区，根尖周未见异常。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 13】

- 1.患者，男，68 岁。2.主诉：全口多个牙有洞 2 个月，求补。
- 3.现病史：近 2 个月口腔内多个牙有洞，刷牙、进食、饮冷热水时酸痛。
- 4.既往史：半年前曾因“鼻咽癌”做过颌面颈部放射治疗。
- 5.口腔检查：全口牙齿牙颈部广泛环状浅到中龋，探诊酸痛，无自发痛。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 14】

患者，女，59 岁。近 1 个月来全口多个牙有洞，进食、饮冷热水时疼痛，无自发痛。半年前曾因“鼻咽癌”做过颌面颈部放射治疗。检查见全口牙颈部有龋坏，探诊 (+)，56 缺失。X 线片可见根尖无明显异常。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 15】

- 1.患者，男，54 岁，干部。
- 2.主诉：右上后牙咬合刺激痛 1 个月余。
- 3.现病史：1 个月以来，右上后牙咬合时刺激痛明显，饮冷、热水时加剧，尚未感觉自发痛及夜间痛。
- 4.既往史：无特殊。
- 5.全身情况：无。
- 6.家族病史：无特殊。
- 7.检查：76 牙重度磨耗，牙本质暴露，咬合面探痛明显，未见龋坏及牙体隐裂，牙髓活力测试正常，X 线片显示牙周及根尖周未见明显异常。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 16】

患者，男，47 岁。右下后牙咬物不适、疼痛，冷热测异常。检查可见 6 牙本质暴露，探痛明显，6 缺失，7 三周前在某院做过治疗，现充填物脱落。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 17】

患者，女，36 岁。右上后牙 1 天前出现自发性、阵发性剧痛，向右耳颞部放散，夜间疼痛明显。检查：7 牙合面深龋洞，近髓腔，探痛（+），冷测敏感，疼痛持续约 1 min，并可向耳颞部放散，叩（-）。7 远中牙龈红肿，探痛明显，下方可探及 8。X 线片显示 7 龋损达牙本质深层近髓，8 牙龈红肿，点彩消失，无脓液溢出近中阻生。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 18】

- 1.患者，男，44 岁。
- 2.主诉：左侧上颌牙剧烈疼痛 4 天。
- 3.现病史：4 天前自觉左侧上颌牙自发性、阵发性剧烈疼痛，并放射到左侧颞部，遇冷热刺激疼痛加剧，夜间尤甚。昨天开始出现跳痛，不能睡眠。口服索米痛片（去痛片）0.5 g，痛时服，效果不明显。
- 4.既往史：2 个月前左侧上颌牙遇冷热刺激疼痛，无自发痛。
- 5.口腔检查：颌面部无肿胀，张口无受限。7 远中邻舌面龋坏，探诊有深龋洞，探痛明显，有穿髓点。叩诊微痛，牙龈不红肿，牙齿不松动，无牙周炎，热刺激疼痛加剧，且刺激去除后疼痛持续较长时间。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 19】

- 1.患者，女，53 岁。
- 2.主诉：左侧上颌牙进食后剧烈疼痛 1 周。
- 3.现病史：近 1 个月来左侧上颌牙进食后疼痛明显，经刷牙或漱口后缓解，平时自觉隐痛。近 1 周进食后疼痛明显加剧，但可缓解。曾在本单位医务室检查，发现有“龋洞”，遂来处理。
- 4.口腔检查：5 近中邻面深龋洞，探诊疼痛明显，去尽龋坏组织可见穿髓孔。叩诊疼痛（+），牙龈无异常。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

【病例摘要 20】

患者，男，35 岁。左侧后牙疼痛 1 周。检查可见 6 深龋露髓，探诊疼痛，质软，热刺激疼痛，54 牙颈部缺损，探诊敏感，6 残冠，X 线显示 6 根管充填完善。

【答题要求】

- (1) 诊断
- (2) 诊断依据
- (3) 鉴别诊断
- (4) 治疗原则

作答区：

更多资料扫码领取

