

2022年临床医师资格执业押题

第一单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 下列不属于短骨者的是
A. 月骨
B. 钩骨
C. 髌骨
D. 骰骨
E. 距骨
- 下列关于睾丸的描述正确的是
A. 位于阴囊内,属外生殖器
B. 前缘游离,后缘附有系膜及附睾
C. 完全被包裹在睾丸鞘膜囊内
D. 睾丸小叶的间质细胞可分泌男性激素
E. 以上均对
- 疫苗接种记录依法应保存的最低年限是
A. 3年
B. 5年
C. 2年
D. 1年
E. 4年
- 根据传染病防治法的规定,以下哪一项不属于医疗机构的职责
A. 传染病病例报告
B. 传染病医疗救治
C. 对拒绝隔离的患者采取强制措施
D. 防治医源性感染
E. 防止院内感染
- 根据《传染病防治法》规定,需按照甲类传染病采取预防控制措施的乙类传染病是
A. 疟疾
B. 肺炭疽
C. 登革热
D. 梅毒
E. 肺结核
- 长期食用甲基汞的人群易得哪种疾病
A. 痛痛病
B. 四日市喘息
C. 水俣病
D. 霍乱
E. 伤寒
- 可用于描述两连续型变量之间相关关系的统计图
A. 散点图
B. 圆图
C. 直条图
D. 直方图
E. 线图
- 在流行病学研究中,由因向果的研究为
A. 病例对照研究
B. 筛检
C. 生态学研究
D. 队列研究
E. 现况研究
- 下列关于膀胱的描述正确的是
A. 空虚时呈圆形物人医考原、创E总整理
B. 可分为前面,后面及两下外侧面
C. 其壁由黏膜、肌层和外膜三层组成
D. 空虚时,所有部位的黏膜可形成许多不规则的皱襞
E. 黏膜上皮为立方上皮
- 主动脉的第一个分支为
A. 气管动脉
B. 无名动脉
C. 左颈总动脉
D. 冠状动脉
E. 肋间动脉
- 导致苯丙酮尿症发病的苯丙氨酸羟化酶缺乏的部位
A. 肝细胞
B. 脑细胞
C. 甲状腺
D. 血细胞
E. 肾组织
- 胆汁酸合成的关键酶是
A. 3-羟化酶

- B. 6a羟化酶
- C. 5a羟化酶
- D. 4羟化酶
- E. 7a羟化酶

13. 医师对同一个患者申请一天备血达到或超过一定数量时, 必须报医院医务部门批准该血量是

- A. 1600ml
- B. 1400ml
- C. 800ml
- D. 1000ml
- E. 1200ml

14. 每次开处方, 每张处方所包含的药品种类上限为

- A. 5种
- B. 3种
- C. 6种
- D. 4种
- E. 7种

15. 为提高医务人员对患者识别的准确性, 医院管理中强调必须严格执行"三查七对"制度, 其中的三查是

- A. 开方查、配药查、输液查
- B. 门诊查, 取药查, 发药查
- C. 操作前查, 操作中查, 操作后查
- D. 开方查、取药查、发药查
- E. 门诊查、住院查、出院查

16. 对药物毒性反应叙述正确的是

- A. 毒性反应不可避免
- B. 与药物蓄积无关
- C. 是一种较为严重的药物反应
- D. 其发生与药物选择性低有关
- E. 毒性反应一般不可预知

17. 氨基糖苷类抗生素的不良反应是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 耳蜗听神经损伤
- C. 肝毒性
- D. 心脏毒性
- E. 消化道反应

18. 抗甲状腺药物最严重的不良反应是

- A. 甲状腺肿大
- B. 永久性甲减
- C. 肝功能损伤
- D. 肾功能损伤
- E. 粒细胞减少

19. 乳腺癌侵及Cooper韧带, 可导致

- A. 皮肤凹陷
- B. 橘皮样变

- C. 卫星结节
- D. 铠甲状癌
- E. Paget病

添加老师微信: j y j q q 6 6 6

20. 三羧酸循环的生理意义

- A. 合成胆汁酸
- B. 提供能量
- C. 提供NADPH
- D. 参与酮体代谢
- E. 参与蛋白代谢

21. 人体合成尿素的主要器官是

- A. 脑
- B. 肌组织
- C. 肾
- D. 肝
- E. 心

22. 决定血浆pH(值) 最重要的缓冲对是

- A. $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
- B. $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
- C. $\text{K}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$
- D. $\text{NaHPO}_4/\text{NaH}_2\text{PO}_4$
- E. 蛋白质钠盐/蛋白质

23. 所产生毒素与噬菌体有关的细菌

- A. 大肠埃希菌
- B. 军团菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 流感嗜血杆菌
- E. 白喉棒状杆菌

24. 引起菌群失调症的原因是

- A. 正常菌群的遗传特性明显改变
- B. 正常菌群的耐药性明显改变
- C. 正常菌群的增殖方式明显改变
- D. 正常菌群的组成和数量明显改变
- E. 大量使用生态制剂

25. 免疫缺陷患者不可接种的疫苗是

- A. 灭活脊髓灰质炎疫苗
- B. 流行性出血热疫苗
- C. 麻疹活疫苗
- D. 多糖疫苗
- E. 重组乙型肝炎疫苗

26. 下列哪项为筛检的目的

- A. 对可疑病人进行确诊
- B. 评价筛检试验的敏感度
- C. 验证病因
- D. 评价筛检试验的特异度

E. 从表面健康的人群中查出某病的可疑患者成某病的高危人群

27. 属于现况研究特点的是

- A. 可确定因果关联
- B. 随访观察
- C. 人为施加干预措施
- D. 不需设立对照组
- E. 随机分组

28. Ⅰ型超敏反应导致的疾病是

- A. 青霉素过敏性休克
- B. 新生儿溶血病
- C. 接触性皮炎
- D. 食物过敏性腹泻
- E. 花粉过敏性哮喘

添加老师微信: jyjqq666

29. T细胞分化成熟的场所是:

- A. 骨髓
- B. 淋巴结
- C. 胸腺
- D. 脾脏
- E. 黏膜淋巴组织

30. 甘油三酯合成的基本原料是

- A. 胆固醇酯
- B. 胆碱
- C. 甘油
- D. 胆固醇
- E. 鞘氨醇

31. 关于血浆蛋白生理功能的叙述, 哪项是错误的

- A. 运输物质
- B. 缓冲PH
- C. 参与机体的免疫功能
- D. 参与生理止血功能
- E. 形成胶体渗透压, 维持细胞内外水平衡

32. 下述各肌中, 既能屈髋又能伸膝的是

- A. 半腱肌
- B. 半膜肌
- C. 缝匠肌
- D. 股二头肌
- E. 股四头肌

33. 与细菌耐药性有关的结构是

- A. 性菌毛
- B. 细菌染色体
- C. 质粒
- D. 鞭毛
- E. 异染颗粒

34. 属于癌前病变的是

- A. 大肠腺瘤
- B. 皮下脂肪瘤
- C. 乳腺纤维腺瘤
- D. 子宫平滑肌瘤
- E. 子宫肌瘤

35. 宫颈癌最常见的组织类型是

- A. 高分化鳞癌
- B. 中分化鳞癌
- C. 低分化鳞癌
- D. 高分化腺癌
- E. 低分化腺癌

36. DIC患者最初常表现为

- A. 少尿
- B. 出血
- C. 呼吸困难
- D. 贫血
- E. 嗜睡

37. 下列哪种疾病可引起左心室后负荷增大

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 严重贫血
- C. 心肌炎
- D. 心肌梗死
- E. 高血压病

38. 休克初期发生的急性肾功能衰竭是由于

- A. 肾灌注不足
- B. 持续性肾缺血
- C. 肾毒素作用
- D. 急性肾小管坏死
- E. 输尿管阻塞

39. 最能反映医患关系性质的是医务人员与患者之间的

- A. 信托关系
- B. 陌生人关系
- C. 主动-被动关系
- D. 类似父子或母子关系
- E. 商品关系

40. 根据有无暴露某因素史分组的研究是

- A. 现况研究
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 实验流行病学研究
- E. 临床试验

41. 属于实验设计原则的是

- A. 随机化原则
- B. 任意原则

- C. 一次性原则
- D. 配伍原则
- E. 以上都不是

42. 慢性苯中毒时不出现下列哪项临床表现

- A. 类神经症
- B. 中性粒细胞浆内中毒颗粒明显减少
- C. 白细胞减少
- D. 血小板减少
- E. 贫血

43. 下列属于新斯的明的药理作用是

- A. 激活胆碱酯酶
- B. 激活M受体
- C. 抑制胆碱酯酶
- D. 阻断M受体
- E. 激动N受体

44. 有机磷酸酯类中毒症状中, 不属于M样症状的是:

- A. 瞳孔缩小
- B. 流涎流泪
- C. 腹痛腹泻
- D. 小便失禁
- E. 肌肉震颤

45. 治疗严重房室传导阻滞宜选用:

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 异丙肾上腺素
- D. 阿托品
- E. 氨茶碱

46. 相对于一般契约关系而言, 医生在医患关系中负有重要的义务, 但这些义务中不包括

- A. 披露义务
- B. 忠实义务
- C. 监督义务
- D. 保密义务
- E. 注意义务

47. 手术中一般病人知情权不包括

- A. 有权自主选择
- B. 有同意的合法权利
- C. 有明确决定的理解力
- D. 有家属代为决定的权利
- E. 有做出决定的认知力

48. 临床预防服务的主要内容不包括

- A. 化学预防
- B. 筛查
- C. 健康咨询
- D. 免疫接种

E. 药物治疗

49. 为尽量发现病人, 在制订筛选方法标准过程中, 常采用

- A. 提高方法的灵敏度
- B. 提高方法的特异度
- C. 降低假阳性率
- D. 提高假阴性率
- E. 使假阴性率与假阳性率接近

50. 血浆蛋白浓度降低所致水肿的原因是

- A. 血浆胶体渗透压降低
- B. 动脉血压升高
- C. 毛细血管壁通透性增加
- D. 淋巴回流量减少
- E. 组织液静水压升高

51. 心动周期中左室容积最大的时期是:

- A. 快速射血期末
- B. 快速充盈期末
- C. 减慢射血期末
- D. 减慢充盈期末
- E. 房缩期末

52. 观察某种新研制甲肝疫苗的预防效果, 研究对象最好选择

- A. 甲肝高发区无免疫人群
- B. 医院中非肝病区患者
- C. 甲肝低发区无免疫人群
- D. 医院中血制品接触者
- E. 近期曾有甲肝暴发地区的人群

添加老师微信: jyjqq666

53. 反映均数抽样误差大小的指标是

- A. 变异系数
- B. 标准误
- C. 均数
- D. 标准差
- E. 全距

54. 65岁以上老人进行膳食咨询不适宜的是

- A. 饮食多样性
- B. 少盐多糖
- C. 每天饮用牛奶
- D. 饮食清淡
- E. 适量饮用动物食品

55. 衡量某病和某暴露因素间联系强度的最佳指标是

- A. 暴露者的发病率
- B. 暴露者的死亡率
- C. 暴露者的致残率
- D. 相对危险度
- E. 特异危险度

56. 属于乳腺癌特殊类型的是
- A. 浸润性导管癌
 - B. 导管原位癌
 - C. 浸润
 - D. 小管癌
 - E. 小叶原位癌
57. 诊断羊水栓塞的主要病理依据是
- A. 肺泡腔内透明膜形成
 - B. 肺泡腔内有胎粪小体
 - C. 肺泡腔内广泛出血
 - D. 肺血管内有角化上皮
 - E. 微循环内透明血栓
58. 具备下列条件的可以参加执业医师资格考试：具有高等学校医学专科学历，在医疗、预防、保健机构中试用期满
- A. 6个月
 - B. 18个月
 - C. 一年
 - D. 二年
 - E. 三年
59. 医师注册后应当由卫生行政部门注销注册的情形之一是
- A. 受罚款行政处罚
 - B. 受警告行政处罚
 - C. 受责令暂停六个月执业活动的行政处罚
 - D. 中止医师执业活动满一年的
 - E. 受吊销执业证书行政处罚的
60. 以下情形中，可以参加执业医师资格考试的是
- A. 有医学专科学历，在医疗机构中工作满一年
 - B. 有医学专科学历，在医疗机构中试用期满二年
 - C. 有医学专科学历，在医疗机构中工作满二年
 - D. 取得执业医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中工作满二年
 - E. 取得执业医师执业证书后，具有医学专科学历，在医疗机构中试用期满二年
61. 医生在诊疗过程中经常对患者使用医学专业术语，使患者难以理解，容易造成误解。这种医患交流的问题属于
- A. 回忆不良
 - B. 沟通障碍
 - C. 信息缺乏
 - D. 同情不够
 - E. 依从性差
62. 按一定的练习程序，学习有意识地控制或调节自身的心理生理活动，以降低机体唤醒水平，调整因紧张刺激而紊乱的功能，这种疗法称为
- A. 系统脱敏法
 - B. 厌恶疗法
 - C. 条件操作法
 - D. 模仿疗法
 - E. 放松训练法
63. 为保证材料真实，也为了维护心理治疗本身的声誉及权威性。因此心理治疗要坚持
- A. 真诚原则
 - B. 耐心原则
 - C. 保密原则
 - D. 中立原则
 - E. 回避原则
64. 血源性肺脓肿的最常见病原体是：
- A. 厌氧菌
 - B. 金黄色葡萄球菌
 - C. 铜绿假单胞菌
 - D. 肺炎链球菌
 - E. 表皮葡萄球菌
65. 可强效杀伤肿瘤细胞的免疫细胞是
- A. CD4+Th细胞
 - B. CD8+CTL 细胞
 - C. 树突状细胞
 - D. NK细胞
 - E. B细胞
66. 细菌内毒素的特征是
- A. 只有革兰阴性细菌产生
 - B. 少数革兰阴性细菌产生
 - C. 细菌在生活状态下释放
 - D. 抗原性强
 - E. 不耐热
- 67. 下列肺炎中最易并发肺脓肿的是**
- A. 真菌性肺炎
 - B. 干酪性肺炎
 - C. 金黄色葡萄球菌肺炎
 - D. 肺炎支原体肺炎
 - E. 肺炎链球菌肺炎
68. ARDS 引起 I 型呼衰的主要机制为
- A. 通气血流比例失调
 - B. 气体弥散障碍
 - C. 肺不张
 - D. 严重肺水肿
 - E. 肺内短路增加
69. 患者入院后，不顾病情继续坚持写论文，患者的行为属于
- A. 角色行为强化
 - B. 角色行为异常

- C. 角色行为冲突
- D. 角色行为减退
- E. 角色行为缺如

70. 卫生领域中的公平性是指生存机会的

- A. 以社会阶层为导向

- B. 以支付能力为导向
- C. 以需要为导向
- D. 以市场经济规律为导向
- E. 患者年龄为导向

A2型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

71. 主治医师张某被注销执业注册满1年,现欲重新执业,遂向卫生行政部门递交了相关申请,但未批准.其原因是

- A. 未经过医师规范化培训
- B. 刑事处罚完毕后不满2年
- C. 变更执业地点不满2年
- D. 未到基层医疗机构锻炼
- E. 在医疗机构的试用期不满1年

72. 医师王某从国外学成归来,拟从事遗传病诊断.对于医师王某能否从事该工作,颁发证书的部门是

- A. 县级卫生行政部门
- B. 市级卫生行政部门
- C. 省级卫生行政部门
- D. 医学会
- E. 卫生部

73. 某研究者采用随机单盲临床试验比较两种降压药(波依定与贝那普利)对轻中度原发性高血压患者的降压疗效.其单盲设计中不了解试验分组情况的人是

- A. 测量血压的护士
- B. 实施治疗的医生
- C. 负责设计的研究者
- D. 统计分析人员
- E. 接受治疗的患者

74. 调查发现某高原地区居民结肠癌的发病率高于全国平均水平,研究者注意到该地区人们的饮食习惯具有高脂肪摄入,低蔬菜、水果摄入的特点,拟开展一项课题研究,分析饮食习惯与结肠癌的关系,考虑到因果现象发生的时间顺序,最佳研究方法应为

- A. 生态学研究
- B. 横断面研究
- C. 队列研究
- D. 病例对照研究
- E. 临床试验

75. 已知甲地老年人比例大于乙地,经普查得甲地冠心病死亡率为5%,乙地冠心病死亡率为4%.若希望比较甲、乙两地冠心病死亡率的高低,则

- A. 应做率的Z检验
- B. 计算标化率后再比较
- C. 应做秩和检验
- D. 应做两个率比较的X²检验
- E. 可用两地的死亡率直接进行比较

76. 某幽门梗阻患者发生反复呕吐,血气分析结果为: pH 7.5, PaCO₂ 6.6kPa(50mmHg), HCO₃⁻ 36mmol/L,最可能的酸碱平衡紊乱类型是

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 混合性碱中毒

77. 智商同为85,其一是山区农民,结合他受教育程度和所处环境,考虑其智力基本正常;其二是某大学教授,结合其他表现,考虑有大脑退行性改变的可能,这是遵循心理测验的

- A. 标准化原则
- B. 保密性原则
- C. 客观性原则
- D. 统一性原则
- E. 以上都不是

78. 某患者,竞争意识强,总想胜过他人,老觉得时间不够用,说话快,走路快,脾气暴躁,容易激动,,常与他人意见不一致.其行为类型属于

- A. A型行为
- B. B型行为
- C. C型行为
- D. AB混合型行为
- E. BC混合型行为

临床医师资格笔试各单元考试科目及分值

西医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	基础100、少部分其他临床部分
第二单元	循环45、泌尿35、血液25、运动20、内分泌20、风湿5
第三单元	消化80、呼吸40、其他15、传染15
第四单元	妇产70、儿科50、精神30

西医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	消化40、循环23、精神22、呼吸20、 运动15、血液13、内分泌12、风湿5
第二单元	基础60、妇产30、儿科25、泌尿15、其他10、传染10

79. 女, 72岁, 乏力. 面色苍白1年. 40年前行胃大部切除术. 查体: T36.5, P90次/分, R16次/分, BP110/80mmHg, 皮肤及睑结膜苍白, 双肺呼吸音清, 心率90次/分, 心律齐, 各瓣膜听诊区未闻及杂音, 腹软, 上腹部见一长约7cm陈旧性手术瘢痕, 全腹无压痛及反跳痛, 未触及包块. 实验室检查: Hb70g/L, 粪隐血(-). 胃镜: 吻合口炎症. 与病人贫血有关的因素不包括

- A. 胃蛋白酶缺乏
- B. 铁缺乏
- C. 胃酸缺乏
- D. 叶酸缺乏
- E. 维生素 B12缺乏

添加老师微信: jyj qq666

80. 某患者出现颈静脉怒张、肝肿大和双下肢水肿, 最可能得心血管疾病是:

- A. 左心衰
- B. 右心衰
- C. 肺水肿
- D. 高血压
- E. 中心静脉压降低

81. 某肺炎高热患者经抗生素治疗后, 体温降至正常, 关于此时患者体温调节过程的变化, 下列哪项叙述是错误的:

- A. 产热中枢抑制
- B. 散热中枢兴奋
- C. 调定点恢复正常水平
- D. 皮肤血管扩张
- E. 发热条件下的体温调节功能障碍恢复正常

82. 某女性患者, 45岁, 体检结果显示, 血压180/100mmHg, 体重68kg, 身高160cm(BMI=26.6), 甘油三酯4.5mmol/L, 胆固醇5.1mmol/L. 对该患者进行非药物治疗, 应告知其饮食要注意严格控制

- A. 高糖类食物摄入
- B. 胆固醇和脂肪摄入
- C. 胆固醇摄入
- D. 总热能和脂肪摄入
- E. 蛋白质摄入

83. 某地某年8月发生了一起由食用蛋、奶糖制作的雪糕而引起的食物中毒, 症状为腹痛, 腹泻. 大便如水样黄绿色便, 少数病人有脓血便, 部分病人体温为38-39, 多数人潜伏期为12-24小时, 你认为最可能是哪种食物中毒

- A. 葡萄球菌肠毒素中毒
- B. 副溶血性弧菌食物中毒
- C. 变形杆菌食物中毒

- D. 沙门菌属食物中毒
- E. 肉毒毒素中毒

84. 选定有特定疾病的人群组与未患这种疾病的对照组, 比较两组人群过去暴露于某种可能危险因素的比例, 分析暴露于该因素是否与疾病有关, 该研究为

- A. 现况调查研究
- B. 病例对照研究
- C. 队列研究
- D. 实验性研究
- E. 理论性研究

85. 男, 68岁, 吸烟、饮酒40多年. 有高血压病史. 某年冬天晨起时发现左下肢不能动, 入院后诊断为脑卒中. 以下医生的建议不合理的是

- A. 不良生活方式是疾病原因之一, 应戒烟限酒
- B. 控制血压, 预防再发
- C. 告知患者定期来医院检查身体
- D. 告知患者康复注意事项
- E. 告知患者天气太冷是引发该病的直接因素

86. 女, 30岁. 因慢性皮肤溃疡迁延不愈需接受高压氧治疗. 患者对高压氧舱的封闭环境感到十分恐惧. 心理医生与患者进行了充分的沟通, 在做好各种应急准备之后, 让患者直接进入高压氧舱以快速克服恐惧心理. 同时完成高压氧治疗. 这种心理治疗方法是

- A. 放松训练
- B. 冲击疗法
- C. 厌恶疗法
- D. 系统脱敏法
- E. 认知疗法

87. 6岁, 女孩, 外伤致肱骨髁上伸直型骨折, 经手法复位, 石膏外固定, 5小时后出现手麻, 主动活动障碍, 手发凉, 此时的治疗, 应采取

- A. 立即拆除石膏, 改用骨牵引治疗
- B. 观察2天, 视情况采用相应措施
- C. 手术探查, 手术治疗.
- D. 应用血管扩张剂
- E. 臂丛麻醉

88. 45岁男性, 车祸3小时入院, 诊断: 骨盆骨折, 左股骨干骨折及左胫骨开放性骨折, 首先应密切观察的, 是哪种并发症

- A. 休克
- B. 泌尿系统感染
- C. 创口感染
- D. 疼痛
- E. 坠积性肺炎

89. 女, 21岁. 关节疼痛、口腔溃疡4个月, 双手指遇冷变白、变紫2个月, 发热、下肢水肿2周. 实验室检查: 血Hb89g/L, WBC $2.3 \times 10^9/L$, PLT $80 \times 10^9/L$; 尿蛋白(++); 尿红细胞(++). 最可能的诊断是

- A. 再生障碍性贫血
- B. 肾结核
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 急性肾小球炎
- E. 类风湿性关节炎

90. 男, 50岁. 吃海鲜后夜间突发左足第一跖趾关节剧烈疼痛1天. 查体: 关节局部红肿, 压痛明显. 既往无类似发作. 化验: 血尿酸 $602 \mu\text{mol/L}$, 目前最主要的治疗药物是

- A. 苯溴马隆
- B. 别嘌醇
- C. 抗生素
- D. 非甾体抗炎药
- E. 甲氟蝶呤

91. 女, 55岁. 恶心、呕吐、少尿6小时, 呕吐量大, 无口渴. 2年前有腹部手术史. 此时患者最可能出现的水电解质紊乱是

- A. 高渗性脱水
- B. 稀释性低钠血症
- C. 高钾血症
- D. 低渗性缺水
- E. 等渗性缺水

92. 一位因甲状腺肿就诊的病人, 临床有轻度甲低表现, 血浆FT₃, FT₄, 均高, TSH值高, 应当首先考虑的诊断是

- A. Graves病
- B. 继发性甲亢
- C. 外周组织对T₃, T₄, 抵抗
- D. TSH的受体或受体后缺陷
- E. 原发性甲低

93. 一因车祸受重伤的男子被送去医院急救, 因没带押金, 医生拒绝为病人办理住院手续, 当病人家属拿来钱时, 已错过了抢救最佳时机. 病人死亡. 本案例违背了病人权利的哪一点

- A. 享有自主权
- B. 享有知情同意权
- C. 享有保密和隐私权
- D. 享有基本的医疗权
- E. 享有参与治疗权

94. 某肝癌患者病情已到晚期, 处于极度痛苦之中, 自认为是肝硬化, 寄希望于治疗. 病情进展和疼痛发作时

多次要求医生给以明确说法和治療措施. 此时, 医生最佳的伦理选择应该是

- A. 正确对待保密与讲真话的关系, 经家属同意后告知实情, 重点减轻病痛
- B. 恪守保密原则, 继续隐瞒病情, 直至患者病死
- C. 遵循病人自主原则, 全面满足病人要求
- D. 依据知情同意原则, 应该告知病人所有信息
- E. 依据有利原则, 劝导病人试用一些民间土方

95. 某医学院曾收治三例分别在院外接受过试验性肝穿刺引起急性腹膜炎的病人. 术中医生在抽出脓液5—10ml后, 即拔除穿刺针, 术后未作常规处理, 2小时后呈急腹症症状. 结果二例治愈, 一例死亡. 对试验性肝穿刺的下列说法中错误的是

- A. 肝穿刺应该由有训练的医生进行, 一定要避免盲目性和危险性
- B. 不论穿刺动机如何, 只要造成事故, 它的价值就是负价值
- C. 只要动机是好的, 虽然是事故, 它也有一定的正价值
- D. 医学研究的试验设计必须严密
- E. 试验前必须经有关专家审定是符合科学要求

96. 男, 17岁, 水肿1周, 辅助检查: 尿蛋白(+++), 尿沉渣镜检: 红细胞 0-1/HP, 24小时尿蛋白定量 7.6g, 血肌酐 76mg/dL, 肾穿刺提示微小病变型肾病. 其主要发病机制为

- A. 补体 C₃ 异常
- B. 免疫复合物沉积
- C. T 细胞功能紊乱
- D. 肾小球微血栓形成
- E. 抗基底膜抗体形成

97. 女性患者56岁, 因车祸右膝关节严重损伤, 5天后在手术过程中, 病人突然呼吸困难, 血压下降, 经积极抢救无效, 病人呼吸心跳停止死亡. 尸检发现右侧腓静脉及深部大隐静脉内有残留血栓, 试分析死因是

- A. 肺动脉血栓栓塞
- B. 急性心肌梗死
- C. 麻醉意外
- D. 大叶性肺炎
- E. 败血症

98. 有一妇女, 产后阴道流血, 检查发现宫腔内有一肿块, 取出标本呈灰白和暗红色相间, 镜下见两种细胞形态, 一种为多核细胞, 核深染, 另一种为大圆形细胞, 而且胞浆丰富, 核大明亮, 有大片出血坏死. 此瘤可诊断为:

- A. 宫内膜腺癌
- B. 恶性葡萄胎
- C. 绒毛膜上皮癌

D. 癌肉瘤

E. 平滑肌肉瘤

99. 老年男性患者,尸检见肺组织散在多个小实变区.小支气管上皮坏死脱落,管腔内有炎性渗出物,以中性粒细胞为主,小支气管周围肺泡腔内也见上述渗出物.病理诊断为

A. 大叶性肺炎

B. 小叶性肺炎

C. 间质性肺炎

D. 病毒性肺炎

E. 支原体肺炎

100. 男,37岁,在心脏手术过程中,病人心电图表明:突然发生一度房室传导阻滞.此时该用何药作紧急处置:

A. 静注阿托品;

B. 静滴异丙肾上腺素

C. 静注肾上腺素

D. 静滴山莨菪碱

E. 静滴去甲肾上腺素

101. 男,54岁,有糖尿病史,近几年因工作紧张患高血压:22/13.6kPa.最好选用哪种降压药:

A. 氢氯噻嗪

B. 可乐定

C. 氯沙坦

D. 硝苯地平

E. 利血平

102. 女,25岁,平素易患咽炎,扁桃体炎,近来不规则低热3个月,膝、踝关节红、肿、热、痛明显,小腿有散在红斑,心肺(-),WBC增多,患慢性迁延性肝炎多年.不宜选用的药物是:

A. 氢化可的松

B. 泼尼松

C. 泼尼松龙

D. 阿司匹林

E. 布洛芬

103. 某小学组织学生接种乙肝疫苗,有44名学生因出现头痛、呕吐、四肢乏力而送到医院就诊,首诊医师及时处置并报告医院有关部门,经医护人员解释、安抚后,39名学生未经治疗症状很快消失,5名学生仍感恶心并伴有焦虑.医院组织专家会诊后排除了疫苗和其他躯体疾病所致.根据《疫苗流通与预防接种管理条例》,该事件所出现的情况属于

A. 药品不良反应

B. 群体性心因性反应

C. 预防接种异常反应

D. 医疗事故

E. 突发公共卫生事件

104. 女性患者王某,55岁,因患乙状结肠癌行肿瘤切除术、结肠造瘘术.术中顺利,在关腹前,输A型血约50毫升,患者突然出现寒战,伤口渗血,导尿为全程血尿,当即认定系输血引起的溶血反应,立即停止输血、进行抢救;同时复查.患者系O型血,即改输O型血400毫升.由于发现及时,抢救得当,病员转危为安.经调查发现血库工作人员甲将血样试管搞错,导致定错血型,发生溶血反应.甲的行为违反了《临床输血技术规范》的

A. 输血申请规定

B. 受血者血样采集和送检规定

C. 交叉配血规定

D. 发血规定

E. 输血规定

105. 一职工从沿海某城市归来,腹泻1天,10余次,水样便,到市医院求治,疑为肠炎,后便培养出E1-Tor型细菌.诊断后2小时医师上报疫情,国家要求上报此类传染病最迟不超过嘛人医考顾C总整理

A. 2小时

B. 12小时

C. 18小时

D. 24小时

E. 48小时

106. 女,45岁.茶色尿伴腰背痛1个月.查体:贫血貌,巩膜黄染,肝肋下未触及,脾肋下2cm,腹部移动性浊音(-).血常规:Hb72g/L,WBC $6.0 \times 10^9/L$,Plt $126 \times 10^9/L$,网织红细胞0.12.Coombs实验(+),Ham实验(-)患者最可能的诊断是

A. 自身免疫性溶血性贫血

B. 巨幼细胞贫血

C. 脾功能亢进

D. 骨髓增生异常综合征

E. 阵发性睡眠性血红蛋白尿

107. 女,40岁,皮肤出血点伴月经量增多1周.血常规Hb100g/L,WBC $4.0 \times 10^9/L$,Plt $23 \times 10^9/L$,骨髓细胞学检查:巨核细胞增多伴成熟障碍.首选的治疗措施是

A. 输注浓缩血小板

B. 脾切除

C. 应用雄激素

D. 应用糖皮质激素

E. 应用长春新碱

108. 某肺心病患者,血气分析及电解质测定结果如下:

pH7.28,PaCO₂85.8mmHg,HCO₃⁻37.8mmol/L,Cl⁻90mmol/L,Na⁺140mmol/L,可诊断为

- A.呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒
- B.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
- C.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- D.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒
- E.代谢性碱中毒合并代谢性酸中毒

109.女,32岁,大面积烧伤入院治疗14天后,突发寒战高热,脓痰,呈蓝绿色,一般情况恶化,考虑患者感染

- A.大肠埃希菌
- B.克雷伯杆菌
- C.铜绿假单胞菌
- D.链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

添加老师微信: jyj qq666

110.某新生儿室发现多名发热流涕口唇发绀患儿,体检均发现心动过速,心音低钝,心电图呈心肌炎表现,患儿最可能感染的是输入医考原创汇总整理

- A.柯萨奇病毒
- B.麻疹病毒
- C.单纯疱疹病毒
- D.腺病毒
- E.乙肝病毒

11.男,45岁.左颈部淋巴结进行性肿大3个月.淋巴结活检病理结果示弥漫性大B细胞淋巴瘤,最可能出现的细胞免疫表型是

- A.CD10+
- B.CD13+
- C.CD20+
- D.CD5+
- E.CD34+

112.肝体积明显缩小,外观黄绿色,表面呈结节状,光镜下见肝细胞大片坏死,同时可见肝细胞再生结节,明显淤胆,大量炎症细胞浸润,结节间纤维组织及小胆管明显增生,根据上述病变应诊断为

- A.急性黄疸型普通型肝炎
- B.重度慢性肝炎
- C.急性重型肝炎
- D.亚急性重型肝炎
- E.细菌性肝硬化

13.某大型企业计划在自然疫源地兴建旅游建设项目在征询意见时,有专家提醒,根据《传染病防治法》规定,应当事先由法定单位对该项目施工环境进行卫生调查。该法定单位是

- A.省级以上旅游主管部门
- B.省级以上疾病预防控制机构

- C.国务院卫生行政主管部门
- D.省级以上环境保护主管部门
- E.省级以上环境监测评价机构

114.某县医院妇产科医师欲开展结扎手术业务,,按照规定参加了相关培训.培训结束后,有关单位负责对其进行了考核并颁发给相应的合格证书。该有关单位是指

- A.地方医师协会
- B.地方卫生行政部门
- C.卫生部
- D.地方医学会

115.李某,为中度慢性疼痛患者,医师开具第一类精神药品控缓释制剂,每张处方用药量最多天数是

- A.1天
- B.2天
- C.3天
- D.7天
- E.10天

添加老师微信: jyj qq666

116.M药厂销售代表在和某医院几名医师达成协议后,医师在处方时使用M药厂生产的药品,并按使用量的多少收受了药厂给予的提成.事情曝光以后,对M药厂按

《药品管理法》的有关规定处理;对于医师的错误行为,有权决定给予处分、没收违法所得的部门是

- A.药品监督管理部门
- B.工商行政管理部门
- C.医师协会
- D.公安部门
- E.卫生行政部门

117.某山区一妇女育有3个子女,生活贫困,长期从事重体力劳动.近期感觉头昏乏力,血白蛋白下降,水肿,最需要补充的食物是

- A.白面
- B.红薯
- C.绿叶菜
- D.大米
- E.豆类相关制品

添加老师微信: jyj qq666

118.某单位在职工体检中发现员工高血压和超重的检出率较高。医务人员为该单位制定的健康教育与健康促进干预活动主要包括调整食堂的膳食结构、制定工间操制度和组织文体活动等。这些干预活动主要是

- A.社会因素
- B.强化因素
- C.人群因素
- D.倾向因素

E. 促成因素

119. 男, 38岁. 因胃癌行胃大部切除术, 术前查Hb110g/L, 术中失血约800ml, 已输入平衡盐溶液 2000ml, 术后第1天感胸闷、气促. 查体: T37.0, BP100/60mmHg, 实验室检查: Hb80g/L. 最好应给患者输注

- A. 悬浮红细胞
- B. 浓缩血小板
- C. 全血
- D. 生理盐水

E. 新鲜冰冻血浆

120. 女, 35岁. 5年前分娩后出现无乳、闭经、食欲减退、怕冷、面色苍白、毛发脱落. 最可能的诊断是

- A. 腺垂体功能减退症
- B. 原发性甲状腺功能减退症
- C. 神经性厌食症
- D. 肾上腺皮质功能减退症
- E. 贫血

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案, 请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(121~123题共用题干)

男, 52岁, 公司经理, 吸烟10年每天2包, 体重75kg, 身高166cm

121. 从临床预防心血管疾病的角度讲, 应检查

- A. 肝功能
- B. 血常规
- C. 冠状动脉造影
- D. 血脂
- E. 超声心动图

添加老师微信: jyj qq666

122. 患者的BMI 是

- A. 21.4
- B. 23.5
- C. 25.8
- D. 27.2
- E. 29.4

123. 应该建议该就诊者采取的预防措施是

- A. 流感疫苗接种喻人|医考原创|汇总整理
- B. 肺炎链球菌疫苗接种
- C. 戒烟, 适当运动合理饮食
- D. 冬令进补
- E. 冷水沐浴锻炼

(124~127题共用题干)

一女性, 55岁. 丧偶八年, 现独居, 嗜烟酒, 不爱运动. 平时性情抑郁, 过分容忍, 办事无主见, 常顺从于别人. 1月前行胃癌切除, 术中及术后情绪低落, 兴趣下降, 独自流泪. 有轻生之念

124. 患者病前的行为特征为

- A. A型
- B. B型

C. C型

- D. 混合型
- E. 以上都不是

125. 病人术后的情绪反应属于

- A. 焦虑
- B. 抑郁
- C. 恐惧
- D. 痛苦
- E. 内疚

126. 病人患胃癌的主要原因为

- A. 生活事件
- B. 易感性人格特征
- C. 情绪因素
- D. 不良生活习惯
- E. 以上都是

127. 对这种病人临床上应采取哪种措施

- A. 支持性心理治疗
- B. 认知疗法
- C. 精神分析疗法
- D. 药物治疗
- E. 以上都是

(128~129题共用题干)

某患者因上呼吸道感染静点青霉素. 护士按照操作规程给药. 第二天用完药后, 患者回到家中感到不适, 三小时后加重, 紧急送到医院抢救, 后抢救无效死亡. 家属认为是青霉素过敏致死, 反映到市卫生局. 市卫生局委托市医学会组织专家进行医疗事故鉴定, 鉴定结论为: 不属于医疗事故.

128. 依据首次鉴定的结论, 患者死亡的性质为

- A. 医疗事故

- B. 医疗差错
- C. 医疗意外
- D. 医疗纠纷
- E. 难以避免的并发症

129. 如果家属不服市医学会的鉴定结论,则可以

- A. 自收到首次鉴定结论之日起5日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请
- B. 自收到首次鉴定结论之日起10日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请
- C. 自收到首次鉴定结论之日起15日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请
- D. 自收到首次鉴定结论之日起20日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请
- E. 自收到首次鉴定结论之日起30日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请

(130~131题共用题干)

医生刘某看药品经营能挣钱,便与院领导拉关系,请假离岗搞药品销售,时间近三年

130. 对刘某离岗二年以上的行为,医院应当报告准予注册的卫生行政部门的期限是

- A. 离岗满二年的10日内
- B. 离岗满二年的15日内
- C. 离岗满二年的30日内
- D. 离岗满二年后三个月内
- E. 离岗近三年的当时

131. 医院未按规定履行报告职责,若导致严重后果,由卫生行政部门给予警告,并对该机构的行政负责人给予

- A. 行政处分
- B. 行政罚款
- C. 注销注册
- D. 吊销执照
- E. 以上都不是

B型题

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑,每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(132~133题共用备选选项)

- A. 主动—被动型
- B. 被动—主动型
- C. 指导—合作型
- D. 共同参与型
- E. 合作—指导型

132. 对于长期慢性病人,宜采取的医患模式是

133. 对于切除阑尾的术后病人,宜采取的医患模式是

(134~135题共用备选选项)

- A. 分层抽样
- B. 系统抽样
- C. 整群抽样
- D. 单纯随机抽样
- E. 普查

134. 在调查研究中,从总体中按照相同的间隔抽取调查单位进行调查的方法为

135. 在调查研究中,先将总体按照某种特征分成若干组群,然后在每组群中进行随机抽样的方法为

(136~138题共用备选选项)

- A. 细胞呼吸酶活性
- B. 血红素合成酶活性

C. 细胞色素氧化酶活性

D. 胆碱酯酶活性

E. 过氧化氢酶活性

136. 铅中毒时铅主要抑制:

137. 硫化氢中毒主要抑制

138. 氰化氢中毒主要抑制:

(139~141题共用备选选项)

A. 角色行为缺如

B. 角色行为冲突

C. 角色行为减退

D. 角色行为强化

E. 角色行为异常

139. 期望继续享有病人角色所获得的利益,是病人角色的

140. 否认自己有病,不及时就医是病人角色的

141. 不把自己当病人,仍坚持带病工作是病人角色的

(142~143题共用备选选项)

A. 乙琥胺

B. 地西洋

C. 氯丙嗪

D. 苯妥英钠

E. 异丙嗪

142. 治疗脊髓损伤引起肌强直的药物是

143. 治疗癫痫大发作和局限性发作的药物

(144~145题共用备选选项)

A. 噻嗪类抑制剂

B. 血管紧张素转换酶抑制剂

C. α 受体抑制剂

D. 受体抑制剂

E. 钙离子通道抑制剂

添加老师微信: jyjqq666

144. 合并低钾血症的高血压患者降压不宜选用的药物是

145. 合并糖尿病的高血压患者,血清肌酐正常,降压治疗宜选用的药物是

(146~147题共用备选选项)

A. 普萘洛尔

B. 环丙沙星

C. 阿托品

D. 华法林

E. 阿司匹林

146. 防止心房颤动患者血栓形成的药物是

147. 治疗泌尿生殖道感染的药物是

(148~150题共用备选选项)

A. 表示某病发生严重程度

B. 反映两个指标的相对关系

C. 反映某病在各疾病中所占的位次

D. 反映同种病不同时间动态变化情况

E. 反映同种病不同地区的严重情况

148. 发病率

149. 构成比

150. 相对比

